+QK314
.W4

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA POPULIQUE SALUTE
1891

LIBRARY

Kenneth K. Mackenzie
Collection

Bequest of
Kenneth K. Mackenzie
October 1934

C

Weigel
Flora

FLORA
POMERANO-RUGICA
EXHIBENS
PLANTAS
PER
POMERANIAM ANTERIOREM SVECICAM
ET RUGIAM SPONTE NASCENTES
METHODO LINNEANA
SECUNDUM
SYSTEMA SEXUALE
DIGESTAS

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS
NOMINIBUS GERMANICIS
OFFICINALIBUS PHARMACOPOEORUM
LOCIS NATALIBUS
TEMPORE FLORENDI
OBSCURIORUM DESCRIPTIONIBUS

AUCTORE
CHRIST. EHRENFR. WEIGEL

BEROLINI STRALSUNDIAE ET LIPSIAE.
APUD GOTTL. AUG. LANGE
1769.

+QK314
.W4

5695

AMPLISSIMO COETUI

GENEROSI SENATUS

INCLYTÆ REIPUBLICÆ

SUNDENSIS

VIRIS

MAGNIFICIS GENEROSIS

CONSULTISSIMIS

DOCTISSIMIS VIGILANTISSIMIS

DEXTERRIMIS

abiens ad Academias exteras primordia ſtudiorum ſuorum humillime dicat atque dedicat

C. E. WEIGEL,
Auctor.

VIRI MAGNIFICI GENEROSI CONSULTISSIMI VIGILANTISSIMI.

Cui potius dicanda putem juvenilium ſtudiorum meorum prima hæcce ſpecimina, quam VOBIS, VIRI MAGNIFICI, qui omnis bonæ eruditionis diſciplinas non amatis ſolum & diligitis, ſed colitis etiam atque protegitis? Nec dubitandum, quin VOBIS præſertim attribuenda, quæcunque ex conaminibus meis proficiſci poterit, utilitas, cum per VESTRAM benevolentiam facillimus mihi potuerit

ad Bibliothecam VESTRAM aditus; ornatiſſimam quidem illam libris ut in omni ſcientiarum genere, ita & in Botanica præſtantioribus. Ex quo ſavore quantum in inveſtigandis patriæ plantis indigenis excitatus ſim ac adiutus, non ſatis enarrare poſſum. Ne dedignemini itaque VESTRA, quæ VOBIS retribuo potius, quam offero. Valete, Valete diu optime, bonisque artibus & mihi ſavere pergite.

Dabam Sundiæ die 22 Februarii 1769.

Lecturis Auctor.

Non omnem tellurem omnes ferre plantarum ſpecies, ſed diverſas potius eas in diverſis progigni regionibus, cum ſatis compertum ſit; vix ullus dubitabit, quin multum faciant ad perficiendam Rem Botanicam enumerationes plantarum cujuscunque regionis indigenarum. Quæ magno quoque uſui erunt iis, qui illarum regionum plantas ſpontaneas ad

Medicos uſus colligunt. Quod teſtabuntur Pharmacopœi noſtri, quos ſæpius, in viſitationibus officinarum pharmacevticarum publicis, de difficili plantarum officinalium apud nos ſponte naſcentium collectione conquerentes audivi. Cum enim neſciant quibus in locis illæ ſint quærendæ, multas ab exteris regionibus ſiccas apportandas curare debent, quas minoribus ſumtibus recentes intra patriæ limites colligere poſſent, ſi exſtaret libellus loca, copiam earum producentia, indicans. Sunt quoque non pauci regionis noſtræ incolæ, qui Botanicæ eum in finem operam navant, ut varias plantas dignoſcere poſſint, quas ob uſus Oeconomicos colligere eorum intereſt. His quoque gratus erit libellus earum, quas patria alit, plantarum

loca

loca natalia exhibens. Quare non inutilis erit enumeratio omnium plantarum apud nos ſponte provenientium, ſubjunctis locis natalibus, in quibus præcipua cujusvis plantæ reperitur copia. Quæ denique iis quoque, qui in hac regione, Botanices cultoribus ſeſe adnumerantes, omnes plantarum ſpontanearum ſpecies colligere cupiunt, haud parvæ erit utilitati, cum talem collectionem reddat faciliorem. Quam enim difficile ſit conquirere omnes ſpecies plantarum in regione, cujus Flora indigena adhuc a nemine eſt enumerata, ejus rei veritatem ipſe expertus ſum, cum ſex abhinc annis in colligendas & dignoſcendas plantas patriæ incumbere inciperem. Tali enim duce deſtitutus cum eſſem, omnia loca omnesque, neceſſe mi-

hi fuit, pererrare latebras, eaque diverſo tempore iterata perquiſitione luſtrare, ut tandem quamvis plantam cum flore & fructu obtinerem; (nam deficientibus his partibus nil certi de quavis planta dijudicari poteſt;) id quod quantæ mihi fuerit moleſtiæ, & quoties fruſtraneas reddiderit excurſiones meas, is ſolus perſpiciet cui ſimilis caſus obtigit. Prodiit quidem in lucem Ao. 1764 Rev. Dni. Paſt. Wilke Flora Gryphica, quæ, quanquam Gryphicas tantum recenſeat plantas, multum tamen mihi profuit, cum ejus ope jam conjicere quodammodo poſſem, quænam apud nos naſcantur plantarum ſpecies. Sed prorſus tamen non ſuffecit, cum ſola loca natalia Gryphiam circumjacentia indicet, & præterea multæ in

Pome-

Pomerania ac Rugia occurrant plantæ quas non fert Gryphicus ager; quapropter non ingratum opus fore credidi, ſi, quæ ſexenni tempore obſervare & detegere potui, publici juris facerem. Juſto quidem feſtinantius prodire mihi videbatur hicce libellus, cum forſan adhuc pauca quædam deficiant, quæ, ſi licuerit, impoſterum ſupplere animus eſt; cum vero negotia altioris momenti editionem hujus Florae non amplius differri jubeant, faciendum mihi potius putavi, utile quoddam, licet imperfectum, ut ederem, quam detecta oblivioni traderem. Vix enim quis iteratis vicibus tot viſitabit patriæ noſtræ loca, quot ego frequentavi. Alios enim retinet negotiorum accumulatorum multitudo; alios impedit provectior ætas, vel

valetu-

valetudinis ſtatus male tutus; alii denique tanti non faciunt Botanicem, ut ejus ductu omnes ſubeant moleſtias, tempeſtatis injuriis ceteriſque ſeſe exponant incommodis, eum ſolummodo in finem ut plantas indigenas colligant. Quæ cum me a proſequendo plantarum cognoſcendarum ſtudio amœniſſimo non detinuerint, conjeci me pleraſque collegiſſe plantas, quas Pomerania Svecica & Rugia alunt, ſpontaneas.

Definitiones plantarum in hocce libello enumeratarum ex Ill. Equitis de Linne Speciebus Plantarum deſumſi, ubi quoque Synonyma ſufficientia, qui quærit, reperiet, quæ ſtudio omiſi, ut parceretur ſumtibus, neque in molem creſceret libellus excurſionibus Botanicis præ-

primis

primis accommodandus. Nomina Germanica, quæ colligere potui, appoſui in gratiam Oeconomorum aliorumque, qui Latinam linguam non callentes aliquas nihilominus plantas ob ſuos uſus cognoſcere & legere cupiunt. Nomina Pharmacevtica in uſum Medicinæ cultorum & Pharmacopœorum adjeci. Loca Natalia rariorum omnia, vulgarium vero nonniſi illa indicavi, quæ præcipuam alunt cujusvis ſpeciei individuorum copiam, & a Sundia vel alia urbe non nimis remota exiſtunt. Quorum Sundenſibus abbreviatum nomen Sund., Gryphicis Gryph., Pomeranicis Pom., Rugianis Rug., Jasmundenſibus Jasm., Wittowianis Witt. præmiſi. Quæ vero a me ipſo detecta non fuere, diſtinxi ita ut Gryphica, quot

ex ſupra memorata Flora Gryphica deſumſi, uncis [ ] includenda curaverim, ceteris vero appoſuerim nomina eorum, qui illa benevole mecum communicarunt. Tempus florendi ſubjungere non inutile judicavi, quo multis parceretur excurſionibus fruſtraneis, pateretque tempus quo quævis planta perfecta eſſet reperienda. Si quando dubius fui, num citatum nomen Linneanum plantæ a me lectæ exacte competeret, ſignum interrogationis præmiſi, & deſcriptionem plantæ a me lectæ ſubjunxi, ut ſi quem forte commiſiſſem errorem, alii corrigere poſſent. Quas vero, a me ipſo non lectas, e Flora Gryphica huc adduxi, ſigno crucis † notavi, ne alienos pro meis viderer venditare labores. Pauciſſimis illis ſpeciebus,

quas

quas novas vel ab aliis nondum ſufficient inter deſcriptas putavi, juſtum nomen imponere ſtudui, vel ſaltem deſcriptionem dedi. Quod num annuente, an invita Minerva fecerim, B. L. L. judicabitis. Indices completi debentur induſtriæ amici dilectiſſimi MOR. WILLICHII, Botanices cultoris indefeſſi, qui ſæpius mihi excurſiones inſtituenti comes fuit, nec hunc laborem ſuſcipere detrectavit. Ceterum ſi quis in hunc libellum irrepſerit error, humaniter quæſo illum corrigatis B. L. L., cum enim omne ſit grave initium, perfecta quoque eſſe nequit hæc prima FLORA POMERANO-RUGICA. Dabam Sundiæ die 22 Februarii, 1769.

INDEX

INDEX SYSTEMATICUS.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 Salicornia	herbacea	1
2 Hippuris	vulgaris	2

DIGYNIA.

3 Callitriche	verna	3
	autumnalis †	4

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

4 Ligustrum	vulgare	5
5 Circæa	lutetiana	6
6 Veronica	officinalis	7
	ſerpyllifolia †	8
	Beccabunga	9
	Anagallis ∇	10
	ſcutellata	11

Vero-

6 Veronica	Chamædrys	12
	agreſtis	13
	arvenſis	14
	hederifolia	15
	triphyllos	16
	verna †	17
	peregrina	18
7 Gratiola	officinalis	19
8 Pinguicula	vulgaris	20
9 Utricularia	vulgaris	21
	minor	22
10 Verbena	officinalis	23
11 Lycopus	europæus	24

DIGYNIA.

12 Anthoxanthum	odoratum	25

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

13 Valeriana	dioica	26
	officinalis	27
	Locuſta	28
14 Iris	Pſevd-Acorus	29
15 Scirpus	paluſtris	30
	cæſpitoſus	31

35 Elymus	arenarius	84
36 Hordeum	murinum	85
37 Triticum	repens	86

TRIGYNIA.

38 Holosteum	umbellatum	87

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

39 Scabiosa	Succiſa *	88
	arvenſis	89
	Columbaria	90
	? ochroleuca *	91
40 Sherardia	arvenſis	92
41 Asperula	odorata	93
42 Galium	paluſtre	94
	uliginoſum	95
	verum	96
	ſylvaticum	826
	boreale	97
	Aparine	98
43 Plantago	major	99
	media	100
	lanceolata	101
	maritima	102

43 Plan-

43 Plantago	Coronopus	103
44 Sanguisorba	officinalis	104
45 Cornus	ſanguinea †	105
46 Alchemilla	vulgaris	106

DIGYNIA.

47 Cuscuta	europæa	107

TETRAGYNIA.

48 Ilex	Aquifolium	108
49 Potamogeton	natans	109
	perfoliatum	110
	lucens	111
	criſpum	112
	marinum	113
	puſillum †	114
50 Sagina	procumbens	115

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

51 Myosotis	ſcorpioides	116
52 Lithospermum	officinale	117
	arvenſe	118
53 Anchusa	officinalis	119
54 Cynoglossum	officinale	120

55 PULMONARIA	officinalis	121
56 SYMPHYTUM	officinale	122
57 ASPERUGO	procumbens	123
58 LYCOPSIS	arvenſis	124
59 ECHIUM	vulgare	125
60 PRIMULA	veris	126
	farinoſa	127
61 MENYANTHES	trifoliata	128
62 HOTTONIA	paluſtris	129
63 LYSIMACHIA	vulgaris	130
	thyrſiflora	131
	nemorum	132
	Nummularia	133
64 ANAGALLIS	arvenſis *	134
65 CONVOLVULUS	arvenſis	135
	ſepium	136
66 CAMPANULA	rotundifolia	137
	patula	138
	perſicifolia	139
	rapunculoides *	140
	Trachelium *	141
	glomerata	142
67 PHYTEVMA	ſpicata	143
68 LONICERA	Periclymenum	144
	Xyloſteum	145
69 VERBASCUM	Thapſus	146
	nigrum	147

70 DATURA	Stramonium	148
71 HYOSCYAMUS	niger	149
72 SOLANUM	Dulcamara	150
	nigrum	151
73 RHAMNUS	catharticus	152
	Frangula	153
74 EVONYMUS	europæus	154
75 RIBES	rubrum	155
	alpinum	156
	nigrum	157
	Groſſularia *	158
	Uva criſpa	159
76 HEDERA	Helix	160
77 GLAUX	maritima	161

DIGYNIA.

78 ASCLEPIAS	Vincetoxicum	162
79 HERNIARIA	glabra	163
80 CHENOPODIUM	BonusHenricus	164
	urbicum	165
	rubrum	166
	murale	167
	album †	168
	viride	169
	glaucum	170
	Vulvaria	171
	polyſpermum †	172

80	CHENOPODIUM	maritimum	173
81	SALSOLA	Kali	174
82	ULMUS	campeſtris	175
83	GENTIANA	Pnevmonanthe	176
		Centaurium	177
		campeſtris *	178

Umbellatæ.

84	ERYNGIUM	maritimum	179
85	HYDROCOTYLE	vulgaris	180
86	SANICULA	europæa	181
87	TORDYLIUM	Anthriscus	182
88	DAUCUS	Carota	183
89	CONIUM	maculatum	184
90	SELINUM	paluſtre	185
91	ATHAMANTA	Oreoſelinum	186
92	LASERPITIUM	latifolium †	187
93	HERACLEUM	Sphondylium	188
94	ANGELICA	Archangelica *	189
		ſylveſtris *	190
95	SIUM	latifolium	191
96	OENANTHE	fiſtuloſa	192
97	PHELLANDRIUM	aquaticum	193
98	CICUTA	viroſa	194
99	AETHUSA	Cynapium *	195
100	SCANDIX	Anthriscus	196
101	CHAEROPHYLLUM	ſylveſtre	197

101	Chaerophyllum	temulum	198
102	Pastinaca	ſativa	199
103	Anethum	graveolens	827
104	Carum	Carvi	200
105	Pimpinella	ſaxifraga	201
106	Apium	graveolens	202
107	Aegopodium	Podagraria	203

TRIGYNIA.

108	Viburnum	Opulus	204
109	Sambucus	Ebulus	205
		nigra	206
110	Alsine	media	207

TETRAGYNIA.

111	Parnassia	paluſtris	208

PENTAGYNIA.

112	Statice	Armeria	209
113	Linum	catharticum	210
		Radiola	211
114	Drosera	rotundifolia	212
		longifolia	213

POLYGYNIA.

115	Myosurus	minimus	214

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

116 Allium	Scorodopraſum	215
	arenarium †	216
	oleraceum	217
117 Ornithogalum	luteum	218
	minimum	219
118 Asparagus	officinalis	220
119 Convallaria	majalis	221
	Polygonatum	222
	multiflora	223
	bifolia	224
120 Acorus	Calamus	225
121 Juncus	conglomeratus	226
	effuſus	227
	ſquarroſus †	228
	articulatus	229
	bulboſus	230
	bufonius †	231
	piloſus	232
	campeſtris	233
122 Berberis	vulgaris	234

TRIGYNIA.

123 Rumex	criſpus	235

123 RUMEX	maritimus *	236
	acutus	237
	aquaticus	238
	Acetoſa	239
	Acetoſella	240
124 SCHEUCHZERIA	paluſtris	828
125 TRIGLOCHIN	paluſtre	241
	maritimum	242

POLYGYNIA.

126 ALISMA	Plantago ∇	243
	Ranunculoides†	244

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

127 TRIENTALIS	europæa	245

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

128 EPILOBIUM	anguſtifolium	246
	hirſutum *	247
	montanum	248
	paluſtre	249

129 Vaccinium	Myrtillus	250
	uliginoſum	251
	Vitis idæa	829
	Oxycoccos	252
130 Erica	vulgaris	253
	Tetralix	254

TRIGYNIA.

131 Polygonum	amphibium	255
	Hydropiper	256
	Perſicaria	257
	aviculare	258
	Convolvulus	259

TETRAGYNIA.

132 Paris	quadrifolia	260
133 Adoxa	Moſchatellina	261

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

134 Butomus	umbellatus	262

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

135 Monotropa	Hypopithys	263
136 Ledum	paluſtre	264

137 ANDROMEDA	Polifolia	265
138 ARBUTUS	Uva urſi	266
139 PYROLA	rotundifolia	267
	ſecunda	268

DIGYNIA.

140 CHRYSOSPLENIUM	alternifolium	269
141 SAXIFRAGA	granulata	270
	tridactylites †	271
142 SCLERANTHUS	annuus	272
	perennis	273
143 SAPONARIA	officinalis	274
144 DIANTHUS	Armeria	275
	prolifer	276
	deltoides	277
	plumarius *	278

TRIGYNIA.

145 CUCUBALUS	Behen	279
146 SILENE	nutans	280
147 STELLARIA	nemorum	281
	Holoſtea *	282
	graminea	283
148 ARENARIA	peploides	284
	trinervia	285
	ſerpyllifolia	286
	rubra	287

PENTAGYNIA.

149 SEDUM	Telephium	288
	acre	289

150 OXA-

167 RUBUS	ſaxatilis	326
	Chamæmorus	820
168 FRAGARIA	veſca	327
169 POTENTILLA	Anſerina	328
	argentea	329
	verna	330
	reptans	331
170 TORMENTILLA	erecta	332
171 GEUM	urbanum	333
	rivale	334
172 COMARUM	paluſtre	335

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

173 ACTÆA	ſpicata	336
174 CHELIDONIUM	majus	337
175 PAPAVER	Argemone	338
	dubium	339
	Rhœas	340
176 NYMPHÆA	lutea	341
	alba	342
177 TILIA	europæa	343

TRIGYNIA.

178 DELPHINIUM	Conſolida	344
179 ACONITUM	Napellus †	345

PENTAGYNIA.

180 AQUILEGIA	vulgaris	346

HEXA-

HEXAGYNIA.

181 STRATIOTES Aloides 347

POLYGYNIA.

182 ANEMONE Hepatica 348
Pulſatilla 349
nemoroſa 350
ranunculoides 351
183 THALICTRUM minus 352
flavum 353
184 RANUNCULUS Flammula 354
reptans 355
Lingua 356
Ficaria 357
Thora † 358
auricomus 359
ſceleratus 360
bulboſus 361
repens 362
polyanthemos 363
acris 364
lanuginoſus 365
arvenſis 366
aquatilis 367
185 TROLLIUS europæus 368
186 CALTHA paluſtris 369

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

187 AJUGA pyramidalis 370

187 Ajuga	reptans	371
188 Teucrium	Scordium	372
189 Nepeta	Cataria	373
190 Mentha	aquatica	374
	arvenſis	375
191 Glecoma	hederacea	376
192 Lamium	album	377
	purpureum	378
	amplexicaule	379
193 Galeopsis	Ladanum	380
	Tetrahit	381
	Galeobdolon	382
194 Betonica	officinalis	383
195 Stachys	ſylvatica	384
	paluſtris	385
196 Ballota	nigra	386
197 Marrubium	vulgare	387
198 Leonurus	Cardiaca	388
199 Clinopodium	vulgare	389
200 Origanum	vulgare	390
201 Thymus	Serpyllum	391
	Acinos	392
202 Scutellaria	galericulata	393
203 Prunella	vulgaris	394

ANGIOSPERMIA.

204 Rhinanthus	Criſta galli	395
205 Euphrasia	officinalis	396
	Odontites	397
206 Melampyrum	arvenſe	398
	nemoroſum	399
	pratenſe	400

206 Melampyrum	ſylvaticum	401
207 Lathræa	Squamaria †	402
208 Pedicularis	paluſtris	403
	ſylvatica	404
209 Antirrhinum	minus	405
	Linaria	406
210 Scrophularia	nodoſa	407

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

211 Myagrum	ſativum	408
	paniculatum	409
212 Draba	verna	410
213 Lepidium	ruderale	411
214 Thlaspi	arvenſe	412
	campeſtre *	413
	Burſa Paſtoris	414
215 Cochlearia	officinalis	415
	Armoracia	416
216 Iberis	nudicaulis	417
217 Alyssum	incanum	418

SILIQUOSA.

218 Dentaria	bulbifera	419
219 Cardamine	pratenſis	420
220 Sisymbrium	Naſturtium ▽	421
	ſylveſtre	422
	amphibium	423
	Sophia	424

220 SISYMBRIUM	Irio †	425
221 ERYSIMUM	officinale	426
	Barbaræa	427
	Alliaria	428
222 HESPERIS	inodora *	429
223 ARABIS	thaliana	430
224 TURRITIS	glabra	431
	hirſuta *	432
225 BRASSICA	campeſtris	433
226 SINAPIS	arvenſis	434
	nigra	435
227 RAPHANUS	Raphaniſtrum	436
228 BUNIAS	Cakile	437
229 CRAMBE	maritima	438

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

230 GERANIUM	cicutarium	439
	ſylvaticum	440
	pratenſe	441
	robertianum	442
	molle	443
	disſectum	444
	columbinum	445
	rotundifolium	446
	ſanguineum	447

POLYANDRIA.

231 MALVA	rotundifolia	448
	ſylveſtris	449
	Alcea	450

CLAS.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

232 FUMARIA	bulboſa	451
	officinalis	452

OCTANDRIA.

233 POLYGALA	vulgaris	453

DECANDRIA.

234 SPARTIUM	ſcoparium	454
235 GENISTA	tinctoria	455
236 ONONIS	ſpinoſa	456
237 ANTHYLLIS	Vulneraria	457
238 OROBUS	vernus *	458
	tuberoſus *	459
	niger *	460
239 LATHYRUS	pratenſis	461
	ſylveſtris	462
	latifolius	463
240 VICIA	dumetorum	464
	ſylvatica	465
	Cracca	466
	ſativa	467
	ſepium	468
241 ERVUM	Lens	831
	tetraſpermum †	469
	hirſutum	470
242 ORNITHOPUS	perpuſillus	471
243 HEDYSARUM	Onobrychis	472

244 ASTRAGALUS	glycyphyllos	473
245 TRIFOLIUM	M. officinalis	474
	hybridum †	475
	repens	476
	pratenſe	477
	arvenſe	478
	montanum	479
	agrarium	480
	procumbens	481
246 LOTUS	corniculatus	482
247 MEDICAGO	lupulina	483

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

248 HYPERICUM	quadrangulum	484
	perforatum	485
	humifuſum	486
	montanum	487

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS

Semifloſculoſi.

249 TRAGOPOGON	pratenſe	488
250 PICRIS	Hieracioides †	489
251 SONCHUS	arvenſis	490
	oleraceus	491

252 LAC-

252 LACTUCA	viroſa	492
253 PRENANTHES	muralis	493
254 LEONTODUM	Taraxacum	494
	autumnale	495
	hiſpidum	496
255 HIERACIUM	Piloſella	497
	dubium †	498
	Auricula	499
	murorum	500
	paludoſum	501
	ſabaudum	502
	umbellatum	503
256 CREPIS	tectorum	504
257 HYOSERIS	minima	505
258 HYPOCHÆRIS	radicata *	506
259 LAPSANA	communis	507
260 CICHORIUM	Intybus	508
	Capitati.	
261 ARCTIUM	Lappa	509
262 SERRATULA	tinctoria	510
	arvenſis	511
263 CARDUUS	lanceolatus	512
	acanthoides	513
	criſpus	514
	paluſtris	515
	acaulis	516
264 CNICUS	oleraceus	517
265 CARLINA	vulgaris	518
266 BIDENS	tripartita *	519
	cernua *	520
267 EUPATORIUM	cannabinum	521

POLYGAMIA SUPERFLUA.

268	TANACETUM	vulgare	522
269	ARTEMISIA	campeſtris	523
		maritima †	524
		Abſinthium	525
		vulgaris	526
270	GNAPHALIUM	arenarium	527
		dioicum	528
		ſylvaticum	529
		uliginoſum	530
271	CONYZA	ſquarroſa	531
272	ERIGERON	acre	532
273	TUSSILAGO	Farfara	533
		Petaſites	534
274	SENECIO	vulgaris	535
		Jacobæa	536
275	ASTER	Tripolium	537
276	SOLIDAGO	Virgaurea	538
277	INULA	Helenium	539
		Brittannica	540
		Pulicaria	541
		ſalicina	542
278	CINERARIA	paluſtris	543
279	ARNICA	montana	544
280	BELLIS	perennis	545
281	CHRYSANTHEMUM	Levcanthemum	546
		ſegetum	547
282	MATRICARIA	Parthenium	548
		maritima *	549
		Chamomilla	550
283	ANTHEMIS	arvenſis	551

283 Anthemis	Cotula	552
	tinctoria	553
284 Achillea	Ptarmica	554
	Millefolium	555

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

285 Centaurea	Cyanus	556
	Scabioſa	557
	Jacea	558

POLYGAMIA NECESSARIA.

286 Filago	germanica *	559
	montana	560
	arvenſis	561

MONOGAMIA.

287 Jasione	montana	562
288 Viola	paluſtris	563
	odorata	564
	canina	565
	tricolor	566
289 Impatiens	noli tangere	567

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

290 Orchis	bifolia	568
	Morio	569
	maſcula	570
	uſtulata	571

290 Orchis	latifolia	572
	maculata	573
	conopſea	574
291 Ophrys	Nidus avis	575
	ovata	576
	Monorchis	577
292 Serapias	Helleborine *	578
	longifolia	579
293 Cypripedium	Calceolus	580

POLYANDRIA.

294 Calla	paluſtris	581
295 Zostera	marina	832

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

DIANDRIA.

296 Lemna	triſulca	582
	minor	583
	polyrrhiza †	584

TRIANDRIA.

297 Typha	latifolia *	585
	anguſtifolia	586
298 Sparganium	erectum	587
299 Carex	pulicaris †	588
	arenaria	589
	uliginoſa	590
	leporina	591
	vulpina	592

299 Ca-

299 Carex	axillaris	593
	flava	594
	filiformis †	595
	limoſa	596
	panicea	597
	Pſevdo-Cyperus	598
	cæſpitoſa	599
	acuta	600
	veſicaria	601
	hirta	602

TETRANDRIA.

300 Betula	alba	603
	Alnus	604
301 Urtica	urens	605
	dioica	606

PENTANDRIA.

302 Xanthium	ſtrumarium	607

POLYANDRIA.

303 Myriophyllum	ſpicatum	608
304 Sagittaria	ſagittifolia	609
305 Quercus	Robur	610
305 Fagus	ſylvatica	611
307 Carpinus	Betulus	612
308 Corylus	Avellana	613

MONADELPHIA.

309 Pinus	ſylveſtris	614
	Abies	615

SYN-

SYNGENESIA.

310	BRYONIA	alba	616

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

311	SALIX	triandra	617
		pentandra *	618
		vitellina †	619
		amygdalina	620
		fragilis	621
		purpurea †	622
		arenaria	623
		incubacea	624
		roſmarinifolia	625
		capræa	626
		viminalis	627
		cinerea	628
		alba	629
		polyandra *	630

TETRANDRIA.

312	VISCUM	album †	631
313	HIPPOPHAE	Rhamnoides	632

PENTANDRIA.

314	CANNABIS	ſativa	633
315	HUMULUS	Lupulus	634

OCTANDRIA.

316 Populus	alba	635
	tremula	636
	nigra	637

ENNEANDRIA.

317 Mercurialis	perennis	638
	annua	639
318 Hydrocharis	Morſus Ranæ	640

MONADELPHIA.

319 Juniperus	communis	641
320 Taxus	baccata	642

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

321 Holcus	lanatus	643
322 Valantia	Cruciata †	644
323 Parietaria	officinalis	645
324 Atriplex	laciniata	646
	haſtata	647
	patula	648
	litoralis	649

325 Acer	Pſevdo-Platanus	650
	Platanoides	651
	campeſtre	652

DIOECIA.

326 Fraxinus	excelſior	653

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

327 Equisetum	ſylvaticum	654
	arvenſe	655
	paluſtre*	656
	fluviatile	657
	limoſum	658
	hyemale	659
328 Ophioglossum	vulgatum	660
329 Osmunda	Lunaria	661
	regalis	662
330 Acrostichum	ſeptentrionale †	663
331 Pteris	aquilina	664
332 Asplenium	Trichomanes	665
	Ruta muraria	666
333 Polypodium	vulgare	667
	Phegopteris †	668
	Filix mas	669
	Filix femina	670

333 Po-

333 POLYPODIUM	fragile	671
	Dryopteris	672
334 ISOETES	lacuſtris	673

MUSCI.

335 LYCOPODIUM	clavatum	674
	Selago	675
	annotinum	676
339 SPHAGNUM	paluſtre	677
337 SPLACHNUM	ampullaceum	678
338 POLYTRICHUM	commune	679
339 MNIUM	pellucidum *	680
	hygrometricum †	681
	ſerpyllifolium	682
	Jungermannia †	683
340 BRYUM.	apocarpum	684
	ſtriatum	685
	pomiforme †	686
	pyriforme	687
	extinctorium	688
	rurale	689
	murale	690
	ſcoparium *	691
	undulatum	692
	truncatulum	693
	viridulum	694
	Hypnoides †	695
	pulvinatum	696
	cæſpiticium	697
	capillare	698

341 HYPNUM	taxifolium	699
	complanatum	700
	triquetrum	701
	rutabulum †	702
	filicinum	703
	proliferum	704
	parietinum	705
	cupreſſiforme †	706
	ſquarroſum †	707
	curtipendulum †	708
	purum	709
	illecebrum	710
	cuſpidatum	711
	ſericeum	712
	velutinum	833
	ſerpens	713

ALGAE.

342 JUNGERMANNIA	aſplenioides †	714
	bidentata *	834
	complanata	715
	dilatata	716
	tamariſci	717
343 MARCHANTIA	polymorpha	718
	hemiſphærica †	719
344 RICCIA	minima †	720
345 LICHEN	ſcriptus	721
	geographicus	722
	rugoſus	723
	ſanguinarius *	724

345 LI-

345 LICHEN fuſco-ater †* 725
Fagineus 726
Carpineus 727
ericetorum * 728
candelarius 729
palleſcens 730
ſubfuſcus 731
centrifugus 732
ſaxatilis 733
olivaceus 734
parietinus 735
phyſodes * 736
ſtellaris * 737
ciliaris 738
pulmonarius 739
furfuraceus 740
farinaceus 741
calicaris 742
fraxineus 743
prunaſtri 744
juniperinus 745
glaucus 746
aphthoſus † 747
caninus 748
cocciferus 749
pyxidatus 750
fimbriatus 751
gracilis † 752
cornutus 753
deformis † 754
rangiferinus 755
ſubulatus † 756

345 LICHEN	plicatus +	757
	barbatus †	758
	jubatus *	759
	chalybeiformis	760
	hirtus	761
346 CHARA	vulgaris	762
	hiſpida	763
347 TREMELLA	juniperina	764
	Noſtoc †	765
	Auricula	766
	hemiſphærica	767
	purpurea	768
348 FUCUS	ſerratus †	769
	veſiculoſus	770
	faſtigiatus	771
	Filum	772
349 ULVA	inteſtinalis	773
	compreſſa †	774
	latiſſima	775
	Linza	776
	granulata †	777
350 CONFERVA	bulloſa	778
	litoralis	779
	gelatinoſa	780
351 BYSSUS	Flos aquæ	781
	phoſphorea	782
	velutina	783
	ſaxatilis †	784
	candelaris	785
	botryoides *	786
	lactea	787

FUN-

FUNGI.

352 Agaricus	Cantharellus	788
	integer *	789
	muſcarius *	790
	dentatus	791
	delicioſus	792
	piperatus †	793
	campeſtris	794
	violaceus	795
	cinnamomeus	796
	equeſtris	797
	campanulatus	798
	Quercinus	799
	Betulinus	800
353 Boletus	ſuberoſus	801
	fomentarius	802
	verſicolor	803
	ſvaveolens	804
	luteus	805
	bovinus †	806
	ſubtomentoſus	807
	ſubſquamoſus *	808
354 Hydnum	paraſiticum *	835
355 Phallus	eſculentus †	809
356 Helvella	Mitra †	810
357 Peziza	lentifera †	811
	punctata †	812
	ſcutellata	813
	cochleata	814
358 Clavaria	digitata *	815

358 Cla-

358 CLAVARIA	Hypoxylon*	816
	faſtigiata*	817
359 LYCOPERDON	Boviſta	818
	ſtellatum †	819
	epidendrum	820
	epiphyllum	821
	ſepium *	822
360 MUCOR	Mucedo	823
	Eryſiphe	824
	ſepticus	825

ERRATA.

In dedicatione.

Pag. 5. Lin. ult. potuerit lege patuerit

No. 75	Lin. 8	*zwi-*	*zwiſchen*
115	2	petatis	petalis
158	1	petiolarum	petiolorum
189	22	*laterc*	*latere*
210	8	Rugiae in	in Rugiae
245	8	*Radgas*	*Raddas*
246	5	varior	rarior
247	5	repretis	vepretis
312	1	ſep - tangulis	ſept - angulis
398	8	*infeſta*	*infeſtum*
459	11	*actus.*	*auctus.*
	13	4 *ad*	4 *ad* 6
517	3	convaris	concavis
534	3	*Laddick*	*Loddick*
665	6	*Stadtmauer*	*Mauer*
718	7	*von*	*vor*
754	3	anitquis	antiquis
761	1	filamentoſus	filamentoſus
781	1	plumoſis	plumoſis
798	2	lamallis	lamellis

INDEX I.

Menyanther	Menyanthes

INDEX II.

Bären			
-- *Traube*		*Traube*	
Bruch			
-- *Weiden*		*Weiden*	
Fett			
-- *Gras*		*Gras*	
Fuchs			
Schwanz		*Schwanz*	
-- *Knoten*		-- *Knoten*	
-- *Wieſen*	41	-- *Wieſen*	42
Gänſe			
-- *Pappeln*		*Pappeln*	
-- *rich*		*rich*	
Gülden Günſel			
kriechender		-- *kriechender*	
Wagmeiſter	633	*Waldmeiſter*	644
Herbſt			
Sternblume		*Sternblume*	
Hirſe			
Meer		-- *Meer*	

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compreſſis emarginato-bifidis.
Hinc *Sal Alcali, (Soda;)* Pharmac.
Habitat in ſalſis litoribus maritimis.
Gryph. *bey den Gradier-Hauſern.*
Floret Junio.

2 HIPPURIS *vulgaris.*
Germ.
Habitat paſſim in fontibus, lacubus, fluviis, ſolo profundo, limoſo, fluente, ubi gelu radices non attingit.
Sund. *Am Voigthäger See beym Schütt. Inter Prohn et Damitz* in prato aquoſo, copioſiſſime.
Floret Aprili.

DIGYNIA.

3 Callitriche *verna* foliis ſuperioribus ovalibus, floribus androgynis.
Germ. *Frühjahrs-Sternbluhme.*
Habitat in foſſis aquoſis, v. g. [Gryph. prope *Hohenmühlen.*] Sund. *am Voigthäger Moor.*
Floret Majo, Junio.

4 Callitriche *autumnalis* foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis.†
Germ. *Herbſt-Sternbluhme.*
Habitat in foſſis aquoſis.

CLASSIS II.

CLASSIS II.
DIANDRIA.

MONOGYNIA.

5 Ligustrum *vulgare.*
Germ. *Reinholz, Mundholz, Hartriegel.*
Habitat in ſylveſtribus rarius.
Sund. *in der Voigthäger Prieſter-Koppel.*
In Jasmundia paſſim.
Floret Junio.

6 Circaea *lutetiana* caule erecto, racemis pluribus.
Germ. *Hexen-Kraut.*
Habitat in umbroſis nemoroſis, ſylvisque.
[Gryph. in foſſa prope viam, qua per ſylvam itur *nach Grubenhagen,* inter *Eldena* et *Kötenhagen.*]
Sund. inter *Elmenhorſt* et *Windbrak* ad dextram in ſylva *Mittelbuſch* dicta.
Floret Junio, Julio.

7 Veronica *officinalis* ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente.
Germ. *Ehrenpreis.* Pharmac. *Veronica.*
Habitat in ſylveſtribus ſterilibus.
[Gryph. *Auf dem Galgenkamp* et ſupra *Hohenmühlen* copioſe.] Sund. *auf dem Devinſchen Ort* et alibi.
Floret Junio.

8 VERONICA *ſerpyllifolia*, racemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris crenatis. †
Germ.
Habitat ad vias, agros, inque paſcuis.
[Gryph. *Neben dem Richtſteige nach Elmshagen.*]

9 VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente.
Germ. *Bachbungen.* Noſtr. *Lünich.* Pharmac. *Beccabunga.*
Habitat ad ſcaturigines, foſſas fluentes. v. g. Sund. *Hinter dem Kœpfenberge* et alibi frequens. Floret Aprili, Majo.

10 VERONICA *Anagallis aquatica* racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto.
Germ. *Waſſergauchheil.*
Habitat ad foſſas inque inundatis.
[Gryph. in foſſa *wenn man nach dem Galgenkamp gehet.*] Sund. *Auf der Weide vor dem Triebſeer Thór* locis inundatis frequens.
Floret Junio.

11 VERONICA *ſcutellata*, racemis lateralibus alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis.
Germ.
Habitat paſſim in inundatis.
[Gryph. in foſſa ſylvatica, qua circumducitur ſylva Hinrichshagenſis verſus *Hohenmühlen.*]
Sund. *Im Moor vor Pütt.* item *auf der Papenhäger Wieſe.*
Pom. In prato ante ſylvam Arbshagenſem verſus *Groſs-Kordshagen* et alibi.
Floret Junio, Julio

12 VERONICA *Chamaedrys* racemis lateralibus, ſoliis ovatis ſeſſilibus rugoſis dentatis, caule debili.

Germ. *Gundermann.*

Habitat in pratis ſiccis, apricis, Pomoeriis, adque pagos frequens, [Gryph. in vallo urbis.] Sund. ad ſepes ſuburbiorum, inque vallo urbis.

Floret Junio.

13 VERONICA *agreſtis* floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus.

Germ.

Habitat in cultis, arvis, ad ſepes.

Floret Julio.

14 VERONICA *arvenſis* floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus.

Germ.

Habitat in arvis, cultis, novalibus, nec non paſcuis frequens.

Floret Majo.

15 VERONICA *hederifolia* floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.

Germ.

Habitat in cultis, ruderatis, ad ſepes ſuburbiorum ubique.

Floret Aprili et ſerius.

16 VERONICA *triphyllos* floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus.

Germ.

Habitat in agris, paſſim frequens.

Floret Aprili.

17 VERONICA *verna* floribus ſolitariis, foliis digitato partitis pedunculo longioribus. †
Germ. *Hændleinkraut.*
Habitat in apricis, juxta agros.
Floret Vere.

18 VERONICA *peregrina* floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto.
Germ.
Habitat in cultis, arvis, haud infrequens.
Floret Majo et ſerius.

19 GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis.
Germ. *Gottes Gnaden-Kraut*, *Erdgalle* Pharm. *Gratiola.*
Habitat in aquoſis rariſſima,
Sund. *vor dem Knieper Thor vor der erſten Bleiche auf der Inſel* copioſe. item *im Graben bey der Allée nach Papenhagen, linker Hand bey der ſiebenden Weide* frequens.
Alibi non viſa.
Floret Julio, Auguſto.

20 PINGUICULA *vulgaris* nectario cylindraceo longitudine petali.
Germ. *Fettkraut.*
Habitat in uliginoſis fere ubique v. g. *Im Voigthäger und Pûtter Moor.*
Floret Junio.

21 UTRICULARIA *vulgaris* nectario conico, ſcapo paucifloro.
Germ.
Habitat in foſſis aquoſis, aquis ſtagnantibus, paludibus,

paludibus, frequens. [Gryph. in paludibus ſylvae *Grubenhagenſis.*] Sund. *Im Voigthæger Prieſter-Moor.* Item *im Moor vor Pütt* et alibi.

Floret Junio, Julio.

22 Utricularia *minor* nectario carinato.

Germ.

Habitat in foſſis aquoſis, paludibus, ſed rarior.

Sund. *im Moor zwiſchen Neegaſs und Seemühlen zur Rechten* paſſim copioſe.

Floret Julio.

23 Verbena *officinalis* tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario.

Germ. *Eiſenkraut, Eiſenhart, Taubenkraut.* Pharmac. *Verbena.*

Habitat in ruderatis, ad ſepes pagorum, viasque, paſſim frequens.

[Gryph. Ad viam publicam prope *Eldena,* copioſiſſima ad vias pagi *Hanshagen.*]

Sund. ad ſepes ſuburbiorum, item *am Steinhæger Kirchhofe,* copioſiſſime.

Floret Junio.

24 Lycopus *europaeus* foliis ſinuato-ſerratis.

Germ. *Waſſer-Andorn.*

Habitat ad ripas lacuum et fluviorum.

[Gryph. *im Wampener Buſch bey der Trift.*]

Sund. *am Franken und Knieper Teich,* et alibi frequens.

Floret Auguſto.

DIGYNIA.

25 ANTHOXANTHUM *odoratum* ſpica ovato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus.

Germ. *Ruchgraſs.* Schreb.

Habitat in pratis paſcuis ubique, verbi gratia. Sund. *auf der Franken Weide*, copioſe.

Floret Aprili, Majo, Junio.

CLASSIS III.
TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

26 VALERIANA *dioica* floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis.
Germ. *Klein Baldrian.*
Habitat in pratis, campis uliginoſis, frequens. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp hinten am Rick.*] Sund. *Am Knieper Mühlen-Graben.* item. *Im Voigthäger Prieſter-Moor* copioſa. item. In prato *zwiſchen dem Lüdershäger Eller-holz und dem Wege von Voigthagen nach Wendorf* copioſiſſima.
Floret Majo. Junio.

27 VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.
Germ. *Baldrian, Gemein-Baldrian.* Pharmac. *Valeriana.*
Habitat in ſepibus, ſylvis & nemoribus paludoſis frequens v. gr. Sund. *Im Haynholz-ſchen Buſch.* item, *Am Strande nach Devin am Ufer.* cop.
Floret Junio.

28 VALERIANA *Locuſta* floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus.
Germ. *Rapünzel, Lämmer-Feld-Lattig, Nüſs-gen-Sallat.*
Habitat in arvis, ripis maritimis elatis, paſſim. [Gryph.

[Gryh. *Gegen Elmshagen um das Mittags-Zeichen, am hohen Ufer zu Ludwigsburg hinter die Redouten.*]

Sund. *Am Strande nach Devin und Parow:* item; *auf dem Retrenchement vor dem Franken Thor zwiſchen der Wache und dem Strande* cop.

Floret Majo, Junio.

29 Iris *Pſeud-Acorus* corollis imberbibus: petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus.

Germ. *Schwertel, gelber Schwertel.* Pharmac. *Acorus paluſtris.*

Habitat ad ripas paludum, foſſarum, lacuum, ubique.

Floret Junio.

30 Scirpus *paluſtris* culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali.

Germ. *Sumpfbinſen.* Schreb.

Habitat in foſſis & inundatis frequens v. gr. Gryph. *Bey den Gradierhäuſern.* Sund. *In der Papenhäger Wieſe.* copioſe.

Floret Junio.

31 Scirpus *cæſpitoſus* culmo ſtriato nudo; ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis.

Germ. *Raaſenbinſen.*

Habitat in paludibus cæſpitoſis, ſylvaticis.

Sund. *Im Moor zwiſchen Neegaſs und Seemühlen zur Rechten* paſſim copioſe.

Floret Junio, Julio.

32 SCIRPUS *lacuſtris* culmo tereti nudo; ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus.
Germ. *Teichbinſen.* Schreb.
Habitat in ſtagnis, lacubus, fluviis frequens, ubique.
[Gryph. in Ricco.] Sund. *Am Knieper Teiche* v. gr. *Bey den Bleichen.*
Floret Junio.

33 SCIRPUS *maritimus* culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata.
Germ. *Seebinſen.* Schreb.
Habitat in litoribus maritimis.
[Gryph, In foſſis *hinter den Gradierhäuſern*] Sund. *Im Moor bey Bauer-Parow am Strande.*
Floret Junio.

34 SCIRPUS *ſylvaticus* culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis.
Germ. *Waldbinſen.* Schreb.
Habitat in aquoſis, ſylvis humentibus, frequ.
[Gryph. *Zu Hohenmühl und Ungnad.*] Sund. *Zwiſchen dem Wege nach Pütt und den Grünhuffſchen Buſch* copioſiſſime in prato aquoſo
Floret Majo, Junio.

35 ERIOPHORUM *vaginatum* culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa.
Germ. *Sumpfdungraſs.* S,
Habitat in paludibus turfoſis, ſterilibus, paſſim frequens.
Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges von Neegaſs*

Neegaſs nach Seemühl copioſe. Item. *Im Voigthäger Prieſter-Moor.*
Floret Aprili.

36 ERIOPHORUM *polyſtachion* culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis.
Germ. *Wollgraſs*, *Wieſendungraſs.*
Habitat cum præcedente frequentius.
Floret Aprili.

37 NARDUS *ſtricta.* ſpica ſetacea recta.
Germ.
Habitat in ſterilibus, duris, campeſtribus frequens v. g. Sund. *In der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee* paſſim copioſe.
Floret Junio.

DIGYNIA.

38 PHALARIS *phleoides* panicula cylindrica ſpiciformi. †
Germ. *Fönichartiger Glanz.* S.
Habitat in verſuris rarior.

39 PHALARIS *arundinacea* panicula oblonga ventricoſa.
Germ. *Rohrartiger Glanz.*
Variat glumis viridibus & rubris.
Habitat ad ripas lacuum & fluviorum, in ſubhumidis, frequens. v. gr. Sund. *Am Knieper Teich* copioſa.
Floret Junio.

40 PANICUM *Crus galli* ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari.

Germ.

Germ. *Grannichtes Hirſegraſs.* Schreb.
Habitat in hortis, cultis.

41 PHLEUM *pratenſe* ſpica cylindrica longiſſima, culmo recto.
Germ. *Wieſen-Fœnich.* S.
Habitat in verſuris & pratis ubique.
Floret Julio.

42 ALOPECURUS *pratenſis* culmo ſpicato erecto, glumis villoſis.
Germ. *Fuchsſchwanz, Wieſen-Fuchsſchwanz.* S.
Habitat in pratis fertilibus ſubhumidis.
Floret Aprili, Majo.

43 ALOPECURUS *geniculatus* culmo ſpicato infracto.
Germ. *Knoten-Fuchsſchwanz.*
Habitat in uliginoſis, inundatis ubique.
[Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund. *Auf der Tribſeer Weide.* Item *in der Papenhæger Wieſe,* & alibi freq.
Floret Junio.

44 ALOPECURUS *paniceus* panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis. †
Germ.
Habitat in hortis, cultis infrequens.

45 MILIUM *effuſum* floribus paniculatis diſperſis muticis.
Germ. *Strauſſigtes Fladdergraſs.*
Habitat in ſylvis, nemoribusque umbroſis paſſim.
[Gryph. In luco Hohenmühlenſi.] Sund. In cæduis ſylvæ Abshagenſis frequens.
Floret Junio.

46 AGROSTIS *ſpica venti* petalo exteriore exſerente ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam.
Germ. *Acker Strauſsgraſs.*
Habitat inter ſegetes copioſiſſima.

47 AGROSTIS *arundinacea* panicula oblonga, petalo exteriore baſi villoſo, ariſta torta calyce longiore.
Germ. *Rohrartiges Strauſsgraſs.*
Habitat in glareoſis, juniperetis paſſim.

48 AGROSTIS *rubra* paniculæ parte florente patentiſſima, petalo exteriore glabro terminato ariſta tortili recurva.
Germ. *Rothes Strauſsgraſs.* S.
Habitat in campis, apricis, v. gr. Sund. *In der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee.*

49 AGROSTIS *canina* calycibus coloratis, petalorum ariſta dorſali recurva, culmis proſtratis ſubramoſis.
Germ. *Braunes Strauſsgras.* S.
Habitat in humidiuſculis.

50 AGROSTIS *capillaris* panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. †
Germ. *Haar-Strauſsgras.* S.
Habitat in umbroſis ſolo fertili. [Gryph. *zu Hohenmühlen.*]

51 AIRA *cærulea* foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-ſubulatis.
Germ. *Blaue Schmielen.*
Habitat in paſcuis aquoſis, cæſpitoſis, uligino-
ſis

ſis frequens. v. gr. Sund. *In der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee.*

52 AIRA *aquatica* foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus.

Germ. *Waſſer-Schmielen.*

Habitat in paſcuis foſſis aquoſis paſſim freq.

Sund. In ſoſſis *vor dem Knieper Thor zwiſchen dem Glacis und der Salpeter-Siederey, wo ehedem das Retrenchement geweſen* copioſiſſima. Rug. in foſſis aquoſis prati *Camp-Wieſe* dicti, prope *Tribberaz.*

Floret Junio, Julio.

53 AIRA *cæſpitoſa* foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi.

Germ. *Raaſen-Schmielen.* S.

Habitat in pratis cultis & fertilibus paſſim.

Sund. *Am Barthſchen Wege, ehe man nach der Vogelſangſchen Brücke kömt, zur Rechten, in den Wieſen* copioſe.

54 AIRA *flexuoſa* foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis.

Germ. *Drat-Schmielen.* S.

Habitat in glareoſis, ericetis, apricis, ſiccis, frequens.

Sund. *In der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee.*

Floret Junio.

55 AIRA *montana* foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore.

Germ.

Germ. *Berg-Schmielen.*
Habitat in apricis, aridis, ericetis, vulgaris.

56 Aira *caneſcens* foliis ſetaceis: ſummo ſpathaceo paniculam inferne obvolvente. †
Germ. *Graue Schmielen.*
Habitat in duris arenoſis ſiccis.
[Gryph. *Zu Hanshagen bey dem Kirchenholz.*]

57 Melica *nutans* petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici.
Germ. *Hangendes Schœngras.* Schreb.
Habitat in ſylveſtribus montoſis rarius.
[Gryph. *Auf dem Galgenkamp,* circa *Hinrichshagen.*] Jasm. *Am Wege von Sagard nach Hagen, zur Rechten.*
Floret Junio.

58 Poa *aquatica* panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus.
Germ. *Waſſer-Viehgras.* S.
Habitat ad ripas lacuum, in foſſis aquoſis, frequens.
[Gryph. *Im æuſſern Stadtgraben beym Fetten Thor am Steg,* worûber *man nach den Galgenkamp gehet.*]
Sund. *Am Knieper Teich.* v. gr. *beym Tribſeer Thor.*
Floret Julio.

59 Poa *trivialis* panicula ſubdiffuſa, ſpiculis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti.
Germ. *Dreyblûthiges Viehgras.* S.
Habitat in paſcuis graminoſis, frequens.
Floret Julio.

60 POA *pratenſis* panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.
Germ. *Fünfblüthiges Viehgras.* Schreb.
Habitat in pratis. [Gryph. *Bey Eldena.*] Sund. *Vor dem Knieper Thor, rechter Hand, zwiſchen dem* Glacis *und der Salpeter-Siederey, an den Graben.*
Floret Junio.

61 POA *annua* panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo.
A) viridis. B) ſpiculis rubentibus.
Germ. *Sommer-Viehgras.* S.
Habitat ad vias vulgaris. Sund. *Auf dem Franken-Glacis* copioſiſſime.
Floret Junio, Julio.

62 POA *compreſſa* panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo.
Germ. *Berg-Viehgras* S.
Habitat in ſiccis, muris, tectis. Gryph. *Auf und an der Stadtmauer,* v. gr. *beym Fleiſcher-Thor.* Sund. *Auf der Stadtmauer,* frequens.
Floret Junio.

63 POA *nemoralis* panicula attenuata, ſpiculis ſubbifloris mucronatis ſcabris, culmo incurvo.
Germ. *Wald-Viehgras.* S.
Habitat in nemoroſis umbroſis [Gryph. *Vorne im Eldenaer Holz, neben dem Wege nach Kætenhagen.* Sund. *Am Barthſchen Wege Kettenhæger Remel.*
Floret Julio.

64 BRIZA *media* ſpiculis ovatis, calyce floſculis (7) breviore.
Germ. *Wieſenzittergraſs.* Schreb.
Habitat in apricis ſiccis, ad vias, frequens.
Floret Junio, Julio.

65 DACTYLIS *glomerata* panicula ſecunda glomerata.
Germ. *Knaulgras* Schreb.
Habitat in cultis, ruderatis, ad vias, in litoribus apricis praeruptis, ubique.
Floret Junio.

66 CYNOSURUS *criſtatus* bracteis pinnatifidis.
Germ. *Gefiedertes Kammgraſs.* Schreb.
Habitat in pratis frequens, & juxta vias.
Floret Julio.

67 FESTUCA *ovina* panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis.
Germ. *Schaaf-Schwingel.* Schreb.
Habitat in collibus apricis aridis ſterilibus, ericetoſis, vulgaris. v. gr. [Gryph. *Auf dem Fuchsberge; zu Ludwigsburg.*] Sund. *In der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee.*
Floret Junio, Julio.

68 FESTUCA *rubra* panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ſexfloris ariſtatis: floſculo ultimo mutico, culmo ſemitereti.
Germ. *Rother-Schwingel.* S.
Habitat in ſterilibus ſiccis.
[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. in litore ſummo inter *Alte-Fæhr* & *Grahl* frequens

iten

item, in pratis *am Barthſchen Wege nach der Vogelſangſchen Brücke.*
Floret Julio.

69 FESTUCA *decumbens* panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, culmo decumbente. †
Germ. *Kriechender Schwingel.*
Habitat in paſcuis paſſim, ad vias publicas rarior. [Gryph. *An der Landſtraſſe nach Hinrichshagen.*]

70 FESTUCA *elatior* panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis, exterioribus teretibus.
Germ. *Wieſen-Schwingel.* Schreb.
Habitat in pratis fertilibus.
Floret Julio.

71 FESTUCA *fluitans* panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis.
Germ. *Manna, Mannaſchwingel.* Shreb.
Habitat ubique in foſſis aquoſis, & paludoſis; hinc inde copioſiſſima. v. gr. Sund. *In einem Soll zwiſchen dem Haynholzſchen und Vogelſangſchen Buſch* copioſiſſima. item *in der Papenhæger Wieſe* & alibi.
Floret Junio.

72 BROMUS *ſecalinus* panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis.
Germ. *Treſp, Rockentreſp.* Sch. Noſtr. *Dreſpel.*
Habitat in agris ſecalinis arenoſis nimius ruricolis inviſus.

73 BROMUS *arvenſis* panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis.
Germ. *Ackertreſp.* Schreb.

Habitat locis ruderatis, ſiccis, ad vias, & margines agrorum, frequens, v. gr. Sund. in vallo urbis.

74 Bromus *tectorum* panicula nutante, ſpiculis linearibus.

Germ.

Habitat in agris ſicciſſimis, ſecalinis & triticeis.

75 Bromus *giganteus* panicula nutante, ſpiculis quadrifloris, ariſtis brevioribus.

Germ. *Hoher Treſp.*

Habitat in ſylveſtribus; adque litora maris paſſim.

Sund. *Am Drigger Ort am Strande* copioſe. item *Am Barthſchen Wege zur Linken im Buſche gegen Grünhuſe.* Witt. *Am Ufer zwi- Vitte und Arcona* copioſe.

Floret Julio.

76 Avena *fatua* paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis ariſtis totis lævibus.

Germ. *Wildhafer.* S.

Habitat in agris inter ſegetes, inque campis ſiccis ſterilibus, paſſim.

Floret Julio.

77 Avena *pratenſis* ſpicata calycibus quinquefloris.

Germ. *Wieſenhafer.* Schreb.

Variat calycibus 5-6-7-9-floris.

Habitat in paſcuis ſiccis, apricis, ruderatis; v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Auf dem Alt-Fæhrſchen Walle, beym Wege*

 nach

nach Guſtow zur Linken copioſe. item *Auf dem Stadt Walle* frequens.

78 ARUNDO *phragmitis* calycibus quinquefloris, panicula laxa.

Germ. *Rohrſchilf.* S.

Habitat in lacubus, piſcinis, foſſis, paludibus. [Gryph. in Ricco.] Sund. *Im Knieper Teich.*

79 ARUNDO *epigejos* calycibus unifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris.

Germ. *Bergſchilf.* S.

Habitat in collibus, aggeribus, agrorumque acervis.

[Gryph. in agris circa *Subſow.*] Sund. *Am Barthſchen Wege.*

80 ARUNDO *Calamagroſtis* calycibus unifloris, culmo ramoſo.

Germ.

Habitat in paludibus graminoſis, foſſis aquoſis nemoroſis, rarior.

Sund. *beym Barthſchen Wege zur linken gegen Grünhuſe im Buſch am Graben.* copioſe.

Floret Julio.

81 ARUNDO *arenaria* calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus.

Germ. *Sandſchilf.*

Habitat in litoribus maritimis arenoſis.

Sund. In ſummo litore prope *Alte-Fæhr* verſus *Poppelviz* frequens.

82 LOLIUM *perenne* ſpica mutica: ſpiculis compreſſis muticis.

Germ. *Perennirender Lülch.* S. Noſtrat. *Dwelk.*

Habitat ad verſuras agrorum, ad vias, inque

 pratis

pratis, paſcuis, ſolo fertili argilloſo haud infrequens.

83 LOLIUM *temulentum* ſpica ariſtata: ſpiculis ariſtatis compreſſis.

Germ. *Taumel-Lûlch.* S.

Habitat in agris inter Hordeum & Linum.

Floret Junio.

84 ELYMUS *arenarius* ſpica erecta arcta, calycibus tomentoſis floſculo longioribus.

Germ. *Flugſandgraſs.* Schreb.

Habitat ad litora marina, in arena alba, mobili. [Gryph. *Bey Wampen und auf dem Streng.*] Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow, auf dem Parowſchen Haken.* item *zwiſchen Barhœft und Zarentin.* Rug. *Auf den Ralswykſchen Dûnen bey Ahlbek* cop. Jaſm. *Am Strande zwiſchen Liſchow und Vorwerk.* Witt. *Am Strande bey Drewolk.*

Floret Julio.

85 HORDEUM *murinum* floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis.

Germ. *Mauſe-Gerſte.* Schreb.

Habitat in aggeribus urbium, ruderatis, ad vias, ubique, v. gr. Sund. in vallo urbis *zwiſchen dem Küter und Triebſeer-Thor.* copioſe.

86 TRITICUM *repens* calycibus ſubulatis quadrifloris acuminatis.

Germ. *Quækgraſs. Quækweitzen.* Schr. Noſtr. *Quæken,* Pharmac. *Gramen.*

Habitat in cultis; vix exſtirpanda.

TRIGYNIA.

87 HOLOSTEUM *umbellatum* floribus umbellatis. Germ.

Habitat in collibus ſiccis apricis paſſim copioſe. [Gryph. In vallo urbis meridiem verſus, *beym Fleiſcher Thor.* copioſiſſime.] Sund. *Am Wege nach Voigdthagen linker Hand gleich hinter dem Kœpfenberge.* item *Am hohen Graben jenſeits des Grabens linker Hand, bey der hohen Brücke.* copioſe.

Floret Aprili.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

88 Scabiosa *Succiſa* corollulis quadrifidis æqualibus caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.

Germ. *Abbiſs, Teufelsabbiſs.* Pharmac. *Morſus Diaboli.*

Habitat in pratis, paſcuis, ſylveſtribus humidiuſculis frequens. v. gr. [Gryph. in collibus *zu Klein-Zaſtrow.*] Sund. *Am VVege von Neegaſs nach Seemûhlen zur Rechten im Moor* copioſe & alibi.

Floret Julio.

Varietatem foliis radicalibus hirſutis, caulinis nullis, vel duobus minimis, ſcapo ſimpliciſſimo vix palmari, *frequentem legi in Rugia auf der VVeide zwiſchen Trent und Libniz.*

89 Scabiosa *arvenſis* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis pinnatifidis: lobis diſtantibus.

Germ. *Apoſtem Kraut, Scabioſen.* Pharm. *Scabioſa.*

Habitat juxta ſegetes, inque pratis haud infrequens.

Floret Junio, Julio.

90 Scabiosa *Columbaria* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis ſetaceis pinnatis.

Germ.

Habi-

Habitat in ſiccioribus, collibus apricis rarior.
[Gryph. in colli & ſiccis ante ponticulum juxta viam qua itur ad *Klein-Zaſtrow*.] Pom. ad viam publicam qua itur Sundiâ Tribbeſeam, ultra pagum *Drechow* paſſim. Circa Sundiam non reperi.
Floret Iulio, Auguſto.

91 SCABIOSA *ochroleuca* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis linearibus pinnatis, radicalibus bipinnatis, petiolis perfoliatis.
Germ.
Habitat in ſiccis, elatis, rarior apud nos planta.
Jaſm. *An den Uſern der Stubbenitz* paſſim copioſiſſime: Rug. *In der Ralſewyker Heide am VVege von Bergen nach der Jaſmundiſchen Fæhre;* nec alibi viſa.
Floret Julio.
Obſ. Planta (*mihi*) Foliis radicalibus *ovatis, obtuſis, crenatis, petiolatis, pubeſcentibus;* caulinis *oppoſitis, (petiolorum baſibus perfoliatis vaginantibus, vaginis pubeſcentibus)* infimis *pinnatis, pinnis inciſis, extima majori ovata obtuſa crenata:* ſequentibus *pinnatis, pinnis pinnatifidis, pinnulis acutis linearibus;* ſummis *pinnatis, pinnis acutis linearibus.* Caulis *ſimplex, vix uno alterove ramulo inſtructus,* Pedunculis *longis, ſtriatis, prope florem pubeſcentibus.* Flores *pallide cœrulei.*

92 SHERARDIA *arvenſis* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.
Germ.

Habitat in agris, novalibus, rarior circa Sundiam Gryphiamque; frequentior in Jaſm.
Floret Julio.

93 ASPERULA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis.
Germ. *VValdmeiſter, Sternleber-Kraut.* Pharm. *Matriſylva.*
Habitat in ſylvis, umbroſis. v. gr. [Gryph. *Im Eldenaer Holze zur rechten des VVeges nach Kœtenhagen* copioſiſſime.] Sund. *An der Voigthæger Prieſter Trift zur rechten.* item *im Abshæger Holz* frequens. Jaſm. *in der Stubniz beym Kœnigſtuhl* & aliis locis copioſiſſima.
Floret Junio, Julio.

94 GALIUM *paluſtre* foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffuſis.
Germ.
Habitat in rivulis limoſis, paludibus frequens v. gr. [Gryph. inter *Hohenmûhlen & Elmshagen.*] Sund. *Im Pûtter Moor.* item *in der Papenhæger VVieſe* copioſe & alibi.
Floret Junio, Julio.

95 GALIUM *uliginoſum* foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus.
Germ.
Habitat in campis humidiuſculis, paſcuis aquoſis.
Floret Junio.

96 GALIUM *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus.

Germ.

Germ. *Meyenkraut, Lab-Kraut, unſer Frauen Bettſtroh, VValdſtroh.* Pharmac. *Galium luteum.*

Habitat in pratis ſiccis, graminoſis, ad viarum agrorumque margines frequens. v. gr. Sund. *Am Alt-Fahrſchen VVall.* item, *am Barthſchen VVege.* item, *vorm Knieper Thor* & alibi,

Floret Majo, Junio.

97 Galium *boreale* foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis.

Germ. *VVeiſsmeyenkraut,*

Habitat in pratis humidis, ſterilibus.

Pom. prope *Barth im Satelſchen Moor;* circa Sundiam a me non repertum.

Floret Julio.

98 Galium *Aparine* foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis fructo hiſpido.

Germ. *Klebkraut, Zaunreiſs, Klebrich.*

Habitat in cultis, ruderatis, ad ſepes ubique.

Floret Junio, Julio.

99 Plantago *major* foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis.

Germ. *VVegerich, VVegeblat.* Pharmac. *Plantago latifolia*

Habitat in viis, hortis ubique & in pratis.

Floret Junio & ſerius.

100 Plantago *media* foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti.

Germ. *Kleiner VVegerich.*

Habitat in paſcuis ſterilibus argilloſis apricis.

Sund.

Sund. *Auf der Franken VVeide bey der Hælle.* item, *Auf den Devinſchen Ort* copioſa & alibi.
Floret Julio, Auguſto.

101 PLANTAGO *lanceolata* foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato.
Germ. *Schmaler VVegerich.*
Habitat in campis ſterilibus, juxta vias & agros ubique.
Floret Majo, Junio.

102 PLANTAGO *maritima* foliis ſemicylindraceis integerrimis: baſi lanatis, ſcapo tereti.
Germ. *See-VVegerich.*
Habitat in litoribus marinis ſabuloſis frequens. v. gr. [Gryph. pone *VVampen.*] Sund. *Auf der VVeide vor dem Franken Thor, bey der Schinder-Brücke* copioſe. item, *Am Drigger Ufer gegen den Devinſchen Ort, über* copioſiſſime & alibi.
Floret Julio

103 PLANTAGO *Coronopus* foliis linearibus dentatis, ſcapo tereti.
Germ.
Habitat in maritimis paſſim frequens. v. gr. Sund. *Auf der Franken VVeide* cum præcedente. item, *Am Drigger Ufer gegen dem Devinſchen Ort über* frequentiſſime.
Floret Julio; Auguſto.

104 SANGUISORBA *officinalis* ſpicis ovatis.
Germ. *Blutkraut, VViesenknæpfe, Biebernell.* Pharmac. *Pimpinella Italica.*
Habitat in ſiccioribus rariſſima. Semel legi in *VVittowiæ* litore *Arcona* dicto.

105 COR.

105 CORNUS *ſanguinea* arborea, cymis nudis. †
Germ.
Habitat in arbuſtis & dumetis.

106 ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis.
Germ. *Sinau, Lœwenfuſs.* Pharmac. *Alchemilla.*
Habitat in paſcuis, ſiccis paſſim. v. gr. [Gryph: *zu Ludwigsburg oben im Elmshæger Holz nach Höhenmühlen hin.*] Sund. *Am Ufer bey Barhœft* & alibi rarior. Rug. prope *Bergen* in monte *Rüdigard* dicto, copioſe.
Floret Majo, Junio.

DIGYNIA.

107 CUSCUTA *europaea* floribus ſeſſilibus.
Germ. *Frauenhaar, Flachsſeide.* Pharmac. *a*) *Cuſcuta b*) *Epithymum.*
Habitat *a*) in fruticibus, nec non Urtica, Lupulo, Cannabi, paraſitica. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp* in vepretis ad foſſam, quae eſt inter agrum et arbuſta.] Sundiae *in der Voigthæger Prieſter Trift, rechter Hand*, item *im Haynholzſchen Buſch.* *b*) *Epithymum* nondum reperi.
Floret Junio.

TETRAGYNIA.

108 ILEX *Aquifolium* foliis ovatis acutis ſpinoſis.
Germ. *Stechpalmen.* Noſtrat. *Hülſen-Buſch.*
Habitat in ſylvis paſſim frequens ſolo ſterili glareoſo.

[Gryph.

[Gryph. In ſylva Eldenaenſi.] Sund. *im Steinhæger Holz*, item *im Abshæger VValde.* Iasmund. *am Ende der ſchmalen Heide nach Iasmund zu, am VVege nach Reez* frequens adultior. Floret Junio.

109 POTAMOGETON *natans* foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus.

Germ. *Saamkraut, flieſſend Saamkraut, VVeyer-Blætter.*

Habitat in lacubus, foſſis aquoſis v. gr.

[Gryph. in Ricco.] Sund. *im Knieper Teiche* et alibi frequens. Floret Julio.

110 POTAMOGETON *perfoliatum* foliis cordatis amplexicaulibus.

Germ. *durchgeWachſenes Saamkraut*

Habitat in lacubus argillofis.

Sund. *im Andershæſſchen und Voigthægenſchen Teich* copioſe; alibi minus frequens,

111 POTAMOGETON *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus.

Germ. *Klar Saamkraut.*

Habitat in lacubus, ſtagnis, fluviis argilloſis infrequens.

[Gryph. in piſcina *zu Hohenmühlen.*]

Sund. *im Knieper Teich*, item *im Andershæfſchen Teich.*

112 POTAMOGETON *Criſpum* foliis lanceolatis alternis undulatis ſerratis.

Germ. *Krauſs-Saamkraut.*

Habitat in lacubus, foſſis, et rivulis.

Sund. *im Knieper Teich* copioſiſſimum.

Floret Junio.

113

113 POTAMOGETON *marinum* foliis linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus.

Germ. *See-Saamkraut.*

Habitat in mari Balthico verſus litora. v. gr. Sund. *im Strande vor dem Knieper Thor*, et alibi frequens.

Floret Julio.

114 POTAMOGETON *puſillum*, foliis linearibus oppoſitis, alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti. †

Germ. *klein Saamkraut.*

Habitat [Gryph. in paludibus paſſim et in inundatis Ricco adjacentibus.]

115 SAGINA *procumbens* ramis procumbentibus, petatis breviſſimis.

Germ.

Habitat in paſcuis ſterilibus apricis frequens, v. g. [Gryph. juxta agrum et prope pratum inundatum *bey Hohenmühlen.*] Sund. *in der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee.*

Floret Junio.

CLASSIS V.
PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

116 Myosotis *ſcorpioides* ſeminibus nudis: foliorum apicibus calloſis.
(A) *arvenſis* foliis hirſutis.
Habitat in campis, arvis, aridis ubique.
(B) *paluſtris* foliis glabris.
Germ. *Vergiſs mein nicht.*
Habitat in aquoſis, ſcaturiginoſis, paluſtribus frequens.
(C) minima, floſculis ſubluteis.
Habitat in campis apricis ſterilibus ſiccis, v. g. Sund. *Auf der Franken Weide gegen dem Kœpfenberge, nach dem Strande zu, am Ufer.*
Floret Junio.

117 Lithospermum *officinale* ſeminibus lævibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis.
Germ. *Steinſaame, Steinhirſe, Meerhirſe.* Pharmac. *Lithoſpermum.*
Habitat in glareoſis, ſiccis, ruderatis, paſſim copioſe.
[Gryph. *An der Stadtmauer* & in vallo.] Sund. *Am Andershœſſchen See bey der Hœlle am Bollwerk.* Pom. *Auf dem Loitzer Schloſs-Platze* copioſiſſime.
Floret Junio, Julio.

118

118 LITHOSPERMUM *arvenſe* ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus.
Germ. *Acker-Steinſaame.*
Habitat in agris & arvis frequens. Gryph. & Sund. *Auf den VVællen.*
Floret Aprili, Majo.

119 ANCHUSA *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis.
Germ. *Ochſenzunge, rothe Ochſenzunge.* Pharmac. *Bugloſſa.*
Habitat in ruderatis, ad vias, agros. v. gr. [Gryph. *Zu Hanshagen* & *auf dem Kirchhofe zu Neuenkirchen.*] Sund. *Auf dem Voigthæger Kirchhofe.* Item *Auf dem Altfæhrſchen VValle*, item *am Devinſchen Ort.* & alibi.
Floret Junio.

120 CYNOGLOSSUM *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus.
Germ. *Hunderzunge.* Pharmac. *Cynogloſſa.*
Habitat in ruderatis, ad vias, pagos, locis argilloſis ubique.
Floret Junio.

121 PULMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris.
(A) foliis maculoſis.
Germ. *Fleckigtes Lungenkraut.* Pharmac. *Pulmonaria maculoſa.*
Habitat in ſylvaticis, nemoroſis, rarior.
Pom. *Im Læbnitzer Holz.* Prope *Barth im Zattelſchen Buſch* copioſe.
(B) foliis non maculoſis.

C Germ.

Germ. *Lungenkraut.*
Habitat in nemoribus frequentior, v. g. [Gryph. *Zu Hohenmühlen* & ſylva Grubenhagenſi locis ſubhumidis.] Sundiæ *Im Haynholzſchen Buſch* copioſe & *vor dem Devinſchen Ort auf dem Ufer* ſub fruticibus. Jaſm. *In dem Borowſchen Bach*, & prope Sagard *an dem hohlen VVege nach dem Tœpferberge.*
Floret Aprili, Majo.

122 Symphytum *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus.
Germ. *Schwarzwurz, Beinwelle, VVallwurz.* Pharmac. *Conſolida major.*
Habitat in umbroſis, humidis, aquoſis, foſſis, ad ripas lacuum graminoſas, ubique; variat flore albo, purpureo & cœruleo.
Floret Majo, Junio.

123 Asperugo *procumbens* calycibus fructus compreſſis.
Germ. *Zaunreiſs.*
Habitat in ruderatis, ad pagos, & ſepes ſuburbiorum frequens. v. gr. Gryph. *Vor dem Fleiſcher Thor.* Sund. *Auf dem Tribſeer Damm.*
Floret Junio & ſerius.

124 Lycopsis *arvenſis* foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis.
Germ. *Schminkwurz.*
Habitat in agris ubique.
Floret Majo, Junio.

125 Echium *vulgare* caule tuberculato-hiſpido, foliis

foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus.

Germ. *VVilde Ochſenzunge, blaue Ochſenzunge.* *Variat floribus albis ſed rarius.*

Habitat ad vias & agros.

[Gryph. rarius; *zu Griebenow vor dem Schloſſe* ad viam publicam Gryphiam inter & Sund.] Circa Sundiam frequens v. gr. *Auf dem Knieper Kirchhofe.* Item *vor dem Kœpfenberge, zur Rechten,* item *am VVege nach Steinhagen* copioſe & alibi. Rug. *Am VVege bey Rothenkirchen.*

Floret Junio, Julio.

126 Primula *veris officinalis* foliis dentatis rugoſis, limbo corollarum concavo.

Germ. *Schlüſſelblume, Schlagkraut.* Pharmac. *Primula veris.*

Habitat in pratis, nemoroſis paſſim copioſe.

[Gryph. *An den Græben im Eldenaiſchen Holze nahe bey dem VVege nach Kætenhagen.*]

Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* & in litore *des Devinſchen oder Nonnen-Sees an der Devinſchen Seite.* Item *am Ufer* inter *Zarrentin* & *Barhœft.* copioſe.

Pom. Haud procul a *Barth* prope villam *Zattel* in nemore *Steinbrings Buſch* dicto. cop.

Jasm. *Im Hagenſchen Gehege* copioſe. Item *am Ufer in der Gegend von Stubbenkammer* paſſim frequens.

Witt. *bey Arcona.*

Floret Aprili, Majo.

127 PRIMULA *farinoſa* foliis crenatis glabris, florum limbo plano.

Habitat in campis ſterilibus humidiuſculis, rariſſima.

Sund. *Am Franken Retrenchement von der Wache gegen dem Franken Teich zu in einer Baſtion* ſolo humidiuſculo. Nos Pom. *Am Wege von Barth nach Planitz beym Galgenberge.* Th. Pyl. *Med. Cultor.*

Floret Majo, rarius Aprili.

128 MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis.

Germ. *VVaſſer-Dreyblatt, Bieberklee, Sumpfklee.* Noſtr. *Dreyblatt.* Pharm. *Trifolium aquaticum.*

Habitat in paludibus, foſſis aquoſis, pratis ubique. v. g. [Gryph. *Zwiſchen dem Fleiſcher und Fetten Thor;* copioſiſſima *hinter der letzten Mühle* etc.]

Sund. *Am Knieper Mühlengraben* frequens. Item *am Franken Teich gegen der VVeide zwiſchen dem Franken und Tribſeer Thor* copioſiſſima & alibi.

Floret Junio.

129 HOTTONIA *paluſtris* pedunculo verticillato-multifloro.

Germ. *VVaſſer-Viole.*

Habitat in paludibus, præcipue pratenſibus, ſtagnis, foſſis aquoſis, frequens.

Floret Junio, rarius Majo.

130 LYSIMACHIA *vulgaris* paniculata, racemis terminalibus.

Germ. *Gelber VVeiderich.*

Habitat ad ripas & paludes. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Voigthæger Moor*, item *Papenhæger VVieſe* & alibi frequens.

Floret Junio, Julio.

131 LYSIMACHIA *thyrſiflora* racemis lateralibus pedunculatis.

Germ. *VVaſſer-VVeiderich.*

Habitat in aquoſis, paludoſis paſſim frequens. [Gryph. *Im Stadtgraben hinter dem* Collegio.] Sund. *vor dem Tribſeer Thor, hinter dem zweyten Thor, wo die Scheide zwiſchen dem Knieper und Franken Teiche iſt*, item, *an der Inſel, die im Knieper Teich vor der erſten Bleiche iſt* copioſiſſime, item, *im Graben bey der Allée nach Papenhagen zur Linken*, copioſe. item, *vor Neegaſs im Buſche* & alibi.

Floret Junio.

132 LYSIMACHIA *nemorum* foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente.

Germ. *VVald-VVeiderich.*

Habitat in ſylvis, nemoribus rarior.

Rug. *Im Boldevizzer Holze*, item, *am VVege von Bergen nach der Jasmundſchen Fæhre* in quodam nemore. Jasm. *In der Stubbenitz* paſſim frequens ſolo humidiuſculo.

Floret Junio, Julio.

133 LYSIMACHIA *Nummularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente.

Germ. *Egelkraut*, *Pfennigkraut.* Pharmac. *Nummularia.*

Habitat in umbroſis, ſylvaticis, ſolo humido.

[Gryph. *Im Eldenaer Holze nicht weit vom Hofe.*] Sund. *Im Abshæger Holze hinter des Heide-Reuters Wohnung* copioſiſſima. Item *am Franken Teich.*

Floret Julio.

134 Anagallis *arvenſis* foliis indiviſis, caule procumbente.

Germ. *Gauchheil, Grundheil.*

Habitat in agris, novalibus frequens.

In ſolo fertiliori major evadit ſimillima A. latifoliæ *excepto colore corollarum, quin & contigit legere varietatem* foliis oppoſitis, ternis cordatis amplexicaulibus magnis & latis, pedunculisque ternis, *licet rarius.*

Floret Junio.

135 Convolvulus *arvenſis* foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris.

Germ. *Ackerwinde, kleine VVinde.* Noſtrat. *VVeedwinde.*

Habitat in agris, litoribus, apricis limoſis frequens. v. gr. Sund. *Beym* Knieper *Brunnen,* item, *am See-Ufer vorm* Knieper *Thor bey der Redoute* & alibi frequens.

Floret tota æſtate.

136 Convolvulus *ſepium* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris.

Germ. *Zaunwinde, Zaunglocken.*

Habitat in ſepibus ubique, v. gr. Gryphiæ & Sundiæ ad ſepes ſuburbiorum.

Floret Auguſto.

137 CAMPANULA *rotundifolia* foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.

Germ. *Glœcklein.*

Habitat in paſcuis frequens, nec non in pratis & ad margines agrorum.

Floret Julio, Auguſto.

138 CAMPANULA *patula* foliis ſtrictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula.

Germ.

Variat floribus purpuraſcentibus & albis.

Habitat in nemoroſis, vepretis, paſſim frequ. v. gr. Sund. *Im Buſch vor* Klein-*Kordshagen*, item *in der Voigthæger Prieſter-Trift* & al.

Floret Junio.

139 CAMPANULA *perſicifolia* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis.

Germ. Noſtr. *Glockenblume.*

Habitat in dumetis, aſperis, juniperetis, ericetis, infrequens.

Sund. *In der Heide vor Brandshagen, rechter Hand bey den Hügeln.* Jasm. in litoribus inter pagos Saſſeniz & Criviz paſſim.

140 CAMPANULA *rapunculoides* foliis cordato-lanceolatis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis, calycibus reflexis.

Germ.

Habitat in pratis ſiccis, dumetis, aliisque locis aridis, paſſim.

Sund. *Beym Haynholz, auf der Wieſe vor der Vogelſtange*, item *auf dem Ufer zwiſchen Alte-Fæhr und Grahl.*

Floret Julio.

Caulis *ſimplex, uno alterove ramulo inſtructus, ſulcatus, vix hiſpidus.* Folia *ovato-lanceolata, ſeſſilia, (infima rarius ovato-petiolata) inæqualiter ſerrata, ſcabra.* Flores *ſparſi, diſpoſiti in racemum ſimplicem, ſubſecundum, foliatum, cernui, pedicellis brevibus. Ad ortum ſingulorum pedicellorum ſingula folia, quorum* ſuperiora *ſenſim minora, anguſtiora,* ſumma *minima, lanceolata, integerrima.* Calyces *ſcabri, reflexi.* Corollæ *cæruleæ, interne nudæ, infundibuliformes, ſupra dimidiam partem quinquefidæ.*

141 CAMPANULA *Trachelium* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis.

Germ.

Habitat in nemoribus, ſepibus.

Floret Julio.

Folia *hiſpida ut caulis.* Corollæ *interne hirſutæ. Variat pedunculis ſimplicibus, corollis interne nudis.*

142 CAMPANULA *glomerata* caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali.

Germ.

Habitat in aridis, elatis, paſſim.

[Gryph. *Im Helmshæger Holz nach dem Pottkruge hin.*] Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* copioſe. Pom. *Auf der alten Burg vor Barth*

Floret Junio, Julio.

143 PHYTEVMA *ſpicata* ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis.

Germ.

Habitat

Habitat in Jasmundiæ ſylva montoſa *Stubbenitz* dicta. v. gr. *Auf dem Kœnigſtuhl und am Stege von da nach dem Strande* frequ. item *bey Saſſeniz im Lenzer Buſch.*
Floret Junio, Julio.

144 Lonicera *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis.
Germ. *Waldwinde, Alfranken.*
Habitat in ſylvis, fruticetis frequens. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *in der Andershæſſchen Koppel* copioſiſſime.
Floret Julio.

145 Lonicera *Xyloſteum* pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus.
Germ.
Habitat in litoribus Jasmundiæ inter pagos *Saſſeniz* & *Kriviz* paſſim frequens. v. gr. *Am Stege beym Kœnigſtuhl, und unten am Ufer beym Kœnigſtuhl* copioſe.
Floret Junio.

146 Verbascum *Thapſus* foliis decurrentibus utrinque tomentoſis.
Germ. *Wollkraut, Kœnigskerze, Fackelkraut.* Pharmac. *Verbaſcum* (Folia.)
Habitat in glareoſis ſterilibus rarius.
Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* paſſim. *Auf dem Dænholm.*
Floret Junio & ſerius.

147 Verbascum *nigrum* foliis oblongo-cordatis petiolatis.

Germ. *Wegkerze, Braunwurz.* Pharmac. *Verbaſcum* (Radix. Flores.)

Habitat ad pagos, vias, inque ſylvis cæduis, nemoribusque aſperis paſſim frequens.

[Gryph. *Zu Derſchow.*] Sund. *Auf dem Ufer des Voigthæger Teiches, an der Seite wo die Mühle iſt*, item *am Ufer zwiſchen Altefehr und Grahl*, item *im Buſch bey Grünhuſe* & alibi.

Floret Junio, Julio.

148 DATURA *Stramonium* pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris.

Germ. *Stechapfel, Dornapfel.*

Habitat in ruderatis v. gr. in ſuburbiis inter urbium rejectamenta; copioſiſſimum *zu Guſtow zwiſchen dem Baakenberge und dem Hoſe zur Linken am Kuhberge* & ibidem *am Kirchhofe.*

Floret Junio.

149 HYOSCYAMUS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus.

Germ. *Dollkraut, Bilſenkraut.* Noſtr. *Dullbillerkrut.* Pharm. *Hyoſcyamus.*

Habitat in ruderatis pinguibus ubique frequens. Floret Julio, Auguſto.

150 SOLANUM *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis.

Germ. *Je længer je lieber. Hindſchkraut.* Ph. *Dulcamara.*

Habitat in foſſis, ad ripas lacuum, locisque humentibus nemoroſis.

[Gryph.

[Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund. *Am Knieper und Franken Teich.* item, *im Haynholzſchen Buſch* & alibi.

Floret Junio.

151 SOLANUM *nigrum vulgatum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus.

Germ. *Nachtſchatten*, *Saukraut.* Pharmac. *Solanum.*

Habitat in hortis, cultis, ad pagos, & vias ubique frequens.

Floret æſtate.

152 RHAMNUS *catharticus* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis.

Germ. *Creuzbeer*, *Wegdorn.* Pharmac. *Spinæ cervina.*

Habitat in ſepibus, dumetis paſſim.

[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Am Ufer zwiſchen Barhœft und Zarrentin.* Jaſm. prope *Sagard* in colli *Dubberwort* dicto copioſe. item *An den Ufern der Stubbeniz.* v. gr. *beym Fuſteige vom Kœnigſtuhl herunter nach dem Strande* frequens.

Floret Junio.

153 RHAMNUS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.

Germ. *Pinnholz*, *Faulbaum*, Noſtrat. *Sprikker.* Pharmac. *Frangula.*

Habitat in nemoroſis, humidiuſculis, v. gr. Sund. *in der Andershöfiſchen Koppel*, item *zwiſchen dem Voigthäger Prieſter-Moor und dem*

dem Wege von Voigthagen nach Devin im Kaalholz et alibi haud infrequens.
Floret Majo, Junio.

154 EVONYMUS *Europaeus* floribus plerisque quadrifidis.
Germ. *Spillbaum, Spindelbaum.*
Habitat in ſepibus, dumetis paſſim.
[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *am hohen Graben*, item *in der Andershöffſchen- und Voigthæger Prieſter-Koppel.*
Floret Junio.

155. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis.
Germ. *Iohannisbeeren.* Pharmac. *Ribia.*
Habitat in ſylvis rarius.
Sund. *vor Elmenhorſt zur Rechten am Wege, und im Holze* copioſe. Noſ. Iasmund. *im Moor in der Gräflich Brahiſchen Woſtevizzer Koppel am Bach. M. Willich.*
Floret Aprili, Majo.

156 RIBES *alpinum* inerme, racemis erectis, bracteis flore longioribus.
Germ. Noſtrat. *Schmargeln, Schmarten.*
Habitat in Rugiae et Iasmundiae nemoroſis, ſiccis elatis.
Rug. prope *Bergen im Raddas*, item *am Wege von Bergen nach der Iasmundiſchen Fehre.*
Iasm. *an den Ufern der Stubbenitz*, Noſ. item prope *Sagard an der Middelbæck* copioſe: et alibi. *M. VVillich.*
In Pomerania nondum viſum.
Floret Majo, Junio.

157 RIBES *nigrum* inerme, racemis piloſis, floribus oblongis.
Germ. *Gichtbeerbaum*, *Gichtbeeren.* Pharm. *Ribia nigra.*
Habitat in nemoroſis, humidis frequens. v. gr. [Gryph. in foſſa Hinrichshagenſi, *und auf dem Galgenkamp.*]
Sund. *am Voigthæger Teich an der Seite nach Zitterhagen* copioſe, item *in der Anderſhöffschen Koppel, vor dem Lüdershæger Ellerholze*, et alibi.
Floret Aprili, Majo.

158 RIBES *Groſſularia* ramis aculeatis, petiolarum ciliis piloſis, baccis hirſutis.
Germ. *Rauhbeeren.*
Habitat in ſylveſtribus rariſſima.
Sund. *in der Voigthæger Prieſter Koppel.*
Floret Maji initio.
Baccae *hirſutae pilis brevioribus, quam in ſativa*, ſetae *ad latera petiolorum ſubpennatæ.* Folia *tenerrime villoſa, molliſſima.* Bracteae *diphyllæ; altero majori.*

159 RIBES *Uva criſpa* ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla.
Germ. *Stachelbeeren.* Noſtr. *Stikkelbeeren.*
Habitat in ſepibus paſſim, forte ex hortis auſuga; et in ſylvis. v. gr. Iasm. *in der Stubbenitz, am Ufer zur Rechten des Kænigſtuhls beym Fuſsſteige*, rarius.
Floret Aprili.

160 HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque.

Germ. *Epheu.* Noſtr. *VVintergrûn.* Pharm. *Hedera arborea.*

Habitat in ſylvis frequens. v. gr. [Gryph. in ſylva Grubenhagenſi et Eldenaenſi.] Sund. *in der Andershœſſchen Koppel* copioſe, et alibi.

Floret Autumno.

161 Glaux *maritima.*

Germ. *Milchkraut.*

Habitat in maritimis, ſalſis, frequens: v. gr. [Gryph. *auf dem Roſenthal.*] Sund. *am Strande vor dem Knieper Thor, und bey der Reiſerbahn,* item *am Franken Retrenchements-Graben linker Hand des Weges* et alibi.

Floret Junio Julio.

DIGYNIA.

162 Asclepias *Vincetoxicum* foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis.

Germ. *Schwalbenwurz.* Pharmac. *Hirundinaria.*

Habitat in ſiccis ſterilibus.

[Gryph. *Auf dem Streng,* inter *Wampen* continentem & inſulam *Kooſs.*] Rug. *Auf der ſchmalen Heide, und in der Prora.* Jaſm. in litoribus inter pagos *Saſſeniz* & *Kriviz,* v. gr. *Bey dem Kieler-Bach, bey Trip-Ort, bey der Fahrniz* & alibi frequens. Witt. in ſummo litore inter *Gore* & *dem Gorſchen Brunnen,* copioſiſſime. Sundiæ a me non reperta.

Floret Julio, Auguſto.

163 Herniaria *glabra* glabra herbacea.

Germ.

Germ. *Bruchkraut, Harnkraut.* Pharmac. *Herniaria.*

Habitat in apricis, ſiccis, glareoſis, ericetis frequens. v. gr. [Gryph. *Zu Ludwigsburg auf der Strandweide.*] Sund. *In der Heide zwiſchen Voigthagen und Zarndorf,* & *auf dem Devinſchen Ort.*

Floret Majo, Junio.

164 CHENOPODIUM *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis.

Germ. *Stolzer Heinrich, Guter Heinrich, Schmirgel.* Pharm. *Bonus Henricus.*

Habitat in ruderatis, ad pagos, juxta parietes, muros ubique.

Floret Majo, Junio.

165 CHENOPODIUM *urbicum* foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis.

Germ.

Habitat ad pagos & plateas infrequens.

166 CHENOPODIUM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis folioſis caule brevioribus.

Germ. *Rothe Melthe.* Pharmac. *Atriplex ſylveſtris.*

Habitat in cultis, ruderatis, fimetis. Sund. *Hinter die Hecken am Stadtgraben zwiſchen dem Küter und Tribſeer Thor* copioſiſſime.

167 CHENOPODIUM *murale* foliis ovatis nitidis acutis dentatis, racemis ramoſis nudis.

Germ.

Habi-

Habitat in ruderatis, aggeribus, adque muros paſſim. Sund. *Hinter die Hecken zwiſchen dem Kûter und Tribſeer Thor.*

168 CHENOPODIUM *album* foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris; ſummis oblongis, racemis erectis. †

Germ. *Weiſſe Melthe* Rupp. Ien.

Habitat paſſim in agris, cultis, ruderatis.

169 CHENOPODIUM *viride* foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis.

Germ. *Grüne Melthe.*

Habitat in cultis, ruderatis, oleraceis, locisque fertilibus nimium abundans.

Floret cum affinibus æſtate,

170 CHENOPODIUM *glaucum* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis.

Germ. *Gelbe Melthe, kleiner Schmirgel.*

Habitat ad fimeta, in plateis ſuburbiorum, frequens; nec non interdum in litoribus maritimis arenoſis.

171 CHENOPODIUM *Vulvaria* foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus.

Germ. *Wuhlkraut, Bockskraut, ſtinkende Melthe* etc. Pharmac. *Vulvaria.*

Habitat in cultis, oleraceis, rarius.

172 CHENOPODIUM *polyſpermum* foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. †

Germ. *Stauderich.*

Habitat in cultis.

173 CHENOPODIUM *maritimum* foliis ſubulatis ſemicylindricis.

Germ.

Habitat in maritimis, ſalſis.

Gryph. *Bey den Gradierhæuſern* copioſe.

174 SALSOLA *Kali* herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis, calycibus marginatis axillaribus.

Germ. *Salzkraut.*

Habitat ad litora maris arenoſa. v. gr. [Gryph. *Zu Wampen hinter der Koppel.*] Sund. *Am Strande nach Devin.* item, *Hinter Bauer-Parow am Strande.*

Floret Julio.

175 ULMUS *campeſtris* foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus.

Germ. *Ulmbaum.* Noſtrat. *Röſter.* Phar. *Ulmus.*

Habitat ad pagos, inque ſylvis.

Floret Martio, Aprili.

176 GENTIANA *Pnevmonanthe* corollis quinqueſidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus.

Germ. *Herbſtenzian.*

Habitat in humidis, ſterilibus, ericetoſis, rariör. Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges zwiſchen Neegaſs und Seemûhlen,* locis ericetoſis copioſe. item *In der Heide bey dem Martensdorfer Kruge.* Pom. *In der Cummerowſchen Heide.* Alibi non viſa.

Floret Auguſto, Septembri.

177 GENTIANA *Centaurium* corollis quinqueſidis infundibuliformibus, caule dichotomo. (A.

Germ. *Tauſendgüldenkraut.* Pharmac. *Centaurium minus.*

Habitat locis apricis, paſſim. [Gryph. inter *Helmshagen und Pottkrug, zu Hanshagen.*] Sund. *Bey Teſchenhagen* & alibi.

(β Centaurium minus pumilum ramoſiſſimum.

Habitat in pratis ſalſis rarius. [Gryph. *zu Wampen.*] Sund. *Auf dem Drigge in der Wieſe zwiſchen dem Drigger Holz und Wampen.*

Floret Julio, Auguſto.

178 GENTIANA *campeſtris* corollis quadrifidis fauce barbatis.

Germ. *Feldenzian.*

Habitat in pratis, paſcuisque ſiccis, apricis frequens v. g. [Gryph. *In Hindrichshagen & auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Auf dem Kœpfenberge an der Süderſeite* copioſe. item, *Auf dem Devinſchen Ort* frequens. & alibi.

Floret Julio, Auguſto, Septembri.

Folia calycina alterna majora. Corollae interdum quinquefidæ, ſed rarius.

UMBELLATAE.

179 ERYNGIUM *maritimum* foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis.

Germ. *Mannes-Treu, Gemein Mannes-Treu.*

Habitat ad litora maris arenoſa. v. gr. [Gryph. *zu Ludwigsburg & auf dem Streng.*] Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow* copioſiſſimum.

Floret Julio, Auguſto.

180 HYDROCOTYLE *vulgaris* foliis peltatis, umbellis quinquefloris.

Germ.

Habitat in inundatis, paludoſis ſubnemoroſis ad radices fruticum, frequens. v. gr. Sund. *Im Moor hinter Bauer-Parow am Ende der Triſt.* item *Im Voigthæger Moor im Haaſen-Winkel,* & *auf dem Devinſchen Ort an feuchten Stellen,* copioſiſſime.

Floret Auguſto.

181 SANICULA *europæa* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus.

Germ. *Sannikel.* Pharmac. *Sanicula.*

Habitat in ſylvis nemoribusque umbroſis ſat frequens. [Gryph. *zu Ludwigsburg.*] Sund. *in der Andershæffſchen Koppel* copioſe, item *im Vogelſangſchen Buſch* & alibi.

Floret Junio.

182 TORDYLIUM *Anthriſcus* umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis.

Germ.

Habitat prope vias, ad ſepes, inque nemoribus, & in ruderatis, ante portas paſſim.

Floret Julio.

183 DAUCUS *Carota* ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *ſylveſtris.*

Germ. *Vogelneſt.* Pharmac *Daucus ſylveſtris.*

Habitat ad verſuras agrorum, ad vias, & ſepes, aliisque locis aridis. paſſim frequens, v. gr. [Gryph. ad foſſam *bey der Triſt am Buſch zu VVampen* copioſe.] Sund, *am hohen Gra-*

ben, item *am Ufer des Devinſchen oder Nonnen-Sees* & alibi.

Floret Julio, Auguſto.

184 CONIUM *maculatum* ſeminibus ſtriatis.

Germ. *Schierling*. Pharmac. *Cicuta.*

Habitat in ruderatis ubique. v. gr. Sund. *vor der Garbodenhæger-Mûhle am VVege linker Hand* copioſiſſimum.

Floret Junio, Julio.

185 SELINUM *paluſtre* ſublacteſcens, radice unica.

Germ.

Habitat in paludibus, ſylvaticis umbroſis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey Hohenmûhlen.*] Sund. *Im Buſch vor Neegaſs zur Linken*, item *bey Voigthagen im Kaalholz* & alibi.

Floret Auguſto.

186 ATHAMANTA *Oreoſelinum* foliolis divaricatis.

Germ.

Habitat in collibus ſiccis apricis.

Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* frequens, & *am hohen Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees an der Devinſchen Seite.* Jaſm. *Am Wege von Sagard nach der Fehr zur Linken nahe vor der Fehr* copioſe.

Floret Junio, Julio, Auguſto.

187 LASERPITIUM *latifolium* foliolis cordatis inciſo-ſerratis. †

Germ. *Weis Hirtzwurz.* Pharm. *Gentiana alba.*

Habitat in umbroſis & ſylvis denſis ſolo ſubhumido. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*]

188 HERACLEUM *Sphondylium* foliolis pinnatifidis.

Germ.

Germ. *Teutſch Baerenklau.*

Habitat in nemoroſis, pratis frequens. v. gr. Sund. *im Haynholzſchen Buſch und an der Voigthæger Prieſter-Trift.* Variat foliis auratis licet rarius.

Floret Julio, Auguſto.

189 ANGELICA *Archangelica* foliorum impari lobato.

Germ. *Angelik.* Pharm. *Angelica ſativa.*

Habitat ad paludes rarior. Sund. *im Prieſtergarten zu Guſtow, am Teich* copioſiſſime. Pom. *vor Barth an der Seite gegen der alten Burg zu.*

Floret Julio, Auguſto.

Obſerv. Umbella *univerſalis* [*ſæpius prolifera*] *copioſa, radiis angulatis, tenerrime villoſis; Partiales globoſæ.* Involucrum *ut plurimum polyphyllum, foliolis lanceolatis integris, rarius trifidis, poſt floreſcentiam deciduum. Involucella polyphylla, linearia, reflexa.* Petala *acuta, viridia.* Caulis *ſtriatus glaber.* Folia *inferiora ſupradecompoſita, media decompoſita, ſumma ſæpius ternata, vel biternata.* Foliola *ovato-lanceolata* [*majora, quam in ſequenti*] *ſerrata, ſerraturis inæqualibus, acuminatis; Imparia omnia triloba, intermedio majori, interdum truncato; Paria non raro externo latere lobo aucta.*

Valde affinis ſequenti, forſan ſolummodo varietas.

190 ANGELICA *ſylveſtris* foliis æqualibus ovato lanceolatis ſerratis.

Germ. *Wilde Angelik.* Pharmac. *Angelica ſylveſtris.*

Habitat ad paludes & locis ſylvaticis humidis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey der letzten Windmühle vor dem Fetten Thor*] Sund. *Im Holze zwiſchen Bisdorf und Kinbackenhagen, beym Jagdhauſe* frequens, item *am Strande nach Devin, am Ufer* copioſe, item *zwiſchen Guſtow und Proſſenitz an dem Graben* copioſiſſime.

Floret Auguſto.

Obſerv. Umbella *univerſalis copioſa, radiis ſtriatis, tenerrime villoſis; Partiales ſubgloboſæ.* Involucrum *nullum, vel, ſi adeſt, unifolium, lanceolatum aut ſubulatum; Involucella polyphylla, ſubulata, reflexa.* Petala *acuta, alba.* Caulis *ſtriatus, glaber, at Rami verſus umbellas tenerrime villoſi.* Folia *inferiora ſupradecompoſita, media decompoſita, ſumma pinnata.* Foliola *ovato-lanceolata, ſerrata, ſerraturis inæqualibus acuminatis; Imparia & Paria non raro lobo aucta.*

191 SIUM *latifolium* foliis pinnatis, umbellis terminalibus.

Germ. *Waſſer-Paſtinak.*

Habitat in rivulis, & ad ripas paludoſas ubique

Floret Julio, Auguſto.

192 OENANTHE *fiſtuloſa* ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis.

Germ. *Waſſer-Steinbrech.*

Habitat in foſſis aquoſis, inundatis & ad ripas lacuum frequens. v. gr. [Gryph. *Am Steg worüber*

worüber man nach dem Galgenkamp gehet.] Sund. *Am Knieper Mühlengraben.* item *in der Papenhäger und Vogelſangſchen Wieſe.*
Floret Julio.

193 PHELLANDRIUM *aquaticum* foliorum ramificationibus divaricatis.
Germ. *Unæchter Schierling.*
Habitat in foſſis aquoſis, & ripis lacuum limoſis v. gr. [Gryph. *Am Stadtgraben.*] Sund. *Am Knieper Teich.*
Floret Julio.

194 CICUTA *viroſa* umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis.
Germ. *Waſſer-Schierling, æchter Schierling.* Pharmac. *Cicuta.*
Habitat cum præcedente in paludibus, & ad ripas lacuum v. gr. Sund. *Am Knieper Teich* copioſiſſime.
Floret Junio.

195 AETHUSA *Cynapium.*
Germ. Noſtrat. *wilde Peterſilie, Hunds-Peterſilie.*
Habitat in hortis oleraceis.
Floret Junio, Julio.
Inter Apium Petroſelinum habitans, interdum ab ignorantibus lecta, nocet, quare probe diſtinguenda. Hæc ante floreſcentiam diſtinguitur caule ad radicem fuſco, quod non in illo. Hæc primo anno floret, illud ſecundo. Hujus flores albi, illius flavi &c.

196 SCANDIX *Anthriſcus* feminibus ovatis hiſpidis, corollis uniformibus, caule lævi.

Germ.

Habitat in aggeribus, ruderatis, v. gr. Sundiæ in vallo urbis inter *Kûter & Catharinen Baſtion* frequens &c.

Floret Julio.

197 CHAEROPHYLLUM *ſylveſtre* caule ſtriato, geniculis tumidiuſculis.

Germ. Noſtrat. *Kalwerkropp*. Pharmac. *Cicutaria*.

Habitat in ruderatis, pratis, juxta ſepes freq.

Floret Julio.

198 CHAEROPHYLLUM *temulum* caule ſcabro: geniculis tumidis.

Germ. *Klein Kalwerkropp*.

Habitat ad arva, vias, & ſepes paſſim, nec non in vallis urbium.

Floret Junio.

199 PASTINACA *ſativa* foliis ſimpliciter pinnatis.

Germ. *wilde Paſtinaken*. Pharm. *Paſtinaca*.

Habitat in aggeribus, paſcuis, paſſim v. gr. [Gryph. *Auf dem Wall beym Fleiſcher Thor.*] Sund. *auſſerhalb des Tribſeer Damms am Barthſchen Wege* copioſiſſima, item *am Ufer des Strandes vor dem Knieper Thor.*

Floret Julio.

200 CARUM *Carvi*.

Germ. *wilder Kærwel, Wieſen-Kümmel*. Pharm. *Carvi*.

Habitat in pratis ſiccis, duris.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. in pratis *am Barthſchen Wege, zur Rechten*, item *zu Alte-*

Alte-Fehr auf dem Glacis an der Nordoſtlichen Seite copioſiſſimum.

Floret Junio.

201 PIMPINELLA *ſaxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus.

Germ. *Bocks-Peterlein.* Pharmac. *Pimpinella noſtras.*

Habitat cum variationibus, in pratis paſcuisque ſiccis, ſylvis & umbroſis v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp*, item *im Helmshæger Holz nach dem Pottkruge hin.*]: Sundiæ *auf der Franken Weide*, item *am Wall zu Alte-Fehr*, item *in der Heide zwiſchen Voigthagen und Zarendorf*, item *in der Andershœſſchen Koppel*, item *im Vogelſangſchen Buſch* & alibi.

Floret Julio, Auguſto.

202 APIUM *graveolens* foliolis caulinis cuneiformibus, umbellis ſeſſilibus.

Germ. *wilder Sellerie, Waſſer-Eppich.* Pharm. *Apium.*

Habitat in humectis, præſertim maritimis, ſalſis.

Sund. *am Devinſchen oder Nonnenſee, unten am hohen Ufer auf der Devinſchen Seite* frequens, alibi. rarior. Gryphiæ ſemel a me lectum ad viam, qua itur ad pagum *Neuenkirchen* a dextris in foſſa aquoſa.

Floret Julio.

203 AEGOPODIUM *Podagraria* foliis caulinis ſummis ternatis.

Germ. *Ziegenfuſs.*

Habitat ad ſepes, inque pomariis aliisque locis graminoſis frequens. v. gr. Sund. in vallo urbis *gegen dem Schûtzenhauſe* copiôſiſſime.
Floret Junio.

TRIGYNIA.

204 VIBURNUM *Opulus* foliis lobatis, petiolis glanduloſis.
Germ. *Hirſchholder.* Noſtrat. *Gooſs-Fleder.*
Habitat in dumetis, ſepibus, & ſylvis loco humidiuſculo, paſſim. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sundiæ *in der Andershœſſchen Koppel und am hohen Graben.*
Floret Junio.

205 SAMBUCUS *Ebulus* cymis trifidis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo.
Germ. *Attich.* Pharmac. *Ebulus.*
Habitat in ſylvis & ſepibus infrequens. Sund. *an der Trift die vom Wege von Hof-Parow nach Bauer-Parow zur Linken nach dem Moor abgeht, zur Rechten am Graben,* copioſe, alibi non viſa.
Floret Julio

206 SAMBUCUS *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo.
Germ. *Fliederbaum, Hollunder.* Pharm. *Sambucus.*
Habitat ad pagos & ſepes ubique.
Floret Junio.

207 ALSINE *media* petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis.

Germ.

Germ. *Hünerdarm. Hünerbiſs.* Noſtr. *Mihre.*
Habitat in cultis ubique.
Floret æſtate.

TETRAGYNIA.

208 PARNASSIA *paluſtris.*
Germ. *Parnaſs-Gras, weiſſe Leberblumen.* Ph. *Hepatica alba.*
Habitat in uliginoſis, frequens. v. gr. [Gryph. *hinter Hinrichshagen.*] Sund. *in der Heide zwiſchen Seemühlen, Moyſahl und dem Steinhæger Holze,* locis uliginoſis copioſe, item *im Voigthæger Prieſter-Moor.*
Floret Junio, Julio, Auguſto.

PENTAGYNIA.

209 STATICE *Armeria* ſcapo ſimplici capitato, foliis linearibus.
Germ. Noſtr. *Haaſenpoten.*
Habitat in campis aridis, apricis ubique. v. gr. Sund. *zur Rechten am Wege zwiſchen dem Tribſeer und Knieper Thor &c.*
Floret Julio.
210 LINUM *catharticum* foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis.
Germ. Pharmac. *Linum catharticum.*
Habitat in pratis humentibus, paſcuis ſucculentis, paſſim frequens. v. gr. Sund. *in der Wieſe zwiſchen dem Haynholzſchen und Vogelſangſchen Buſch,* & alibi. Semel quoque frequens

frequens legi Rugiæ in collibus aridis inter *Tribberaz & Dollahn* magnitudine eximium.
Floret Julio.

211 LINUM *Radiola* foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandis tetragynis.
Germ.
Habitat locis ſabuloſis, inundatis rarius. [Gryphiæ *bey Weidenhagen in der Moor-Koppel nach dem Pottkruge hin.*] Sund. cum priori aliquoties lectum, ſed rarius. Forſan tantum varietas præcedentis, cui ſimillimum, licet minus.
Floret Julio.

212 DROSERA *rotundifolia* ſcapis radicatis, foliis orbiculatis.
Germ. *Sonnenthau.* Pharm. *Ros Solis.*
Habitat in paludibus uliginoſis in cæſpitibus Sphagni paluſtris. v. gr. [Gryph. *im Moor beym Pottkruge.*] Sund. *im Voigthæger Prieſter-Moor*, item *im Moor vor Pütt, zur Linken;* & alibi, copioſe.
Floret Julio, Auguſto.

213 DROSERA *longifolia* ſcapis radicatis, foliis oblongis.
Germ. *Sonnenthau.*
Habitat & floret cum præcedente.

POLYGYNIA.

214 MYOSURUS *minimus.*
Germ. *Mauſeſchwanz.*
Habitat in ambulacris hortorum, viis, & agris, & collibus apricis, ſolo limoſo, ſicco.
Floret Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

215 Allium *Scorodopraſum*, caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis.
Habitat in nemoroſis rarius.
Pom. *bey Barth im VVobbelkoVver Remel*, copioſe, item *auf der alten Burg vor Barth.*
Floret Junio, Julio.

216 Allium *arenarium* caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtaminibus tricuſpidatis. †
Germ. *Sandlauch.*
Habitat in campis arenoſis, rarius.

217 Allium *oleraceum* caule teretifolio bulbifero, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis, ſtaminibus ſimplicibus.
Germ.
Habitat in aggeribus, litoribus, collibus ſiccis, paſſim.
Sund. *Zu Alte-Fehr am VVall*, v. gr. *an der Norderſeite, nahe beym Ufer*, copioſe, item *an der Süderſeite hinter dem Pfarrhauſe*, item *auf dem Devinſchen Orte, und dem Ufer des Devinſchen Sees.*
Floret Julio, Auguſto.

218 ORNITHOGALUM *luteum* ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus.
Germ. *Ackerzwiebel.*
Habitat in agris, & umbroſis graminoſis ubique. v. gr. [Gryph. *auf dem VVall hinter dem Collegio.*] Sund. *an dem hohen Graben und auf den daran liegenden Aeckern nach dem Andershœſſchen See zu,* item *in der Andershœſſchen* Koppel, item *auf dem Elmenhorſter* Kirchhofe copioſiſſimum.
Floret Aprili.

219 ORNITHOGALUM *minimum* ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis.
Germ. Klein *Ackerzwiebel.*
Habitat in cultis, rarius in ſylvis.
[Gryph. *im Helmshæger Holz, beym Richtſteig nach Grubenhagen.*] Sund. ſemel legi ante quinque annos *am hohen VVall beym* Knieper *Thor,* poſtea fruſtra quæſivi; alibi non viſum eſt. Floret Aprili.

220 ASPARAGUS *officinalis* caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis duabus interioribus, una exteriore.
Germ. *wilder Spargel.* Pharm. *Aſparagus.*
Habitat in arenoſis, paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Wall gegen Sûden und auf dem Galgenkamp*] Pom. *auf der alten Burg vor Barth,* copioſe. *Nos* Sund. non viſus. Copioſe naſcitur in arenoſis Inſulæ *Hiddenſee & auf Mœnchgut,* lectus a Patre meo.
Floret Junio.

221 CONVALLARIA *majalis* ſcapo nudo.
Germ. *Mayblumen, Lilien-Convallien.* Pharm. *Lilium Convallium.*
Habitat in ſylvis Gryphiæ & Sundiæ rarior. Sund. *am Ufer des Strandes nach Devin unter den Büſchen.* Jasm. *in der Stubbenitz* paſſim copioſiſſima. *Nos* Rug. *im Boldevitzer Holz* copioſe. *M. Willich, Botan. Cultor.*

222 CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris.
Germ. *Weiſswurz.* Pharmac. *Sigillum Salomonis.*
Habitat in ſylvis, umbroſis. [Gryph. frequens v. gr. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. rarior. Jasm. prope *Sagard* in monticulo *Dubberwort* dicto copioſe.
Floret Majo, Junio.

223 CONVALLARIA *multiflora* foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris.
Germ. *Klein Weiſswurz.*
Habitat in umbroſis, ſylvis, nemoribus, frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp bey Hohenmühlen.*] Sund. *in der Andershœfſchen Koppel.*
Floret Majo, Junio.

224 CONVALLARIA *bifolia* foliis cordatis.
Germ. *Einblatt.*
Habitat in ſylvis, pratis depreſſis, aſperis, umbroſis, frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem*

Gal-

Galgenkamp nach Wackerow.] Sundiæ cum præcedenti. Jasm. *in der Stubbenitz* copioſe.
Floret Junio, Julio.

225 ACORUS *Calamus vulgaris.*
Germ. *Kalmuſs.* Pharm. *Calamus vulgaris.*
Habitat in foſſis aquoſis, ubique v. gr. [Gryph. *im Stadtgraben.*] Sund. *an der Allée nach Papenhagen zur Linken im Graben* copioſe, item *zu Pütt, im Moor hinter dem Prieſterhauſe* copioſe.
Floret Junio.

226 JUNCUS *conglomeratus* culmo nudo ſtricto, capitulo laterali.
Germ. *Knopfkrætengras.* Schreb.
Habitat in uliginoſis frequens.

227 JUNCUS *effuſus* culmo nudo ſtricto, panicula laterali.
Germ. *Buſchkrætengras.* S.
Habitat in uliginoſis, umbroſis humidis.

228 JUNCUS *ſquarroſus* culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. †
Germ.
Habitat in uliginoſis, cæſpitoſis. [Gryph. *zu Helmshagen.*]

229 JUNCUS *articulatus* foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis.
Germ. *Glieder-Krætengras.*
Habitat ad ripas lacuum, inque campis aquoſis turfoſis ubique. v. gr. [Gryph. *im Moor beym Pottkruge, auf der Wieſe gegen Wackerow hin.*] Sund. *am Knieper Teich* zwi-
ſchen

ſchen der letzten Bleiche und Papenhagen copioſe.
Floret Julio.

230 JUNCUS *bulboſus* foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis.
Germ.
Habitat in paſcuis aquoſis, ad vias & litora marina vulgaris, v. gr. Sund. *am Strande vor dem Knieper Thor*, item *am Barthſchen Wege gegen Grûnehuſe über* locis inundatis copioſiſſimus.
Floret Junio.

231 JUNCUS *bufonius* culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. †
Germ. *Kriechendes Krœtengras.*
Habitat in inundatis.

232 JUNCUS *piloſus* foliis planis piloſis, corymbo ramoſo.
Germ. *Haariges Krœtengras.* Schreb.
Habitat in ſylvis paſſim frequens. v. gr. [Gryphiæ *zu Elmshagen.*] Sund. *zur Rechten des Weges nach Voigthagen im Stubbenbroock*, item *im Abshæger und Elmenhorſter Holz.*
Floret Aprili.

233 JUNCUS *campeſtris* foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque.
Germ. *Wieſen-Krœtengras.*
Habitat in ſiccioribus graminoſis, paſcuis ubique.
Floret Aprili, Majo.

234 BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemoſis.
Germ. *Berberitſchen.* Pharm. *Berberis.*

Habitat Sundiæ in litore Inſulæ Dänholm, paſſim inter dumeta. *Nos.* Jasm. *in der Bobbinſchen Prieſter Koppel. M. VVillich. Bot. Cult.*

Floret Junio, Julio.

TRIGYNIA.

235 RUMEX *criſpus* floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis.

Germ. *Krauſe Grind-Wurz.*

Habitat in humoſis, ad agros et pagos paſſim.

Floret Junio.

236 RUMEX *maritimus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus.

Germ. *Strand-Grind-Wurz.*

Habitat ad litora maris Balthici paſſim.

Sund. *am Strande, da der Graben von dem Andershœffſchen See hinein flieſt*, copioſiſſimus. item *am Strande zwiſchen Devin und dem Devinſchen Ort.*

Floret Junio.

Folia undulata.

237 RUMEX *acutus* floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis.

Germ. *Grindwurz, wilde Rhabarber.*

Pharmac. *Lapathum acutum.*

Habitat in umbroſis, ſucculentis.

[Gryph.

[Gryph. *zu Hanſhagen.*] Sund. *im Kettenhæger Remel beym Barthſchen Wege* & alibi. Copioſiſſimus in Jasmundia in ſucculentis pagi *Crivitz.*

Floret Junio.

238 RUMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis.

Germ. *Waſſer-Grindwurz.*

Habitat ad ripas lacuum et paludum, inque foſſis aquoſis, v. gr. Sund. *am Knieper Teich* frequentiſſimus.

Floret Julio.

239 RUMEX *Acetoſa* floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis.

Germ. *Wild Sauerampfer.* Pharm. *Acetoſa noſtras.*

Habitat in paſcuis ubique frequens.

Floret Junio.

240 RUMEX *Acetoſella* floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis.

Germ. *Kleiner Sauerampfer.*

Habitat in pratis ſiccis et arvis arenoſis, locisque elatis duris, frequens.

Floret Majo, Junio.

241 TRIGLOCHIN *paluſtre* capſulis trilocularibus ſublinearibus.

Germ. Noſtrat. *Fettgras.*

Habitat in pratis humidis, paſcuis udis, locisque uliginoſis paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *auf der Wieſe zwiſchen der Landſtraſſe und Hohenmühlen.*] Sund. *auf der Papenhæger*

Wieſe copioſe. *Nos.* Jasm. *in einer Wieſe zur Linken am Wege von Woſtewiz nach Dubnitz* copioſiſſimum. *M. Willich Botan. Cultor.*

Floret Junio.

242 TRIGLOCHIN *maritimum* capſulis ſexlocularibus ovatis.

Germ.

Habitat in pratis maritimis vulgaris, v. g. Sund. *auf der Wieſe neben dem Graben von Hof-Parow nach dem Strande,* item *am Strande zwiſchen der Reiferbahn und dem Retrenchement.* Rarius in pratis non ſalſis cum praecedente.

Floret Junio.

POLYGYNIA.

243 ALISMA *Plantago aquatica* foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis.

Germ. *Waſſerwegerich, Froſchlœffelkraut.*

Habitat in foſſis aquoſis, ad ripas fluviorum, lacuum, et paludum, vulgatiſſima.

Floret Junio.

244 ALISMA *Ranunculoides* foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. †

Germ.

Habitat in aquoſis rarior. [Gryph. in ſylva *zu Helmshagen* locis minus umbroſis.]

CLASSIS

CLASSIS VII.
HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

245 TRIENTALIS *Europæa* foliis lanceolatis integerrimis.

Germ.

Habitat in ſylvis & juniperetis. [Gryphiæ frequens.] Sund. *Im Moor zur Rechten zwiſchen Neegaſs und Seemûhl*, *an bûſchigten Stellen* rariſſima. In Rugia prope *Bergen* in nemore *Radgas* dicto, & Jaſmundiæ ſylva *Stubbeniz* dicta copioſa.

Floret Junio.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

246 Epilobium *anguſtifolium* foliis ſparſis lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus.
Germ. *Weiderich-Rœſslein.*
Habitat ad litora lapidoſa inundata Maris Balthici, varior apud nos planta.
Jaſm. *Am Strande der Stubbeniz.* v. gr. *Bey Tripp-Ort.* Rug. *Bey Pert und dem Granizzer Ort.*
Floret Julio.

247 Epilobium *hirſutum* foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus.
Germ. *Waſſer-Violen.*
Habitat in humidiuſculis, ad foſſas, paludes, inque repretis. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *in der Voigthæger Prieſter Trift.* item, *im Buſche vor Neegaſs* & alibi frequens.
Floret Julio.
Datur varietas foliis glabris ſemiamplexicaulibus lanceolatis denticulatis, caule molliſſimo, *media inter hoc & ſeqvens.*

248 Epilobium *montanum* foliis oppoſitis ovatis dentatis.
Germ.
Habitat in humidis, ad ſcaturigines, locis umbroſis,

broſis, paſſim. v. gr. Sund. *Vorne in der Voigthæger Prieſter Trift zur Rechten am Graben* & alibi.

Floret Julio.

249 Epilobium *paluſtre* foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto.

Germ.

Habitat in humidiuſculis, paludoſis, paſſim. v. gr. Sund. *Im Buſch vor Neegaſs.*

Floret Julio.

250 Vaccinium *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato.

Germ. *Heidelbeeren.* Noſtr. *Bixbeeren.* Pharm. *Myrtillus.*

Habitat in ſylvis umbroſis] frequens. v. gr. [Gryph. *Im Kirchenholz zu Hanshagen* copioſe.] Sund. *In der Andershœſſchen* Koppel *nicht weit vom Graben, der dieſe von der Voigthæger Prieſter Koppel ſcheidet, nahe beym Teich.* item, *im Abshæger Holz* copioſe. item, *auf den Devinſchen Ort* copioſe.

Floret Majo.

251 Vaccinium *uliginoſum* pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus baſi ciliatis.

Germ. Noſtr. *Puttgnaden, Bullgraſen.*

Habitat in uliginoſis turfoſis.

[Gryph. *Im Moor hinter dem Pottkruge.*] Sund. *Im Moor zur Rechten des Weges von Neegaſs nach Seemühlen.* item, *im Moor am Ende der*

der Trift, die linker Hand des Weges von dem Hofe Parow nach Bauer-Parow abgeht. [Matureſcit Julio.] Florentem non vidi.

252 VACCINIUM *Oxycoccos* foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis.

Germ. *Mooſsbeeren, Sumpſbeeren.* Noſtr. Rug. *Kramsbeeren.*

Habitat in paludibus, in Sphagno, cum Droſeris frequens. v. gr. [Gryph. *zu Ludwigsburg in der Moor-Koppel.*] Sund. *im Voigthæger Prieſter-Moor,* item *im Moor vor Pütt zur Linken,* item *im Moor zur Rechten zwiſchen Neegaſs und Seemühlen.*

Floret Junio, Julio.

253 ERICA *vulgaris* antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat in ſylveſtribus campeſtribusve ſteriliſſimis, vulgatiſſima.

Floribus albis & purpureis variat.

Floret Auguſto.

254 ERICA *Tetralix* antheris bicornibus incluſis, corollis ſubgloboſis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.

Germ. *Heidenkraut.*

Habitat cum præcedenti, ſed rarior.

Sund. *Im Moor zur Rechten des VVeges von Neegaſs nach Seemühlen* locis cæſpitoſis copioſe. Pom. *In der Cummerowſchen Heide.* Copioſiſſima in iſthmi Jaſmundiam cum

Rugia

Rugia connectentis, *ſchmale Heide* dicti, collibus ſteriliſſimis.
Floret Auguſto.

TRIGYNIA.

255 POLYGONUM *amphibium* floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corolla longioribus.

A) *terreſtre* ſtaminibus corolla longioribus.
Habitat in pratis argilloſis, juxta vias & agros frequens. v. gr. Sund. *vor Klein Kordshagen.*

B) *paluſtre* ſtaminibus corolla brevioribus.
Habitat in foſſis aquoſis, lacubus, fluitans vulgaris. v. gr. Sund. *Im Knieper Teich.* item, *Im Andershœſſchen See*, copioſiſſimum.
Floret Julio.

256 POLYGONUM *Hydropiper* floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis.
Germ. *VVaſſerpfeffer, Bitterling.* Pharm. *Perſicaria.*
Habitat in ſubhumidis frequens. v. gr. Sund. *vor Neegaſs.* item, *am VVege von Kettenhagen nach der Mûhle.*
Floret Julio.

257 POLYGONUM *Perſicaria* floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis.
Germ. *Pferſingkraut, Flœhkraut.*
Habitat cum variationibus in cultis, ruderatis, ad foſſas, frequens. v. gr. Sund. *vor dem*

Knieper Thor am VVege nach dem Kirchhofe zur Linken am Graben. etc.

Floret Junio, Julio.

258 Polygonum *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo.

Germ. *VVegetritt*, *VVegegras*. Pharm. *Centumnodia.*

Habitat in limoſis, agris, viis, litoribus ubique vulgatiſſimum.

Floret Junio.

259 Polygonum *Convolvulus* foliis cordatis, caule volubili, floribus planiuſculis.

Germ. *Vogelzunge*, *VVildheidenkorn*.

Habitat in agris, hortis, cultis, dumetis paſſim copioſe. v. gr. Sund. *Auf dem Hünenberge zwiſchen Guſtow und Proſeniz* copioſe. item, *zu Niederhoff an den Ellern in der Allee, die beym Hauſe vorbey nach dem Strande geht* copioſiſſime.

Floret Julio, Auguſto.

TETRAGYNIA.

260 Paris *quadrifolia*.

Germ. *Einbeer*, *VVolfsbeer*.

Habitat in nemoribus, ſylvis, locis umbroſis, ſucculentis. v. gr. [Gryph. *Im Hohenmühler Holz*]. Sund. *Im Lüdershæger Ellerholz* paſſim. item, *Im Abshæger Holz im Heller* copioſiſſima.

Floret Majo.

261 Adoxa *Moſchatellina.*
Germ.
Habitat in nemoribus umbroſis frequens. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp* inter arbuſta.] Sund. *Am hohen Graben.* Copioſiſſima *zur Rechten des VVeges nach Voigthagen* in nemore *Stubbenbrook* dicto.
Floret Aprili.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

262 Butomus *umbellatus.*
Germ. *Blumenbinſen.*
Habitat in foſſis aquoſis, ad ripas lacuum & piſcinarum, ubique. v. gr. Sund. *am Knieper Teich,* & in foſſis *zwiſchen dem Knieper Glacis und der Salpeterſiederey &c.*
Floribus purpureis albisque variat.
Floret Junio, Julio.

CLASSIS X.
DECANDRIA.

MONOGYNIA.

263 Monotropa *Hypopithys* floribus lateralibus octandris; terminali decandro.

Germ.

Habitat in ſylvis umbroſis, præſertim acifoliis Paraſitica radicum, rariſſima apud nos planta. [Gryph. *im Kirchenholz zu Hanshagen.*] Rug. *im Boldevitzer Holz.* Sund. non viſa.

Floret Julio.

264 Ledum *paluſtre.*

Germ. *Pors, Poſt.* Pharm. *Roſmarinus ſylveſtris.*

Habitat in paludibus uliginoſis nemoroſis, ſylvaticisque paſſim.

[Gryph. *im Helmshæger Torfmoor.*] Sund. *im Moor zur Rechten des VVeges zwiſchen Neegaſs und Seemühlen, ohngefæhr 300 Schritte vom VVege* copioſe. Rug. inter *Tribberaz* & ſylvam *Graniz* dictam, *unter den Ahlbekſchen Tannen.*

Floret initio Julii.

265 Andromeda *Polifolia* pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis.

Germ.

Habitat in uliginoſis, turfoſis frequens. v. gr. [Gryph.

[Gryph. *zu Ludwigsburg in der Moor-Koppel.*] Sund. *im Voigthæger Prieſter-Moor,* item *im Moor vor Pütt, zur Linken* copioſe.
Floret Junio.

266 ARBUTUS *Uva urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.
Germ. *Bærentraube.* Noſtrat. *Bewell.* Pharm. *Uva urſi.*
Habitat in collibus ſabuloſis aridis apricis elatis Rugiæ. v. gr. In collibus prope *Tribberaz,* copioſe, item *auf den Ralſewykſchen Dünen bey Ahlbek.* Copioſiſſima *auf der ſchmalen Heide zwiſchen Rügen und Jasmund, zwiſchen beyden Heidekrügen und der offenbaren See.*
Gryph. *im Grubenhæger Holz,* ubi ſemel copioſa lecta a *Rev. P. Wilke.*
Floret Majo, Junio.

267 PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus aſcendentibus, piſtillo declinato.
Germ. *Wald-Mangolt.* Pharm. *Pyrola.*
Habitat in umbroſis, ſylvis, paſſim frequens.
[Gryph. *im Eldenaer, Hanshæger Holz.*] Sund. *im Tannenholze, zur Rechten des Weges zwiſchen Arendſee und Benkenhagen,* item *im Abshæger Holz.* Frequentiſſima in litoribus Jasmundiæ inter *Saſſeniz & Criviz* pagos.
Floret Junio, Julio.

268 PYROLA *ſecunda* racemo unilaterali.
Germ.
Habitat in ſylvis cum præcedente licet rarior.
[Gryph.

[Gryph. *im Hanſhæger Kirchenholze.*] Sund. *im Abshæger Holze. Nos.* Pom. *im Tribſeer Stadtholze* copioſe. *M. Willich Bot. Cult.*
Floret Julio.

DIGYNIA.

269 CHRYSOSPLENIUM *alternifolium* foliis alternis.
Germ. *Güldenmilzkraut.*
Habitat ad ſcaturigines in umbroſis frequens. v. gr. [Gryph. *im Helmshæger Holz beym Moor* copioſe.] Sund. *an den kleinen Pfülen in der Andershœſſchen Koppel*, item *in der Voigthæger Prieſter-Trift, zur Rechten am Graben* & alibi.
Floret Majo, Junio.

270 SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata.
Germ. *Weiſſer Steinbrech.* Pharm. *Saxifraga alba.*
Habitat in apricis.
[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *auf dem Ufer vor Devin.* Pom. in litore promontorii *Barhœft.*
Floret Majo.

271 SAXIFRAGA *tridactylites* foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. †
Germ.

[Habi-

Habitat in arvis. [Gryph. *zu Ludwigsburg.*]
Floret Majo.

272 SCLERANTHUS *annuus* calycibus fructus patulis.

Germ.

Habitat in arvis, campeſtribus arenoſis ubique v. gr. Sund. in agris *zwiſchen Seemühlen und der Windmühle*, item in agris *hinter Bauer-Parow* copioſe.

Floret Junio.

273 SCLERANTHUS *perennis* calycibus fructus clauſis.

Germ. *Johanniskraut.*

Habitat in campis apricis arenoſis rarior.

Floret Junio.

274 SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis.

Germ. *Seifenkraut.* Pharm. *Saponaria.*

Habitat Sundiæ *hinter dem Kruge zu Voigthagen an dem Zaune* copioſiſſima, item *am Ende des Knieper Kirchhofes, wo der ſchmale VVeg von dem Parowſchen VVege nach der Vogelſtange vorbey gehet* copioſe. Forſan olim ex hortis aufuga, quod flores ſemipleni teſtantur, nunc per plures annos ſpontanea.

Floret Auguſto.

275 DIANTHUS *Armeria* floribus aggregatis faſciculatis: ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum æquantibus.

Germ.

Habi-

Habitat Pom. *auf der alten Burg vor Barth* frequens. Alibi non viſus.

Floret Julio.

276 DIANTHUS *prolifer* floribus aggregatis capitatis: ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus.

Germ.

Habitat in ſterilibus arenoſis rarior.

[Gryph. *zu Hanshagen.*] Sund. *am Altfehrſchen VValle gegen Sûden,* item *auf dem Devinſchen Ort, und am hohen Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees, an der Seite nach Devin.*

Floret Julio, Auguſto.

277 DIANTHUS *deltoides* floribus ſolitariis: ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis.

Germ. *Heide-Nelken.*

Habitat in pratis duris & paſcuis ſterilibus paſſim v. gr. [Gryph. *hinter Hohenmûhlen.*] Item ad viam publicam inter Gryphiam & *Coẘald.* Sund. *in der Heide zẘiſchen Zarrendorf und dem Elmenhorſter Holze, zur Linken des VVeges.* Jasm. *am VVege von der Fehr nach Sagard, nahe vor der Fehr zur Rechten* copioſe. *Nos.* Pom. *auf den Bergen an der Trebel, zur Rechten des Tribſeeſchen Paſſes. M. VVillich.*

Floret Junio, Julio.

278 DIANTHUS *plumarius* floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis multifidis fauce pubeſcentibus.

Germ.

Germ. *Feder-Nelke.*

Habitat Sundiæ *beym VVege der vor Brandshagen zur Linken nach Niederhoff abgehet, nahe vor Niederhoff zur Rechten, auf der ſumpfigten VVieſe* copioſe. Alibi non viſus.

Floret Septembri.

Obſerv. Caulis *erectus pedalis ſimplex uniflorus, vel 2 ſeu 3 pedalis paniculatus.* Folia *viridia glauca.* Calycum *ſquamæ obtuſæ, acuminatæ; Tubus purpuraſcens, præſertim prope limbum.* Corollæ *Petala ad medium multifida, laciniis profundis anguſtis, incarnata, baſi Maculâ luteo-lividâ, pilis brevibus ſaturate purpureis adſperſâ, notata.*

TRIGYNIA.

279 Cucubalus *Behen* calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis.

Germ.

Habitat in pratis ſiccis.

[Gryph. *am VVege nach Kœtenhagen, unter den Büſchen.*] Sund. *am Barthſchen VVege bey der Vogelſangſchen Brücke am Graben* copioſe, item *auf dem Altfehrſchen VValle,* frequens.

Floret Julio.

280 Silene *nutans* petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante.

Germ.

Habitat in montoſis umbroſis ſiccis Rugiæ, præſertim

præſertim Jasmundiæ. v. gr. Rugiæ *in der Prora.* *Nos.* item *am VVege von Ralſewyk nach Pazig, zur Linken an dem Ufer des hohlen VVeges, nahe vor Ralſewyk.* *M. VVillich, Botan. Cultor.* Jasm. in litoribus ſylvæ *Stubbeniz* frequens. v. gr. *beym Hengſt,* item *am Fuſsſteige beym Kœnigſtuhl.* *Nos.*

Floret Junio.

281 STELLARIA *nemorum* foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis.

Germ. *VValdſternblume.*

Habitat in ſylvis, nemoribus, locis umbroſis ſucculentis. v. gr. [Gryph. *zu Hohenmühlen*] Sund. *im Haynholzſchen Buſch,* item *im Steinhæger und Elmenhorſter Holz.*

Floret Majo.

282 STELLARIA *Holoſtea* foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis.

Germ.

Habitat in nemoroſis umbroſis frequens. v. g. Sund. *am hohen Graben diſſeits der hohen Brücke zur Linken* copioſa. Copioſiſſima *im Haynholzſchen Buſch.*

Floret Majo & ſerius.

Differt a ſequente, caule firmiori, foliis latioribus acutioribus, margine ſerraturis minutiſſimis notatis, floribus duplo fere majoribus &c.

283 STELLARIA *graminea* foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis.

Germ. *Sternblume.*

Habitat

Habitat in ſiccis, juniperetis.
Floret Majo.

284 ARENARIA *peploides* foliis ovatis acutis carnoſis.
Germ.
Habitat ad litora marina arenoſa frequens.
[Gryph. *Bey Wampen in dem Seedank.*] Sund. *am Strande nach Parow, und am Strande bey dem Parowſchen Haaken* copioſe. Rug. *am Ende der Graniz nach Pert zu* copioſa.
Floret Julio.

285 ARENARIA *trinervia* foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis.
Germ.
Habitat in ſylvis & umbroſis paſſim.
[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *im Haynholzſchen Buſch*, item *in der Voigthæger Prieſter-Koppel.*
Floret Majo, Junio.

286 ARENARIA *ſerpyllifolia* foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus.
Germ.
Habitat in glareoſis, aridis, rarior
Sund. *am Barthſchen Wege, vor Kleinkordshagen, und gegen Grünhufe.*
Floret Majo.

287 ARENARIA *rubra* foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus.
Germ. *Sandblume.*
A) *campeſtris*, Habitat in collibus, arvis, glareoſis nudis, frequens.

B) *marina.* Habitat in litoribus arenoſis marinis, ſalſis. v. gr. [Gryph. *auf dem Roſenthal.*] Copioſiſſima *bey den Gradierhæuſern.* Sund. *bey Wampen.*
Floret Junio.

PENTAGYNIA.

288 SEDUM *Telephium* foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto.
Germ. *Fette Henne.* Pharm. *Telephium.*
Habitat in agris arenoſis, & nemoroſis ſiccis paſſim.
[Gryph. inter *Helmshagen und Grubenhagen.*] Sund. *am Ufer nach Devin.* Pom. *auf der alten Burg vor Barth* copioſe, & alibi. In Rugia frequentior.
Floret Julio.

289 SEDUM *acre* foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida.
Germ. *Mauerpfeffer.* Pharm. *Sedum minus.*
Habitat in muris, tectis, campis ſteriliſſimis arenoſis ſicciſſimis, vulgatiſſimum.
Floret Junio.

290 OXALIS *Acetoſella* ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſo-articulata.
Germ. *Sauerklee.* Noſtr. *Haaſenkohl, Gukgukskohl.* Pharm. *Acetoſella.*
Habitat in ſylvis & nemoribus umbroſis ad radices arborum, frequens. v. gr. Sund. *im Haynholzſchen Buſch* copioſe.

Variatio

Variatio flore purpuraſcente Sundiæ circum *Kordsmûhl* frequens, alibi rarior.
Floret Aprili, Majo, Junio.

291 AGROSTEMMA *Githago* hirſuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis.
Germ. *Radel.*
Habitat in agris præſertim ſecalinis nimia.
Floret Junio.

292 LYCHNIS *Flos Cuculi* petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo.
Germ. *Gukguksblume.*
Habitat in pratis humidiuſculis ubique.
Varietas flore albo Sundiæ *in der Wieſe am Barthſchen Wege, zur Linken vor der Vogelſangſchen Brûcke* copioſa cum rubra, alibi rarior.
Floret Junio, Julio.

293 LYCHNIS *Viſcaria* petalis integris.
Germ. *Pech-Nelke.*
Habitat in pratis & collibus ſiccis rariſſima.
Sund. *am Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees, an der Devinſchen Seite.*
Floret Majo.

294 LYCHNIS *dioica* floribus dioicis.
Germ.
A) *rubra.* Habitat in umbroſis, nemoroſis, ſucculentis. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *am hohen Graben.*
B) *alba.* Habitat locis ſiccis, apricis, ubique. v. gr. [Gryph. *auf dem Wall.*] Sund. *auf dem Knieper Kirchhofe* & alibi.
Floret Junio.

295 CERASTIUM *vulgatum* foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffuſis.
Germ.
Habitat in pratis, areis, ruderatis, frequens.
Floret Junio.

296 CERASTIUM *viſcoſum* erectum villoſo viſcoſum.
Germ.
Habitat in pratis macilentis. [Gryh. *auf dem Wall.*] Sund. *in der erſten Wieſe, am Wege nach Steinhagen, zur Rechten.*
Floret Junio.

297 CERASTIUM *ſemidecandrum* floribus pentandris, petalis emarginatis.
Germ.
Habitat in apricis, campis ſteriliſſimis. [Gryph. *auf dem Wall.*] Sundiæ ſemel lectum *an der Steinmauer zwiſchen Hof-Parow und Bauer-Parow.*
Floret Majo, Junio.

298 CERASTIUM *arvenſe* foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus.
Germ.
Habitat in arvis litoribusque limoſis, aridis, paſſim.
Sund. *auf dem Ufer vor Devin* copioſiſſimum.
Floret Majo.

299 CERASTIUM *aquaticum* foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis.
Germ.

Habi-

Habitat in nemoroſis humentibus paſſim.

Sund. *an dem Graben in der Voigthager Prieſter-Triſt* copioſe, & alibi.

Floret Junio, Julio, Auguſto.

300 SPERGULA *arvenſis* foliis verticillatis, floribus decandris.

Germ. *Knœterich.* Noſtr. *Nægenknee.*

Habitat in agris, præprimis arenoſis, inter ſegetes, vulgatiſſima.

Floret Junio.

301 SPERGULA *nodoſa* foliis oppoſitis ſubulatis lævibus, caulibus ſimplicibus.

Germ.

Habitat in campis ſterilibus depreſſis rarior. [Gryphiæ verſus *Derſchow.*] Sundiæ *auf der VVeide zwiſchen dem Franken und Tribſeer Thor.*

Floret Junio, Julio.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

302 Lythrum *Salicaria* foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris.
Germ. *brauner VVeiderich.*
Habitat in foſſis aquoſis, ad ripas lacuum & foſſarum, ubique.
Floret Julio, Auguſto.

DIGYNIA.

303 Agrimonia *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis.
Germ. *Aggermennig, Odermennig.* Pharmac. *Agrimonia.*
Habitat in apricis argillaceis frequens. v. gr. Sund. *am Strande nach Devin,* item *am Devinſchen Ort am Ufer* & alibi.
Floret Julio.

TRIGYNIA.

304 Reseda *Luteola* foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis.
Germ. tinct. *VViede, VVau.*
Habitat in ruderatis rarior. Sund. *auf der Redoute vor dem Tribſeer Thor, am Steinhæ-*

ger VVege, item *bey Born.* Pom. *zu Franzburg auf dem Schloſsplaz* copioſe.
Floret Auguſto.

305 EUPHORBIA *Peplus* umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis, petiolatis.
Germ. *VVolfſmilch.*
Habitat in cultis, oleraceis, ubique.
Floret æſtate.

306 EUPHORBIA *helioſcopia* umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis.
Germ. *VVolfſmilch*, *Milchkraut.*
Habitat in cultis, oleraceis, agris, cum præcedente, ſed rarior.
Floret æſtate.

DODECAGYNIA.

307 SEMPERVIVUM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus.
Germ. *Hauſlauch.* Pharm. *Sempervivum majus.*
Habitat in tectis paſſim.
Floret Julio.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

308 Prunus *Padus* floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglandulofis.
Germ. *Vogelkirſchen.* Noſtrat. *Faulbaum.*
Habitat in ſylvis paſſim.
[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Abshæger Holze* v. gr. *wenn man von des Heidereuters Hauſe nach dem Heller geht, zur Linken, & an der Wieſe beym Heller* copioſiſſime
Floret Majo.

309 Prunus *Ceraſus* umbellis ſubſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris.
Germ. *Kirſchen.* Pharm. *Ceraſa rubra.*
Habitat in ſylvis, ſepibus, rariſſima.
[Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Am hohen Graben.* Forte ex hortis aufuga.
Floret Majo.

310 Prunus *avium* umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis ſubtus pubeſcentibus.
Germ. *Vogelkirſchen.* Pharmac. *Ceraſa nigra.*
Fructu rubro variat.
Habitat in ſylvis paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *In der Anderhœſſchen und Voigthæger Prieſter Kopp* copioſe.
Floret Aprili, Majo.

311 PRUNUS *ſpinoſa* pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis.

Germ. *Schleendorn.* Pharm. *Acacia noſtras.*

Habitat in ſepibus, ſylvis, agrorumque acervis, frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *am hohen Graben.* item, *zwiſchen dem Lüdershæger Eichholze und Ellerholze* copioſe & alibi.

Floret Aprili.

DIGYNIA.

312 CRATAEGUS *torminalis* foliis cordatis ſeptangulis: lobis infimis divaricatis.

Germ. *Wilder Sperberbaum. Elzbeer.* Rupp. Jen.

Habitat in declivitate litoris Jaſmundenſis altiſſimi, *am Fuſteige der beym Kœnigſtuhl herunter gehet.*

Floret Junio.

Folia *ſupra glabra, ſubtus leviter tomentoſa, baſi ſubcordata ſeu ovata, ſemipinnatifida; Laciniis ſeptem, ſuperioribus approximatis infimis duabus longioribus divaricatis, omnibus acutis, inæqualiter ſerratis.*

313 CRATAEGUS *Oxyacantha* foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis

Germ. *Hagedorn.*

Habitat in pratis apricis duris, ſepibus, ſylvis, ubique. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *am hohen Graben.* item, *am VVege nach Andershoff beym Andershœffſchen Teich* & alibi.

Floret Vere.

TRIGYNIA.

314 SORBUS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris.

Germ. *Sperberbaum*, *Vogelbeeren*. Noſtr. *Quitſchen-Baum*. Pharm. *Sorbus aucuparia*.

Habitat in ſylvis paſſim. v. gr. Sund. *In der Andershœſſchen und Voigdthæger Prieſter-Koppel*.

Floret Junio.

Obſerv. *Folia ſæpius ſubtus villoſa*.

PENTAGYNIA.

315 MESPILUS *Cotoneaſter* inermis, foliis ovatis integerrimis. †

Germ.

Habitat in collibus apricis duris.

Floret Vere.

316 PYRUS *communis* foliis ſerratis, pedunculis corymboſis.

Germ. *Wilder Birnbaum*. Noſtr. *Hæltik Beeren*.

Habitat in ſylvis paſſim. Frequens in Jaſmundiæ ſylva *Stubbeniz* dicta.

Foret Majo.

317 PYRUS *Malus* foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus.

Germ. *Wilder Apfelbaum*. Noſtr. *Hæltik Aeppel*.

Habitat in ſylvis cum præcedente.

Floret Junio.

318 SPIRAEA *Filipendula* foliis pinnatis; foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis.

Germ.

Germ. *rother Steinbrech.* Pharmac. *ſaxifragia rubra.*
Habitat in ſiccis rariſſima. Pom. *Auf der alten Burg vor Barth.*
Floret Junio.

319 SPIRAEA *Ulmaria* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis.
Germ. *Geiſsbart.* Pharmac. *Ulmaria.*
Habitat in pratis uliginoſis, umbroſis, vulgaris. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Haynholzſchen Buſch* & alibi, frequens.
Floret Junio, Julio.

POLYGYNIA.

320 ROSA *villoſa* germinibus globoſis aculeatis, pedunculis hiſpidis, caule aculeis ſparſis, petiolis aculeatis, foliis tomentoſis.
Germ. *wilde Roſen.*
Habitat in vepretis, ſepibus, ſiccis, paſſim. v. gr. In ſummo litore inter *Alte-Fehr* & *Grahl.*
Floret Junio.

321 ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.
Germ. *wilde Roſen, Hanbuttenſtrauche.* Pharm. *Roſa ſylveſtris.*
Habitat in ſepibus, ad margines viarum paſſim. v. gr. Sund. In ſummo litore inter *Alte-Fehr* & *Grahl* cum praecedente; & alibi.
Floret Junio.

322 Rosa *ſpinoſiſſima* germinibus globoſis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatiſſimis.

Germ. noſtr. *Luusbeeren.*

Habitat ad agrorum margines eorumque acervos paſſim.

Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* frequens.

Floret Julio.

323 Rubus *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.

Germ. *Hindbeeren, Hohlbeeren.* Pharmac. *Rubus idæus.*

Habitat in ſylvis paſſim. v. gr. [Gryph. *Im Buſch zu Wampen beym alten Wege.*] Sund. *Am Wege nach Elmenhorſt im Elmenhorſter Holze* frequens. item, *zwiſchen Arendſee und Benkenhagen im Holze* & alibi.

Fructu albo rarior. v. gr. Sund. *An der Voigthæger Prieſter-Trift zur Rechten jenſeits des Grabens unter den Büſchen.*

Floret Junio.

324 Rubus *cæſius* foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule tereti aculeato.

Germ. noſtr. *Brummelbeeren.*

Habitat in dumetis, novalibus, litoribus, freq.

Floret Majo.

325 Rubus *fruticoſus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.

Germ. noſtr. *Braambeeren, Krazbeer, Barendrek.*

Habitat in ſylvis, ſepibus, frequens. v. gr. Sund. *In der Voigdthæger Prieſter-Koppel, und in der Andershæfſchen Koppel.*

Floret Majo.

326

326 Rubus *ſaxatilis* foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus herbaceis.
Germ.
Habitat in umbroſis lapidoſis paſſim.
Sund. *Im Abshæger Kronholze.* In litoribus Jaſmundenſibus. v. gr. *Bey Stubbenkammer* frequens.
Floret Junio.

327 Fragaria *veſca* flagellis reptans.
Germ. *Erdbeerkraut.* Pharm. *Fragaria.*
Habitat in campis apricis, aridis, ſylveſtribus, ſterilibus, frequens, nec non in pinetis paſſim copioſe.
Floret Majo, Junio.

328 Potentilla *Anſerina* foliis pinnatis ſerratis, caule repente.
Germ. *Gænſerich.* Pharmac. *Anſerina.*
Habitat in paſcuis, *viridis*; in argilloſis *argentea*; ubique
Floret Junio.

329 Potentilla *argentea* foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto.
Germ. *Weiſs Fünffingerkraut.*
Habitat in ruderatis, apricis, v. gr. [Gryph. *auf dem Wall.*] Sund. *Am Haynholzſchen Buſch.* item, *vor der Vogelſangſchen Brücke zur Linken* copioſe. item, *auf demDevinſchen Ort.*
Floret Junio.

330 Potentilla *verna* foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis; caulinis ternatis, caule declinato.

Germ.

Germ. *Klein Fünffingerkraut.*
Habitat in paſcuis maritimis paſſim. v. gr. Sund. *Am Ende des Devinſchen Orts auf der kleinen Weide* copioſe.
[Hujus an Variatio? Foliis radicalibus ſeptenis, copioſe creſcit. Gryph. *zu Ludwigsburg auf den Wieſen am Strande.*]
Floret Majo.

331 POTENTILLA *reptans* foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris.
Germ. *Fünffingerkraut.* Pharm. *Pentaphyllum.*
Habitat in apricis, argilloſis, haud infrequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Streng.*] Sund. *Am Barthſchen Wege nahe auſſer dem Tribſeer Damm zur Rechten* copioſe. item, *auf der Tribſeer Weide* & alibi.
Floret Julio.

332 TORMENTILLA *erecta* caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus.
Germ. *Tormentillwurzel.* Pharmac. *Tormentilla.*
Habitat in paſcuis & ſylveſtribus ſiccis, ſterilibus, ericetoſis, ubique. v. gr. Sund. *In der Heide zwiſchen dem Lüdershæger Holze.* item *in der Heide zwiſchen Seemühl, Moyſahl, und dem Steinhæger Holz* copioſe.
Floret Junio, Julio.

333 GEUM *urbanum* floribus erectis, fructu globoſo villoſo: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis.
Germ. *Garaffel, Benedicten-Kraut.* Pharmac. *Caryophyllata.*
Habitat ad ſepes, muros, in umbroſis frequens

quens. v. gr. Sund. *Im Haynholzſchen Buſch.* item, *am Ufer zwiſchen Alte-Fehr und Grahl*, item, *an der Stadt-Mauer.*

Floret Majo.

334 GEUM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis.

Germ.

Habitat in pratis ſubhumidis. v. gr. Sund. *zwiſchen Papenhagen und dem Schütt zur Linken* copioſe.

Floret Aprili.

335 COMARUM *paluſtre.*

Germ. *Siebenfingerkraut.*

Habitat in paludibus uliginoſis ubique. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *Im Voigthæger Prieſter Moor.* item, *im Moor vor Pütt zur Linken.* Copioſiſſimum *im Moor zur Rechten des Weges von Neegaſt nach Seemühlen*; & alibi.

Floret Junio.

CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

336 ACTAEA *ſpicata* racemo ovato, fructibus baccatis.

a) *nigra*, baccis nigris.
Germ. *Chriſtophſ-Wurzel, Schwarzwurzel.*
Habitat in ſylvis, nemoribusque umbroſis.
Jasm. *am Wege von Hagen nach dem Borgſee, im Hagenſchen Gehege* copioſiſſima, alibi rarior. Floret Junio.

337 CHELIDONIUM *majus* pedunculis umbellatis.
Germ. *Schellkraut.* Pharm. *Chelidonium majus.*
Habitat in ruderatis, ad muros frequens. v. gr. Sund. *am Wall und der Stadt-Mauer, &c.*
Floret Majo, Junio.

338 PAPAVER *Argemone* capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro.
Germ. *Akkermohn.*
Habitat in campis et agris, præſertim arenoſis.
Floret Majo.

339 PAPAVER *dubium* capſulis oblongis glabris, caule multifloro ſetis adpreſſis, foliis pinnatiſidis inciſis.
Germ. *Wilder Mohn.*
Habitat inter ſegetes et in aggeribus terrenis. v. gr. Sund. *zur Alten-Fæhr, an der Grablſchen Seite, an der Redoute* copioſe.
Floret Junio.

340 Papaver *Rhoeas* capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis.

Germ. *Klapperroſen.* Pharmac. *Rhoeas.*

Habitat in arvis, agris.

341 Nymphaea *lutea* foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo.

Germ. *Seeblumen.* Noſtr. *Geele Mûmmelken.*

Habitat in lacubus et fluviis frequens. v. gr. [Gryph. in Ricco *hinter den Mûhlen vor dem Fetten Thor &c.* Sund. *im* Knieper *Teich und im* Knieper *Mühlen-Graben*, item *im Andershœſſchen u. VoigthægerSee* copioſe &c.

Floret Junio, Julio.

342 Nymphaea *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido.

Germ. *Waſſerroſen, weiſſe Seeblumen.* Noſtr. *witte Mümmelken.* Pharmac. *Nymphaea alba.*

Habitat cum praecedente, ſed rarior. v. gr. Sund. *im Andershœſſchen und Voigthæger See.* Copioſiſſima in aquoſis *am Wege nach der ſchmalen Heide, zur Linken gegen Bergen über.*

Floret Julio, Auguſto.

343 Tilia *europaea* floribus nectario deſtitutis.

Germ. *Linde.* Pharmac. *Tilia.*

Habitat paſſim in ſylvis, ad pagos, et domus.

Floret Junio.

TRIGYNIA.

344 Delphinium *Conſolida* nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo.

Germ. *Ritterſporn.* Noſtr. *Adbars-Nibben.* Pharmac. *Conſolida regalis.*
Habitat in agris inter ſegetes paſſim copioſe.
Floret Junio, et ſerius

345 ACONITUM *Napellus* foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. †
Germ. *Eiſen-Hüthlein.* Noſtr. *Müz un Huuwe.*
Habitat [Gryphiae. Grubenhagae forte non ſpontanea.]
Floret Julio et Auguſto.

PENTAGYNIA.

346 AQUILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis.
Germ. *Ackeley.* Pharmac. *Aquilegia.*
Habitat in nemoribus rariſſima.
Gryph. *in der Koppel vor Wakkerow.* Sund. *zu Middelhagen im Ellerbruch beym Irrgarten*
Floret Junio, Julio.

HEXAGYNIA.

347 STRATIOTES *Aloides* foliis enſiformibus triangulis ciliato-aculeatis.
Germ. *Waſſer-Aloe.*
Habitat in lacubus et fluviis pigrioribus frequens. v. gr. Sund. *im Knieper Mühlen-Graben,* item *im Graben bey der Papenhæger Allée* copioſe. Copioſiſſima *vor dem Triebſeer Thor zwiſchen der zwoten Zugbrükke und der Tenaille zur Linken im Franken Teich.*
Floret Julio, Auguſto.

POLYGY-

POLYGYNIA.

348 Anemone *Hepatica* foliis trilobis integerrimis.

Germ. *Edel Leberkraut.* Noſtr. *Blaage Oegſchen.* Pharm. *Hepatica nobilis.*

Habitat in ſylvis et nemoribus paſſim frequens. v. gr. Sund. *im Proſsnitzer Holz* frequens, item *im Abshager Holz* copioſe. Iasm. *in der Stubbenitz v. gr. beym Kœnigs-Stuhl* copioſiſſima.

Floret Aprili et ſerius.

349 Anemone *Pulſatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis.

Germ. *Küchenſchellen.* Pharmac. *Pulſatilla.*

Habitat in campis apricis aridis ſterilibus praeſertim Rugiae et Jasmundiae.

Sund. *in der Heide beym Martensdorfer Kruge.* Rug. *in der Ralſewykſchen Heide am Wege von Bergen nach der Iasmundiſchen Fæhre* copioſe. *Nos.* Iasm. *Am Wege von Sagard nach Spieker, auf dem Polchowſchen Mühlen Berge* copioſiſſima. *M. Willich.*

Floret Julio.

350 Anemone *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro.

Germ. Noſtr. *Witte Oegſchen.* Pharmac. *Ranunculus albus.*

Habitat in ſylveſtribus nemoroſis ubique. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp* copioſe.] Sund. *im Haynholzſchen Buſch*, item *in der Anderſhæſſchen Koppel* copioſe.

Floret Aprili.

351 Anemone *ranunculoides* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro.

Germ. Noſtr. *geele Oegſchen.*

Habitat in pratis nemoroſis paſſim.

[Gryph. *neben dem Holz bey Hohenmühlen* et alibi.] Sund. *im Lüdershæger Ellerholz* frequens. item *am Mühlen Graben zu Corts-Mühl* copioſe etc.

Floret Aprili.

352 Thalictrum *minus* foliis ſexpartitis, floribus cernuis.

Germ.

Habitat in apricis, ſiccis, ſterilibus arenoſis elatis. Pom. *auf der alten Burg vor Barth.* Rug. *auf den Aekkern und in der Heide zwiſchen Bergen und der Iasmundſchen Fæhr* copioſe.

Floret Junio.

353 Thalictrum *flavum* caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta.

Germ. *Wieſen-Raute.*

Habitat in pratis ſubhumidis paſſim.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *in der Wieſe zwiſchen Hof-Parow und dem Strande neben dem Graben.* Pom. *am Wege nach Loitz nahe bey Schwingen,* item *bey Barth im Sattelſchen Moor.* Iasm. *am Fuſsſteige von Sagard nach Niehoff in einer Wieſe* copioſisſime.

Floret Junio.

354 Ranunculus *Flammula* foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato.

Germ.

Germ.

Habitat in paſcuis udis paſſim.

Floret Junio.

355 RANUNCULUS *reptans* foliis linearibus, caule repente.

Germ.

Habitat in paſcuis et ericetis, locis humidis, inundatis, frequens.

Floret Junio.

356 RANUNCULUS *Lingua* foliis lanceolatis, caule erecto.

Germ.

Habitat in foſſis aquoſis, aquis limoſis, ad ripas lacuum. v. gr. [Gryph. *auf der Wieſe bey Eldena* et alibi.] Sund. in foſſis *auf den Wieſen zwiſchen dem Knieper Mühlen-Graben und dem Haynholzſchen Buſch*, item *am Knieper Teich.*

Floret Junio, Julio.

357 RANUNCULUS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis.

Germ. *Feigwarzenkraut.* Pharm. *Chelidonium minus.*

Habitat in ruderatis, ſylvis, et nemoribus umbroſis frequens. v. gr. Sund. *an der Stadtmauer bey der Stærkels-Mûhle*, item *in der Andershœffſchen Koppel, und dem Haynholzſchen Buſch* copioſe et alibi.

Floret Aprili, Majo.

358 RANUNCULUS *Thora* foliis reniformibus ſubtrilobis crenatis: caulino ſeſſili, floralibus lanceolatis, caule ſubbifloro. †

Germ. *Wolfswurz. Leopardenwurz.*

Habitat in hortis, cultis, oleraceis. Ame non lectus.

359 Ranunculus *auricomus* foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.

Germ. *Goldblumen.*

Habitat in humidiuſculis præprimis ſylvaticis paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *Im Elmshæger Holz.* Sund. *Am Franken Retrenchement zur Rechten des Weges* rarior. *Im Absbæger Holz* copioſe.

Floret Majo, Junio.

360 Ranunculus *ſceleratus* foliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis

Germ. *Waſſer-Hahnenfuſs.*

Habitat in humidis, paludoſis, & ad aquarum ripas frequens. v. gr. Sund. *An der Stadtmauer zwiſchen dem Fehr und Knieper Thor.* item, *beym Knieper Brunnen* & alibi.

Floret Majo, Junio, Julio.

361 Ranunculus *bulboſus* calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis.

Germ.

Habitat in pratis & paſcuis ſiccis ubique. v. gr. Sund. *Auf der Franken Weide.* item, *Im Haynholzſchen Buſch.*

Floret Majo, Junio, Julio.

362 Ranunculus *repens* calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſarmentis repentibus, foliis compoſitis.

Germ.

Germ. *Hahnenfuſs, Kræhenfuſs.*
Habitat in cultis, ruderatis, paſſim v. gr. Sund. *An der Stadtmauer hinter dem Zeughauſe.*
Floret cum præcedente.

363 RANUNCULUS *polyanthemos* calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis.
Germ. Noſtr. *Butterblumen.*
Habitat in pratis & locis graminoſis rarior.

364 RANUNCULUS *acris* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis linearibus.
Germ. Noſtr. *Butterblumen.*
Habitat in pratis frequens.
Floret Majo, Junio.

365 RANUNCULUS *lanuginoſus* calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirtis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis.
Germ. *Seiden-Hahnenfuſs.*
Habitat in ſylvis cæduis, umbroſis, graminoſis. [Gryph. *Im Grubenhæger, Elmshæger Holz.*] Sund. *Am Haynholzſchen Buſch.* item, *am Mühlengraben zu Corts-Mühl.* item, *Im Abshæger Holz.*
Floret Majo.

366 RANUNCULUS *arvenſis* ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus.
Germ. *Stachel.*
Habitat inter ſegetes paſſim frequens.
Floret Junio.

367 RANUNCULUS *aquatilis* foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis ſubpeltatis.

Germ. *Weiſſer Hahnenfuſs, Haarkraut.*

Habitat in aquis ſtagnantibus, foſſis aquoſis, ad ripas lacuum, ubique cum variationibus. v. gr. Sund. *Auf der Weide vorm Franken Thor rechter Hand* & alibi.

Floret Junio, Julio.

368 Trollius *europaeus* corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum.

Germ.

Habitat in pratis, nemoroſis rarior.

Pom. *Bey Satel im Steinbrings-Buſch* copioſe. Jaſm. *Bey Sagard in der alten Groſs-Volkſizzer Koppel.* Floret Junio.

369 Caltha *paluſtris,*

Germ. *Wieſenblume. Dotterbluhme.* Noſtr. *Kuhblume.*

Habitat in pratis inundatis copioſiſſima.

Floret Aprili.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

370 AJUGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis.
Germ. *Güldengünſel.* Pharm. *Conſolida media.*
Habitat in duris, montoſis, ſiccis rarior.
[Gryph. inter *Eldena & Diedrichshagen.*] Sundiæ *am hohen Uſer des Devinſchen oder Nonnenſees, an der Devinſchen Seite.*
Floret Majo.

371 AJUGA *reptans* ſtolonibus reptantibus.
Germ. *Kriechender Güldengünſel.*
Habitat in nemoroſis umbroſis. v. gr. [Gryph. *bey klein Zaſtrow am VVege, gleich wenn man über den Bach geht.*] Sund. *am Strande nach Devin unter den Büſchen* frequens. item *im Haynholzſchen Buſch* copioſe.
Floret Majo.

372 TEUCRIUM *Scordium* foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis lateralibus pedunculatis, caule diffuſo.
Germ. *Scordien.* Pharm. *Scordium.*
Habitat in nemoroſis paludoſis rarius.
Sund. *im Haynholzſchen Buſch* infrequens. *Nos.* Pom. *in der Alten-Pleenſchen Koppel.* Rug. *in der Gegend um Trent bey Venz;* ex relatione aliorum. Floret Julio, Auguſto.

373 NEPETA *Cataria* floribus ſpicatis, verticillis

lis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis.

Germ. *Kazzenmünze.* Pharm. *Nepeta.*

Habitat in ruderatis, ad ſepes paſſim.

[Gryph. *Unten am Bollwerk bey den Salzkothen.*] Sund. *am Voigthæger Kirchhofe*, item ad ſepes pagi *Devin.*

Floret Julio, Auguſto.

374 MENTHA *aquatica* ſpicis capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus.

Germ. *Waſſermünze.* Noſtr. *Zeeſenbraan.*

Habitat ad ripas lacuum, foſſarum, locisque depreſſis, umbroſis, humentibus, frequens.

Floret Julio.

375 MENTHA *arvenſis* floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus.

Germ. *Ackermünze.*

Habitat in novalibus, agris poſt meſſem, inque pratis humidis, ſat frequens.

Floret æſtate.

376 GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis.

Germ. *Gundelreben.* Noſtr. *Huder.* Pharm. *Hedera terreſtris.*

Habitat in umbroſis, ad ſepes, inque pomariis, ubique.

Floret Majo, Junio.

377 LAMIUM *album* foliis cordatis acuminatis petiolatis, verticillis vigintifloris.

Germ. *weiſſe taube Neſſel.* Pharm. *Lamium album.*

Habitat ad ſepes, in cultis, ruderatis, ubique.

Floret Majo, Junio.

378 LAMIUM *purpureum* foliis cordatis obtuſis petiolatis.

Germ. *rothe taube Neſſel.*

Habitat in cultis, ruderatis, ubique.

Floret Martio, Aprili, & tota æſtate.

379 LAMIUM *amplexicaule* foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis.

Germ.

A) *minus.*

B) *majus.*

Habitat A) in cultis, agris paſſim. B) in hortorum locis ſtercoratis rarius.

Floret Majo, Junio.

380 GALEOPSIS *Ladanum* internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis.

Germ. *blaue taube Neſſel.*

Habitat in agris ſabuloſis, requietis & demetitis paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *gegen Elmshagen zu.*] Sund. *auf den Aeckern zwiſchen Devin und den Devinſchen Ort* copioſe, item in agris prope *Elmenhorſt.*

Floret Majo, Junio, Julio, Auguſto.

381 GALEOPSIS *Tetrahit* internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis.

Germ. *bunte taube Neſſel.*

Habitat inter ſegetes & olera vulgaris.

Colore variat.
Floret Majo, Junio.

382 GALEOPSIS *Galeobdolon* verticillis ſexfloris: involucro tetraphyllo.
Germ. *gelbe taube Neſſel, Goldneſſel.*
Habitat in nemoribus umbroſis, ſylvisque cæduis, frequens. v. gr. [Gryph. *im Holz zu Hohenmühlen.*] Sund. *in der Andershœſſchen Koppel*, item *im Haynholzſchen Buſch* cop.
Floret Majo.

383 BETONICA *officinalis* ſpica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata.
Germ. *Betonic.* Pharm. *Betonica.*
Habitat in pratis, & ſylvis locis humidiuſculis graminoſis rarior.
Pom. *bey Barth auf der Maſtwieſe*, item *am Wege nach Loiz*, *gegen wüſt Eldenow*, *im Fritten Holz.* Alibi non viſa.
Floret Julio.

384 STACHYS *ſylvatica* verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis.
Germ. *taube Heckenneſſel.*
Habitat in umbroſis, nemoroſis frequens. v. gr. Sund. *zwiſchen dem Küter und Tribſeer Thor, hinter die Hecken*, item *im Grünhufſchen Buſch* & alibi.
Floret Junio.

385 STACHYS *paluſtris* verticillis ſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemi-amplexicaulibus.
Germ.
Habitat in agris & pratis humidiuſculis, nec

non

non ad ripas, inque nemoribus paludoſis frequens.
Floret Julio.

386 BALLOTA *nigra* foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis.
Germ. *ſchwarzer Andorn.*
Habitat in ruderatis, ad ſepes ſuburbiorum ubique.
Floret Julio.

387 MARRUBIUM *vulgare* dentibus calycinis ſetaceis uncinatis.
Germ. *weiſſer Andorn.* Pharmac. *Marrubium album.*
Habitat in ruderatis, ad vias & ſepes ſuburbiorum paſſim.
Floret Julio.

388 LEONURUS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis.
Germ. *Herzgeſpann.* Pharm. *Cardiaca.*
Habitat in ruderatis, & tantum ad domos & pagos.
Floret Junio, Julio, Auguſto.

389 CLINOPODIUM *vulgare* capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis.
Germ. *Wirbeldoſt.*
Habitat in umbroſis aridis, & dumetis frequ. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *im Haynholzſchen Buſch,* item *an der Landſtraſſe zwiſchen Andershoff und Teſchenhagen &c.*
Floret Julio.

390 ORIGANUM *vulgare* ſpicis ſubrotundis paniculatis

niculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.

Germ. *Organ, Doſten, Wolgemuth.* Pharmac. *Origanum vulgare.*

Habitat in apricis & ſubumbroſis ſylveſtribus montoſis.

[Gryph. In glareoſis prope Danneberg.] Pom. *auf der alten Burg vor Barth* frequens. Rug. *am Granizzer Ort*, item *bey Pert.* Jasm. in litoribus cretaceis inter *Saſſeniz & Criviz*, & ad rivos Jasmundiæ paſſim freq.

Floret Julio, Auguſto.

391 THYMUS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis.

Germ. *Quendel, Feldkümmel.* Pharmac. *Serpyllum.*

Habitat in campis, paſcuis ſiccis ſterilibus, collibus apricis exaridis frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *auf der Franken und Tribſeer Weide.*

Floret Julio.

392 THYMUS *Acinos* verticillis ſexfloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis.

Germ. *wild Baſilien.*

Habitat in collibus, litoribusque glareoſis, cretaceis ſiccis.

[Gryph. *bey Derſchow.*] Sund. *am Ufer der Inſul Dænholm, an der Seite nach dem Drigge zu,* frequens, item *am Wall zu Altfehr, an der Süderſeite* rarior. Pom. *auf der alten Burg vor Barth* copioſe. Jasm. In litoribus

ribus cretaceis inter *Saſſeniz & Criviz*, paſſim.

Floret Julio, Auguſto.

393 SCUTELLARIA *galericulata* foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.

Germ. *Helmkraut.*

Habitat ad ripas lacuum, & ad foſſas paſſim. v. gr. Sund. *am Knieper Teich bey den Bleichen, und am Knieper Mühlengraben*, item *am Strande nach Devin.*

Floret Junio.

394 PRUNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis.

Germ. *Brunellen.* Pharm. *Prunella.*

Habitat in paſcuis & pratis ſterilibus frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *auf der Franken Weide* & alibi.

[Variatio grandiflora, in ſylvis rarior. Gryph. *bey Elmshagen.*]

Floret Junio.

ANGIOSPERMIA.

395 RHINANTHUS *Criſta galli* corollarum labio ſuperiore compreſſo breviore.

Germ. *Hahnenkamm.* Noſtrat. *Doofradel.*

Habitat in pratis, paſſim copioſiſſime.

Floret Junio.

396 EUPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis.

Germ. *Augentroſt.* Pharm. *Euphraſia.*

Habitat in paſcuis aridis, ericetis, ubique. v.

gr. Sund. *auf der Franken Weide*, item *auf dem Devinſchen Ort* & alibi.
Floret Junio, Julio.

397 Euphrasia *Odontites* foliis linearibus: omnibus ſerratis.
Germ. *brauner Augentroſt.*
Habitat in agris, paſcuisque ſterilibus, paſſim copioſe. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *vor dem Tribſeer Thor, am Wege nach dem hohen Graben* & alibi.
Floret Julio.

398 Melampyrum *arvenſe* ſpicis conicis laxis: bracteis dentato-ſetaceis.
Germ. *ſchwarzer Taubradel.*
Habitat inter Secale, in agris elatis arenoſis ſiccis, præſertim Rugiæ. v. gr. *auf den Aekkern in der Ralſewykſchen Heide zwiſchen Bergen und der Jasmundiſchen Fehr* copioſe.
Agricolis valde infeſta.
Floret Junio.

399 Melampyrum *nemoroſum* floribus ſecundis lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceolatis: ſummis coloratis ſterilibus, calycibus lanatis.
Germ. Noſtrat. *Tag und Nacht.*
Habitat in pratis, nemoribus umbroſis, ſylvisque locis ſucculentis, ubique, pulcherrima planta.
Floret Junio, Julio.

400 Melampyrum *pratenſe* floribus ſecundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis clauſis.

Germ.

Germ.

Habitat in nemoroſis ſiccis.

Sund. *auf dem Devinſchen Ort* copioſe. Rug. *in der RalſeWykſchen Heide, am Wege von Bergen nach der Jasmundiſchen Fehr, im Buſche* copioſe.

Floret Junio.

401 MELAMPYRUM *ſylvaticum* floribus ſecundis lateralibus: conjugationibus remotis, corollis hiantibus.

Germ.

Habitat in ſylvis.

402 LATHRAEA *Squamaria* caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. †

Germ. *ZahnWurz.*

Habitat in ſylvis umbroſiſſimis. [Gryph. *im hohen Holz bey Eldena.*]

Floret Aprili, Majo.

403 PEDICULARIS *paluſtris* caule ramoſo, calycibus calloſo-punctatis, corollis labio obliquis.

Germ. *Lauskraut.* Pharm. *Pedicularis aquatica.*

Habitat in pratis & paſcuis aquoſis, locisque paludoſis, frequens. [Gryph. *bey Wakkerow.*] Sund. *vor dem Tribſeer Thor, in den Wieſen vor Garbodenhagen &c.*

Floret Junio, Julio.

404 PEDICULARIS *ſylvatica* caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato.

Germ. *Lauskraut.*

Habitat in pratis ſylvaticis, nemoribus palu-

doſis paſſim. [Gryph. *zwiſchen Wampen und Ladebow.*] Sund. rarior.

Floret Junio.

405 ANTIRRHINUM *minus* foliis plerisque alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo.

Germ. *kleiner Orant.*

Habitat in maritimis glareoſis & cretaceis ſylvæ Jasmundenſis *Stubbeniz* paſſim copioſe. v. gr. *beym Hengſt und bey der Fahrniz.* Alibi non viſum.

Floret Julio.

406 ANTIRRHINUM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis.

Germ. *Leinkraut, Harnkraut.* Ph. *Linaria.*

Habitat in ruderatis, litoribus, ad margines & foſſas agrorum, paſſim. v. gr. Sund. *auf dem Devinſchen Ort* frequens.

Floret Junio, Julio, Auguſto.

407 SCROPHULARIA *nodoſa* foliis cordatis trinervatis, caule acutangulo.

Germ. *Braunwurz.* Pharm. *Scrophularia.*

Habitat in umbroſis ſucculentis ubique. v. gr. [Gryph. *hinter der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *am Scheidegraben zwiſchen der Andershœfſchen und Voigthæger Prieſter-Koppel,* item *am Barthſchen Wege, zur Linken im Buſch, gegen Grünehuſe über* & alibi.

Floret Junio, Julio.

CLASSIS

CLASSIS XV.
TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

408 MYAGRUM *ſativum* ſiliculis obovatis pedunculatis polyſpermis.
Germ. *Leindotter.*
Habitat in agris inter Linum paſſim.
Floret Julio, Auguſto.

409 MYAGRUM *paniculatum* ſiliquis lentiformibus orbiculatis punctato-rugoſis.
Germ. *Leindotter.* Noſtr. *Knütgen.*
Habitat cum præcedente inter Linum & Hordeum frequens.
Floret Julio, Auguſto.

410 DRABA *verna* ſcapis nudis, foliis lanceolatis ſubinciſis.
Germ. *Hungerblümchen.*
Habitat in aridis paſcuis, arvis, agris frequens. v. gr. Sund. *auf der Franken Weide* copioſe & alibi.
Floret Aprili, Majo.

411 LEPIDIUM *ruderale* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis.
Germ. *Stink-Kreſſe.*
Habitat in ruderatis & ad vias publicas haud infrequens. v. gr. [Gryph. *vor dem Fleiſcher Thor.*]

Thor.] Sund. *vor dem Knieper Thor bey den Zugbrücken und auf dem Materialhoſe.*
Floret Julio.

412 THLASPI *arvenſe* ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris.
Germ. *Baurenſenf.* Pharm. *Thlaſpi.*
Habitat in agris frequens.
Floret Junio, Julio.

413 THLASPI *campeſtre* ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis.
Germ. *Baurenſenf.*
Habitat in arvis, argilloſis infrequens.
Planta (mea) *foliis glabris; affinis præcedenti, ſed major, foliaque ſuperiora ſubhaſtata, magisque dentata.*

414 THLASPI *Burſa Paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis.
Germ. *Tæſchelkraut.* Pharm. *Burſa Paſtoris.*
Habitat in apricis, ruderatis, cultis, ad vias, ubique. v. gr. Sund. *am Retrenchement vor dem Franken Thor* copioſe &c.
Floret Vere.

415 COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis òblongis ſubſinuatis.
Germ. *Læffelkraut.* Pharm. *Cochlearia.*
Habitat ad litora maris Balthici rariſſima, lecta ante 4 annos Sundiæ, *unten am hohen Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees, an der Devinſchen Seite, wo die Quellen ſind.*
Floret Majo.

416 COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis.

Germ.

Germ. *Meer-Rettich.* Pharm. *Armoracia.*

Habitat in ruderatis & foſſarum aggeribus paſſim frequens. v. gr. Sund. *auf dem Knieper Kirchhofe und vor dem Franken Thor, bey der lezten Zugbrücke auf dem Walle* copioſiſſime.

Floret Majo, Junio.

417 Iberis *nudicaulis* herbacea, foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici.

Germ.

Habitat in arenoſis, ſterilibus, nudis. v. gr. [Gryph. *auf demFuchsberge beyHohenmühlen*] Sund. *auf der Heide zwiſchen Voigthagen und Zarrendorf.*

Floret Majo, Junio.

418 Alyssum *incanum* caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis.

Germ.

Habitat in apricis, ſiccis, arenoſis, rarius. Rug. *am Wege nach Bergen, zur Linken auf dem Rothenkircher Berge* copioſe. *Nos.* item *auf dem Paziger Kirchhofe, an der Seite nach dem Hofe. M. Willich.* Jasm. *am Wege von Lanken nach Saſſeniz, hinter dem Lenzer Buſch, zur Linken,* copioſe. *Nos.* Sundiæ non viſum. Floret Julio.

SILIQUOSA.

419 Dentaria *bulbifera* foliis inferioribus pinnatis, ſummis ſimplicibus.

Germ. *Schuppen-Wurz, Zahn-Wurz, Gelkkraut.* Rupp. Jen.

Habitat in Jasmundiæ ſylva *Stubbeniz* dicta paſſim v. gr. *am Wege von Hagen nach Stubbenkammer*, item *auf dem Ufer beym Kœnigſtuhl.* Alibi non lecta.

Floret Junio.

420 CARDAMINE *pratenſis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis: caulinis lanceolatis.

Germ. *Wieſen-Kreſſe.*

Habitat in pratis & foſſis aquoſis frequens. v. gr. Sund. *vor dem Knieper Thor auf den Bleichen und den Wieſen neben dem Mühlengraben.*

Foret Majo, Junio.

421 SISYMBRIUM *Naſturtium aquaticum* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis; foliolis ſubcordatis.

Germ. *Brunnen-Kreſſe, Born-Kreſſe.* Pharm. *Naſturtium aquaticum.*

Habitat ad fontes & rivulos ſylvaticos paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen.*] Sund. *am Graben der aus dem Lûdershæger Ellerholz in den Voigthæger Teich gehet.*

Floret Majo & ſerius.

422 SISYMBRIUM *ſylveſtre* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis.

Germ.

Habitat in ruderatis, aggeribus terrenis paſſim. Sund. *vor dem Tribſeer Thor, am Wege nach dem Vogelſang, zur Rechten.*

Floret Julio.

423 SISYMBRIUM *amphibium* ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis.
Germ.
Habitat in aquoſis.
Floret Junio.

424 SISYMBRIUM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis.
Germ. *Sophienkraut.* Pharm. *Sophia.*
Habitat in ruderatis frequens.
Floret Julio.

425 SISYMBRIUM *Irio* foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. †
Habitat in cultis, ruderatis, hortis.
Floret Junio, Julio.

426 ERYSIMUM *officinale* ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis.
Germ. *Wegeſenf.* Pharm. *Eryſimum.*
Habitat in ruderatis, plateis, juxta muros, frequens. v. gr. Sund. *an den Hecken zwiſchen dem Küter und Tribſeer Thor.*
Floret Julio.

427 ERYSIMUM *Barbarea* foliis lyratis, extimo ſubrotundo.
Germ. *Winter-Kreſſe, St. Barbenkraut.*
Habitat in cultis, aliisque locis ſucculentis paſſim.
Floret Junio, Julio.

428 ERYSIMUM *Alliaria* foliis cordatis.
Germ. *Knoblauchskraut.* Pharm. *Alliaria.*
Habitat ad ſepes paſſim.
Sund. *bey Kortsmühl am Wege nach Reinkenhagen,* item *auf dem Tribſeer Damm, in dem*

Wulfſchen Garten, hinter dem Wagenſchauer, an dem Graben der aus dem Garten nach der Koppel læuft copioſe.
Floret Majo, Junio.

429 Hesperis *inodora* caule ſimplici erecto, foliis ſubhaſtatis dentatis, petalis obtuſis.
Germ.
Habitat Gryphiæ in monticuli *Galgenkamp* dumetis frequens, lecta Julio 1764. Alibi non viſa.
Flores in hac odorati ut in H. matronali, colore rubro & albo variant.

430 Arabis *thaliana* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis.
Germ.
Habitat in arvis & ſabuloſis aridis rarior. v. gr. [Gryph. ſupra *Helmshagen.*] Sund. *zwiſchen Voigthagen und Zarrendorf.*
Floret Junio.

431 Turritis *glabra* foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.
Germ. *Thurmkraut, Glatt Thurmkraut.*
Habitat in ſiccis, apricis, v. gr. [Gryph. *Auf dem Walle*] *zwiſchen Steinbecker und Fetten Thor.* item, *auf dem Galgenkamp.* Sund. *Auf dem Ufer zwiſchen Alte-Fehr und Grahl.* item, *am hohen Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees an der Devinſchen Seite.* Jaſm. *Auf dem Ufer zwiſchen Criviz und Lohm.*
Floret Junio.

432

432 Turritis *hirſuta* foliis omnibus hiſpidis, caulinis amplexicaulibus.

Germ. *Rauch-Thurmkraut.*

Habitat in Jaſmundiæ litoribus inter pagos *Saſſeniz* & *Criviz.* v. gr. *Auf Trip-Ort.*

Floret Julio.

Obſ. Caulis *ramoſus diffuſus, pedalis;* Folia *caulina amplexicaulia, vix ſagittata angulis poſticis obtuſis, ſubdentata, hiſpida.* Flores *albi.* At in præcedente: Caulis *altior, bipedalis, ſtrictus, vix ramoſus:* Folia *caulina amplexicaulia, ſagittata angulis poſticis acutis, glabra, integerrima.* Flores *lutei.* Siliquæ *ſtrictiſſimæ.*

433 Brassica *campeſtris* radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus.

Germ. Noſtr. *Küdik.*

Habitat in agris inter ſegetes.

Floret Junio & ſerius.

434 Sinapis *arvenſis* ſiliquis multangulis toroſo-turgidis, roſtro longioribus.

Germ. *Ackerſenf.* Noſtr. *Kûdik.*

Habitat in agris inter Hordeum frequens.

Floret æſtate.

435 Sinapis *nigra* ſiliquis glabris apice tetragonis.

Germ. *wilder Senf.* Noſtr. *Kûdik.* Pharm. *Sinapi.*

Habitat in agris, cultis, cum præcedente ubique.

Floret Junio, Julio.

436 Raphanus *Raphaniſtrum* ſiliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus.

Germ.

Germ. *Hederich.*
Habitat in agris inter ſegetes.
Floret Junio, Julio.

437 Bunias *Cakile* ſiliculis ovatis lævibus ancipitibus.
Germ.
Habitat ad litora marina arenoſa. v. gr. [Gryph. *Bey Wampen.*] Sund. *Am Strande hinter Bauer-Parow* copioſe.

438 Crambe *maritima* foliis cauleque glabris.
Germ. *Seekohl, Strandkohl.*
Habitat in Wittowiæ litore marino arenoſo inter *Arcona* & *Varnkeviz* copioſe, alibi non viſa.
Floret Julio

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

439 Geranium *cicutarium* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis.

Germ. *Gemein Storchenſchnabel.*

Habitat in paſcuis, cultis, viis, ſterilibus frequens.

Floret tota æſtate.

440 Geranium *ſylvaticum* pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis.

Germ. *Wald-Storchenſchnabel.*

Habitat in ſylvis paſſim. v. gr. [Gryph. *Bey Klein Zaſtrow.*] Sund. *Am Wege nach Klein-Kordshagen zur Linken, gegen Grünehuſe über. Nos.* Pom. *Im Triebſeer Stadt-Holze* copioſe. v. gr. *Im Halſe. M. Willich. Botan. Cultor.*

Floret Junio.

441 Geranium *pratenſe* pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis multipartitis, pinnato-laciniatis rugoſis acutis, petalis integris.

Germ. *Wieſen-Storchenſchnabel.*

Habitat in pratis umbroſis, ad margines ſylvarum, rarius.

Floret Junio.

442 GERANIUM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis.

Germ. *Ruprechts-Kraut. St. Roberts-Kraut.* Pharm. *Geranium robertianum.*

Habitat in ſylvis nemoribusque aſperis, ruderatis, ad muros ubique. v. gr. [Gryph. *An der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *am hohen Graben an der hohen ſteinernen Brücke,* item *in der Andershœſſchen und Voigthæger Prieſter Koppel.*

Floret Majo, Junio.

443 GERANIUM *molle* pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, caule ramoſo erectiuſculo, calycibus muticis, arillis laevibus.

Germ. *weicher Storchenſchnabel.*

Habitat ad pagos, plateas, in cultis.

Sund. *vor dem Franken Thor am Retrenchement.*

Floret Majo.

444 GERANIUM *diſſectum* pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villoſis.

Germ.

Habitat in cultis, rarius.

Floret Junio.

445 GERANIUM *columbinum* pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis: laciniis acutis, arillis glabris, calycibus ariſtatis.

Germ.

Habitat in argilloſis rarius.

Sund. *am Ufer des Devinſchen oder Nonnenſees,*

an

an der Devinſchen Seite, zwiſchen dem Ort und dem hohen Ufer. Alibi non viſum.
Floret Julio.

446 GERANIUM *rotundifolium* pedunculis bifloris, petalis integris obtuſiſſimis longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis.
Germ. *Runder Storchenſchnabel.*
Habitat in cultis, aggeribus terrenis, ubique v. gr. Sund. in vallo urbis copioſe; et alibi.
Floret Junio et ſerius.

447 GERANIUM *ſanguineum* pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis.
Germ.
Habitat in ſiccis umbroſis rarius.
Rug. *in der Granitz.* v. gr. *am Ende derſelben nach Pert zu, oben auf dem Ufer* copioſe.
Floret Julio.

POLYANDRIA.

448 MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis
Germ. *Gænſe-Pappeln.* Noſtr. *Kattenkees.* Pharmac. *Malva vulgaris.*
Habitat in ruderatis, viis frequens.
Floret Junio et Julio.

449 MALVA *ſylveſtris* caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis.
Germ. *Roſs-Pappeln.* Noſtr. *Haaſenpæppel.*

Habitat

Habitat in campeſtribus, umbroſis, ſiccis, cultis, ſepibus frequens.

Floret Aeſtate et Autumno.

450 Malva *Alcea* caule erecto, foliis multipartitis ſcabriuſculis.

Germ. *Roſenpappeln.*

Habitat in apricis duris, dumetis paſſim.

[Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *am Ufer des Devinſchen Ortes, an der Seite nach dem Devinſchen See,* item *am Wege nach Dammgarten hinter Pûtt.*

Floret Auguſto.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

451 Fumaria *bulboſa* caule ſimplici, bracteis longitudine florum.

a) *cava* radice cava, bracteis integris.

Germ. *Hohlwurz.* Pharm. *Ariſtolochia fabacea.*

Habitat in umbroſis nemoroſis, v. gr. Sund. *Am hohen Graben bey der hohen Brükke,* copioſiſſima.

Floret Aprili. Floribus purpureis et albis variat.

b) *intermedia* radice non cava, bracteis integris.

Habitat in umbroſis rarior. v. gr. [Gryph. ad foſſam in ſylva Eldenaenſi cum Farfara.]

Floret Aprili.

Haec (*b*) a me non lecta.

452 Fumaria *officinalis* pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo.

Germ. *Erdrauch.* Pharmac. *Fumaria.*

Habitat in cultis, agris frequens.

Floret Junio.

OCTANDRIA.

453 Polygala *vulgaris* floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari - lanceolatis.

Germ. *Kreutzblume.*
Habitat in paſcuis et ſylveſtribus ſiccis frequens. Colore coeruleo, purpureo, albo, caulibusve procumbentibus et erectis variat.
Floret Junio.

DECANDRIA.

454 SPARTIUM *ſcoparium* foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis.
Germ. Noſtr. *Haaſengeil.*
Habitat in ſylvis et campis aridis apricis arenoſis ſterilibus, ericetis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen.*] Sund. *in der Andershœſſchen Koppel*, item *auf der Heide vor Brandshagen* copioſe et alibi. In Jasmundia non reperitur.
Floret Junio, Julio.

455 GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis.
Germ. *Færberpfriemen.* Noſtr. *Glœſen.* Pharm. *Geniſta.*
Habitat in campis, ericetis paſſim.
[Gryph. *bey Klein Zaſtrow.*] Sund. *in der Heide zwiſchen Zitterhagen und Arndſee* &c.
Floret Julio.

456 ONONIS *ſpinoſa* floribus racemoſis geminis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubvilloſis.
Germ. *Hauhechel.* Noſtr. *Wriefkruut.* Pharm. *Ononis.*
Habitat in agris, campis aridis, litoribus maritimis

timis frequens. v. gr. Sund. *vor dem Knieper Thor am Strande bey der Redoute*, item *auf der Franken Weide* et alibi.

Floret Julio et Auguſto. Prima aeſtate *mitis* eſt.

457 ANTHYLLIS *Vulneraria* herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato.

Germ. *Wundkraut.*

Habitat in elatis campis, collibus, litoribusque apricis ſiccis paſſim.

Pom. *auf der alten Burg vor Barth.* Rug. *auf der Paziger Heide*, item *am Ufer der Granitz zwiſchen dem Granizzer Ort und Pert an einem ſo genannten Ort gerade gegen Sellin über* copioſisſima. *Nos.* In Jasmundia copioſiſſima. v. gr. *an dem Borowſchen Bach*, item *am Fuſsſteige von Bliſchow nach Woſtevitz*, et alibi copioſa. *M. Willich.* Sundiae non viſa. Floret Julio.

458 OROBUS *vernus* foliis pinnatis ovatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici.

Germ. *Faſanenkraut.* Rupp. Jen.

Habitat in Jasmundiae ſylva, *Stubbenitz*, paſſim frequens. v. gr. *beym Kœnigſtuhl.*

Floret Majo. Junio.

Petioli mucrone ſetaceo terminati, polyphylli; Foliolis 4 ad 6, ovatis, acutis, exacte oppoſitis.

459 OROBUS *tuberoſus* foliis pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici.

Germ.

Habitat in pratis ſylvaticis, loco humidiuſculo. v. gr.

Pom. *Wenn man von Groſs*-Kordshagen *nach dem Arbshæger Holz gehet, nahe vor letzterem auf einer Wieſe.* Floret Junio.

Obſ. Caulis *ſimpliciſſimus, angulis duobus membranaceis actus.* Petioli *polyphylli, membranacei, terminati mucrone ſetaceo; Foliolis* 4 *ad ſeſſilibus, exacte oppoſitis, ovali-lanceolatis, mucronatis, integerrimis.* Stipulae *ad baſin cujusque petioli communis binae, lanceolatae, ſemiſagittatae, integerrimae.* Pedunculi *biflori vel quadriflori; Floribus alternis, purpureis.*

460 OROBUS *niger* caule ramoſo, foliis ſexjugis ovato-oblongis.

Germ.

Habitat in montoſis umbroſis rarior.

Rug. *in der Prora.* Iasm. *bey Stubbenkammer.* Floret Junio et ſerius.

Obſ. *Plantae meae* Caulis *ramoſus; Ramis patentibus.* Petioli *polyphylli, mucrone ſetaceo terminati; Foliolis* 10 *ad* 14, *ovato-oblongis, mucronatis; plerumque alternis; exterioribus decrescentibus.* Stipulae *lineari-lanceolatae, integerrimae.* Pedunculi *multiflori; Floribus circiter ſex.*

461 LATHYRUS *pratenſis* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. Germ. *Wie.*

Habitat in pratis, dumetis, ſepibus frequens. Floret aeſtate.

462 LATHYRUS *ſylveſtris* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. Germ.

Germ.

Habitat in dumetis, ſepibus rarior. Semel lectus Sund. *am Wege nach Steinhagen unter den Büſchen.* Floret Julio.

463 Lathyrus *latifolius* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis.

Germ.

Habitat in dumetis, litoribus maritimis umbroſis præſertim Jasmundiæ paſſim. v. gr. Gryphiæ in monticuli *Galgenkamp* dumetis. *Nos.* Pom. *zur Linken am Wege von Tribſees nach Cracau, am Ende der Trift. M. Willich.* Jasm. *am Ufer der Stubbenitz* copioſe. Rug. *am Ufer der Graniz* frequens. *Nos.* Sund. non viſus.

Floret Julio.

464 Vicia *dumetorum* pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis, ſtipulis ſubdentatis.

Germ.

Habitat in dumetis elatis rarior. Sund. *am Wege von Guſtow nach Proſſeniz, zur Rechten auf dem Hünenberge* copioſe. Jasm. *vor Sagard auf dem Dubberwort* copioſe, item *an den Ufern der Stubbeniz* frequens.

Floret Junio, Julio.

Corollæ cœruleo-purpuraſcentes.

465 Vicia *ſylvatica* pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis.

Germ.

Habitat in Jasmundiæ ſylva *Lenzzer Buſch* dicta,

ɕta, frequens. v. gr. *am Wege von Saſſeniz nach Crampas.*

Floret Junio, Julio.

466 Vicia *Cracca* pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris.

Germ.

Habitat in pratis, agris inter ſegetes ubique.

Floret æſtate.

467 Vicia *ſativa* leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliis retuſis, ſtipulis notatis.

Germ. *Wicken.*

Habitat inter ſegetes paſſim.

B) *nigra* foliis anguſtioribus ſublinearibus, leguminibus ſubſolitariis.

Habitat inter ſegetes frequentior, nec non in dumetis. v. gr. Rug. *am Wege von Bergen nach Ralſewyk.* Jasm. *in der Semperſchen Heide unter den Büſchen.*

Florent Junio.

468 Vicia *ſepium* leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus.

Germ. *Zaunwicken.*

Habitat in nemoribus & umbroſis frequens.

Floret Junio.

469 Ervum *tetraſpermum* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. †

Germ.

Habitat in agris & oleraceis cultis.

470 Ervum *hirſutum* pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis.

Habitat

Habitat in agris inter ſegetes frequens.
Floret Iunio, Julio, Auguſto.

471 ORNITHOPUS *perpuſillus* foliis pinnatis, leguminibus ſubarcuatis.
Germ. *Vogelfuſs.*
Habitat in campis ſterilibus arenoſis ſiccis, ericetis, haud infrequens. v. gr. [Gryph. *bey Helmshagen, am Waldgraben bey Hinrichshagen.*] Sund. *zwiſchen Pütt und Born, diſſeits des Pütter Teiches*, itêm *in der Heide zwiſchen Wendorf und Zarrendorf*, item *auf den Sandhügeln und der Heide diſſeits des Devinſchen Mühlenteiches*, *gegen Teſchenhagen.*
Floret Majo, Junio.

472 HEDYSARUM *Onobrychis* foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato.
Germ. *Hahnenkamm, Hahnenkopf.* Rupp. Jen.
Habitat Sundiæ in vallo urbis *zwiſchen der Knieper und Johannis Baſtion*, copioſe. Forſan olim allata, nunc per multos annos ſpontanea planta.
Floret æſtate.

473 ASTRAGALUS *glycyphyllos* cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis; foliis ovalibus pedunculo longioribus.
Germ. *wild Süſsholz.*
Habitat in collibus nemoroſis, montoſis, umbroſis, præſertim Jasmundiæ.
[Gryph. *auf dem hœchſten waldigſten Hügel bey klein Zaſtrow.*] Sund. *am Barthſchen Wege*

zwiſchen der Vogelſangſchen Brücke und klein Kordshagen, zur Rechten am Buſche, wo eine kleine Erhœhung iſt copioſe. *Nos.* Pom. *am Wege von Tribſees nach Cracau zur Rechten, beynahe am Ende der Trift. M. Willich.* Jasm. *an dem Borowſchen Bach*, item *in der Stubbeniz*, v. gr. *auf dem Borgwall und im Lenzer Buſch*, frequens. *Nos.*

Floret Junio, Iulio.

474 Trifolium *Melilotus officinalis* leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto.

Germ. *Meliloten, Steinklee.* Pharm. *Melilotus.*

Habitat in litoribus marinis paſſim.

Sund. *am Strande auf dem Franken Damm vor dem Retrenchement* copioſe, item *am Strande des Devinſchen oder Nonnenſees, nahe beym Devinſchen Ort* copioſe.

Floret Julio.

475 Trifolium *hybridum* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. †

Germ.

Habitat in cultis & ad vias agrorum paſſim rarius.

Floret Auguſto.

476 Trifolium *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente.

Germ. *weiſſer Kleewer.* Pharmac. *Trifolium album.*

Habitat in paſcuis ubique.

Floret Julio.

477 TRIFOLIUM *pratenſe* ſpicis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis.

Germ. *rother Kleewer, Wieſenklee.*

Habitat in graminoſis frequens.

Floret æſtate.

478 TRIFOLIUM *arvenſe* ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis æqualibus.

Germ. *Katzenklee, Haaſenpfœtgen.* Rupp. Jen.

Habitat in arvis, arenoſis frequens.

Floret æſtate.

479 TRIFOLIUM *montanum* ſpicis ſubimbricatis ſubtribus, vexillis ſubulatis emarceſcentibus, calycibus nudis, caule erecto.

Germ. *Bergkleewer.*

Habitat in pratis & collibus ſiccis rarius.

[Gryph. *bey klein Zaſtrow, diſſeits des Bachs.*] Sund. *an der Landſtraſſe nach Brandshagen zur Linken, jenſeits des Weges, der (quer über die Landſtraſſe) von Voigthagen nach Devin gehet.* Rug. *bey Trent im Catharinenholz.* Floret Julio.

480 TRIFOLIUM *agrarium* ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto.

Germ. *Hopfenklee.* Rupp. Jen.

Habitat in paſcuis & collibus ſiccis ſterilibus rarius.

Sund. *am Wege nach Kettenhagen und Parow,* item *am Wege von Guſtow nach Proſſeniz, zur Rechten auf dem Hünenberge* copioſe.

Floret Junio.

481 TRIFOLIUM *procumbens* ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus.

Germ. *gelber Kleewer.*

Habitat ad agrorum margines, inque campeſtribus paſſim.

Floret Junio, Julio.

482 LOTUS *corniculatus* capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus.

Germ. *gelber Schotenklee.*

Habitat in paſcuis & pratis, adque vias vulgatiſſimus.

Varietas major in nemoribus.

483 MEDICAGO *lupulina* ſpicis ovalibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caule procumbente.

Germ. *Hopfenklee.*

Habitat in cultis, arvis, pratis, litoribus ubique.

Floret æſtate.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

484 HYPERICUM *quadrangulum* floribus trigynis, caule quadrato herbaceo.

Germ.

Habitat in pratis, nemoribus, ſylvis paſſim. v. gr. [Gryph. *an der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *in der Voigthæger Prieſter-Trift*, item, *auf dem Devinſchen Ort*, item *im Lüdershæger Ellerholz*, item *am Wege von Guſtow nach Proſſeniz auf dem Hünenberge* copioſe. Rug. *an der Landſtraſſe nach Bergen bey klein Kubbelkow, im Holze.*

Floret Julio, Auguſto.

485 HYPERICUM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis.

Germ. *Johanniskraut.* Pharm. *Hypericum.*

Habitat in collibus, ſepibus, dumetis frequens. v. gr. Sund. *beym Wege nach Brandshagen, zur Rechten auf den Hügeln* & alibi.

Floret Julio.

486 HYPERICUM *humifuſum* floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris.

Germ.

Habitat in pratis humidiuſculis, novalibus paſſim copioſe. Sund.

Sund. *auf dem Drigge, in der Wieſe beym Holze, an der Seite nach Wampen*, item *auf den Aeckern beym Lûdershæger Ellerholz, an der Seite nach Lüdershagen zu*, item *auf den Elmenhorſtiſchen Aeckern.* Pom. *an Wege nach Tribſees, in der Koppel gegen dem Kazzenowiſchen Kruge über* copioſe.

Floret Junio, Julio.

487 HYPERICUM *montanum* floribus trigynis, calycibus ſerraturis glanduloſis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis.

Germ.

Habitat in Jasmundenſis ſylvæ, *Stubbeniz*, litoribus montoſis rariſſimum.

Alibi non viſum.

Floret Julio.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

SEMIFLOSCULOSI.

488 TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis.
Germ. *Bocksbarth.* Pharm. *Barba Hirci.*
Habitat in pratis apricis rarius, in aggeribus terrenis paſſim frequens.
[Gryph. *bey Hohenmühlen.*] Sund. *auf dem Wall zwiſchen dem Schieſswall und dem blauen Thurm* copioſe, item *am Franken Retrenchement,* item *am Ende des Knieper Kirchhofes længſt dem ſchmalen Wege, der auf dem Damm von dem Kettenhæger Wege nach dem Haynholz abgehet* & alibi. Flor. Junio.

489 PICRIS *Hieracioides* perianthiis laxis, foliis integris. †
Germ.
Habitat in agris eorumque verſuris.

490 SONCHUS *arvenſis* pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis.
Germ. *Ackerdieſtel.*
Habitat in agris argilloſis inter ſegetes frequ. v. gr. Sund. *vor dem Knieper Damm, am Wege nach Kettenhagen.*
Floret Junio.

491 SONCHUS *oleraceus* pedunculis tomentoſis, calycibus glabris.
Germ. *Haaſenkohl, Milchdiſtel.*
Habitat in cultis, hortis, ſolo lætiori nimius.
Floret Junio & ſerius.

492 LACTUCA *viroſa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis.
Germ.
Habitat in aggeribus, Sundiæ frequens, alibi rarior.
[Gryph. *Bey der Wallmûhle.*] Sund. *Auf dem Walle beym blauen Thurm.* item, *an der Hoſpitaler Baſtion;* item, *vor dem Tribſeer Thor bey der lezten Zugbrûcke hinter dem Glacis.* item, *vor dem Franken Thor nach der lezten Zugbrücke auf der Bruſtwehr des Walles, wo die Mauer mit Schieſslœcher iſt,* copioſiſſima.
Floret Julio.

493 PRENANTHES *muralis* floſculis quinis, foliis runcinatis.
Germ.
Habitat in ſylvis nemoribusque umbroſis, & ad muros, minus frequens. v. gr. [Gryph. *An der Stadtmauer gegen Norden.*] Sund. *Im Elmenhorſter und Abshæger Holz.*
Floret Julio.

494 LEONTODON *Taraxacum* calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis lævibus.
Germ. *Pfaffenrœhrlein, Dotterblume.* Noſtr. *Butterblume.* Pharm. *Taraxacum.*

Habi-

Habitat in vallis urbium frequentiſſimum, ut in paſcuis, locisque cultis & ruderatis.
Floret Vere & Æſtate.

495 LEONTODON *autumnale* caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.
Germ.
Habitat in paſcuis, pratis frequens.
Floret Julio & ſerius.

496 LEONTODON *hiſpidum* calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis: pilis furcatis.
Germ.
Habitat in pratis & paſcuis frequens. v. gr. [Gryph. *Auf dem Galgenkamp.*] Sund. *In der Andershœſſchen Koppel*; item, *auf dem Altſehrſchen Glacis gegen Grahl*, & alibi.
Floret Junio, Julio, Auguſto.

497 HIERACIUM *Piloſella* foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, caule repente, ſcapo unifloro.
Germ. *Maus-Ohr.* Pharmac. *Auricula muris.*
Habitat in paſcuis aridis, ageribus ubique.
Floret Junio, Julio.

498 HIERACIUM *Dubium* foliis integris ovato-oblongis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro. †
Germ.
Habitat in aggeribus, marginibusque agrorum rarius. [Gryph. *Bey Hohenmühlen nach Hinrichshagen hin.*]
Floret cum præcedente.

499 HIERACIUM *Auricula* foliis integerrimis lanceolatis, ſcapo nudo multifloro ſtolonibus reptantibus.
Germ.
Habitat in pratis & paludum uliginoſarum locis elevatis, ſiccioribus, paſſim.
Sund. *Im Voigthæger Prieſter Moor* cum Droſera.

500 HIERACIUM *murorum* caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori.
Germ. *Buchkohl.* Rupp. Jen.
Habitat in ſylvis.
Floret Junio, Julio.

501 HIERACIUM *paludoſum* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hiſpidis.
Germ.
Habitat in nemoribus paludoſis.
Sund. *Im Buſche vor Neegaſs zur Linken* cop.
Floret Junio.

502 HIERACIUM *ſabaudum* caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus.
Germ. *Habichtskraut.*
Habitat in umbroſis.
[Gryph. *Bey Hohenmühlen und Wampen.*] Sund. *Im Holze vor Brandshagen* copioſe.
Floret æſtate.

503 HIERACIUM *umbellatum* foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis.
Germ.
Habitat in paſcuis, nemoribus ſiccis rarius, in agris

agris elatis præſertim Rugiæ & Jaſmundiæ frequentius v. gr. [Gryph. *Bey Klein Zaſtrow.*] Sund. *In dem Holze zur Rechten des Weges von Arndſee nach Benkenhagen.* item, *auf den Aeckern am Wege nach Voigthagen.*

Floret Julio, Auguſto.

504 CREPIS *tectorum* foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus: inferioribus dentatis, caule glabro.

Germ.

Habitat in apricis, aridis frequens.

Floret æſtate.

505 HYOSERIS *minima* caule diviſo nudo, pedunculis incraſſatis.

Germ.

Habitat in agris, arvis.

[Gryph. copioſe *bey Klein Zaſtrow*, rarior inter *Ladebow* & *Wampen.*] Sund. *Auf den Aeckern vor Arndſee.*

Floret Julio.

506 HYPOCHAERIS *radicata* foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis.

Germ.

Habitat in paſcuis, nemoroſis.

Sund. *Im Holze zur Rechten des Weges von dem Arndſeeſchen Kruge nach Benkenhagen* copioſe; item, *im Eichholze vor Brandshagen.*

Floret Julio, Auguſto.

Obſ. *In planta mea*: Caulis *ramoſus nudus, lævis, ſulcatus, ad exortum ſinguli pedunculi ſquama lanceolata,* Pedunculi *ſuperne incraſ-*

ſati, ſquamis raris lanceolatis adſperſi. Calyx *ovato-oblongus, baſi ventricoſus, imbricatus, foliolis lanceolatis, acutis, ciliatis.* Semina *oblonga, deſinentia in Stipitem ſubulatum, cui inſidet Pappus ſimplex.* Paleæ *ad ſingula ſemina lanceolatæ, longitudine ſeminum usque ad pappum.* Folia *hiſpida.*

Hujus an varietas?

Hypochaeris caule ramoſo, folio unico ad exortum infimi rami, pappo ſeſſili, foliis glabris dentato-ſinuatis *Nobis.* Habitat cum præcedente licet rariſſima.

507 Lapsâna *communis* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis.

Germ. *Reinkohl.*

Habitat in cultis, ruderatis, ſepibus frequens.

Floret Junio.

508 Cichorium *Intybus* floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis.

Germ. *Wegwart, Hindlæuſt.* Pharm. *Cichoreum.*

Habitat ad vias, agrorum margines frequens. v. gr. [Gryph. *Vorm Fleiſcherthor.*] Sund. *Am Wege nach Voigthagen.*

Floret Julio, Auguſto.

CAPITATI.

509 Arctium *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis.

Germ. *Klettendiſtel.* Pharm. *Bardana.*

Habitat in viis, cultis, ruderatis ubique.

Floret Auguſto.

510

510 SERRATULA *tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus.

Germ. *Schartenkraut.*

Habitat in dumetis, pratis ſubhumidis paſſim. [Gryph. *Bey Wampen neben der Trift.*] Pom. *Bey Barth auf der Maſtwieſe.* Rug. *Am Ufer bey Pert.* Sundiæ non viſa.

Floret Junio, Julio, Auguſto.

511 SERRATULA *arvenſis* foliis dentatis ſpinoſis.

Germ. *Saudiſtel. Ackerdiſtel.*

Habitat in cultis, agris, litoribus marinis arenoſis, ubique. v. gr. Sund. *Am Strande nach Devin* copioſiſſima, & alibi.

Floret Julio.

512 CARDUUS *lanceolatus* foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo.

Germ. *Diſtel, groſſer Diſtel.*

Habitat in cultis, ruderatis.

Floret Julio.

513 CARDUUS *acanthoides* foliis decurrentibus ſinuatis margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis.

Germ. *Diſtel, Wegdiſtel.*

Habitat in ruderatis, aggeribus, ad pagos & ſepes frequens.

Floret Julio.

514 CARDUUS *criſpus* foliis decurrentibus ſinuatis margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus inermibus.

Germ. *Diſtel, krauſer Diſtel.*

Habitat in agris, cultis, ruderatis.
Floret Julio.

515 Carduus *paluſtris* foliis decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus.
Germ. *Sumpfdiſtel.*
Habitat in pratis humidis, præprimis ſylvaticis frequens. v. gr. Sund. *Im Buſch bey Grünehuſe.* Floret Julio.

516 Carduus *acaulis* acaulis, calyce glabro.
Germ. *Herbſtdiſtel.*
Habitat in paſcuis apricis frequens. v. gr. [Gryph. *zwiſchen Hinrichshagen und Derſchow.*] Sund. *Auf der Franken Weide.*
Floret Auguſto.

517 Cnicus *oleraceus* foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis ſubcoloratis integris convaris.
Germ. *Kohldiſtel.*
Habitat in pratis, nemoribusque humidis, foſſis umbroſis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey Hohenmühlen.*] Sund. *Am Wege nach Klein Kordshagen zur Linken.* item, *zwiſchen Guſtow und Proſſeniz.* item, *Am Ufer nach Devin.* item, *auf der Wieſe vor Niederhoff, beym Wege der vor Brandshagen nach Niederhoff abgeht.*
Floret Auguſto, Septembri.

518 Carlina *vulgaris* caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis.
Germ. *Sooddiſtel, gemein Eberwurz.*

Habitat

Habitat in aridis, ſabuloſis, montoſis paſſim. v. gr. Sund. *Vor Pütt*; item, *auf den Sandbergen zwiſchen Devin und Teſchenhagen, diſſeits des Devinſchen Mühlenteiches.*

Floret Auguſto.

519 BIDENS *tripartita* foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis.

Germ. *Zweyzahn.*

Habitat in inundatis, aquoſis, foſſis, frequens. v. gr. Sund. *Auſſerhalb des Franken Retrenchements im Graben. &c.*

Floret Julio et Auguſto.

Obſ. Folia *inferiora pinnatifida, media trifida, ſumma ſæpe indiviſa, omnia ſerrata, pagina prona hiſpida, ut Caulis.* Involucrum *5 ſ. 7 phyllum, patens; foliolis lanceolato-ovatis, ciliatis.* Semina *quadrangula, angulis oppoſitis 2 obtuſiſſimis, 2 acutiſſimis, omnibus retrorſum aculeatis; coronata* Ariſtis *2, rectis, retrorſum hiſpidis.*

520 BIDENS *cernua* foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis.

Germ.

Habitat ad fontes & foſſas. v. gr. Sund. *Zu Voigthagen zwiſchen dem Müllerhauſe und dem Teiche;* item, *vor Neegaſs zur Linken beym Borgwallſchen Teich* copioſe.

Floret Julio, Auguſto.

Cum de differentia inter hanc & COREOPSIN *Bidentem* incertus ſemper fuerim, adjungam quæ in individuis a me lectis obſervare licuit, determinent Botanici peritiores.

Planta *(mea) utplurimum radiata, magnitudine variat, ſolo lætiori fere tripedalis ramoſiſſima, ſteriliori pedalis vix ramoſa.* Caulis *hiſpidus.* Folia *ſerrata glabra.* Involucrum *plerumque 5 phyllum; foliolis lanceolatis ciliatis.* Calyx *ſimplex, foliolis octo, membranaceis, coloratis.* Corollæ Radii *ligulatæ neutræ, utplurimum 8.* Paleæ *ſimillimæ foliolis calycinis.* Semina *quadrangula, angulis oppoſitis 2 obtuſiſſimis, 2 acutiſſimis, omnibus retrorſum aculeatis; coronata* Ariſtis 4, *rectis, retrorſum hiſpidis.*

Planta non radiata a Radiatâ, meo quidem judicio, non diſtinguenda, niſi floribus magis cernuis. Forſitan quoque Radiata ætate non radiata evadit, cum ſimul creſcant, & hancce incipiente floreſcentia legere nunquam contigerit, ſed ſolummodo cum ſemina jam perfici inceperint.

521 EUPATORIUM *cannabinum* foliis digitatis.

Germ. *Waſſerdoſten.* Pharmac. *Eupatorium.*

Habitat ad aquas, inque foſſis, nemoroſis humidis frequens. v. gr. [Gryph. *Bey Hohenmühlen.*] Sund. *Im Haynholzſchen Buſch.* item, *am Ufer nach Devin* & alibi.

Floret Junio, Julio.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

522 TANACETUM *vulgare* foliis bipinnatis inciſis ſerratis.

Germ. *Reinfahren.* Pharmac. *Tanacetum.*

Habitat

Habitat in aggeribus, marginibus agrorum, pratis ſiccis, adque nemora, frequens. v. gr. Sund. *Gegen dem Kœpfenberge über*, item *am hohen Graben.* item, *am Haynholzſchen Buſch* copioſiſſime, & alibi.

Floret Auguſto, Septembri.

523 Artemisia *campeſtris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis.

Germ. *Feld-Wermuth.*

Habitat in campis, apricis, aridis, adque vias. v. gr. [Gryph. *Bey Hanshagen.*] Sund. *am Wege nach Voigthagen.* item, *am Ufer des Devinſchen Orts* copioſe.

Floret Julio, Auguſto.

524 Artemisia *maritima* foliis multipartitis tomentoſis, racemis cernuis, floſculis femineis ternis. †

Germ. *See-Wermuth.*

Habitat ad litora maris.

525 Artemisia *Abſinthium* foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo.

Germ. *Wermuth.* Pharm. *Abſinthium vulgare.*

Habitat in ruderatis, aridis, & ad pagos ubique. v. gr. Sund. *Auf dem Voigthæger Kirchhofe &c.*

Floret æſtate.

526 Artemisia *vulgaris* foliis pinnatifidis planis inciſis: ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus, floribus ovatis: radio quinquefloro.

Germ. *Beyfuſs, Stabwurz.* Pharm. *Artemiſia rubra, alba.*

Habitat in cultis ruderatis ubique.
Floret Julio.

527 Gnaphalium *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, caule ſimpliciſſimo, corymbo compoſito.
Germ. *Reinblümen.* Pharmac. *Stoechas citrina.*
Habitat in litoribus, campis, arenoſis ſiccis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Neuenkirchen und Derſchow.*] Sund. *am Wege nach Steinhagen*, item *am Wege nach Parow.* Copioſiſſimum in litore Inſulae *Dæhnholm.*
Floret Julio, Auguſto.

528 Gnaphalium *dioicum* ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminali, floribus dioicis.
Germ. *Katzenpfœtgen.* Pharmac. *Gnaphalium.*
Habitat in apricis, aridis, ericetis frequens.
Floret Majo.

529 Gnaphalium *ſylvaticum* caule ſimpliciſſimo, floribus ſparſis.
Germ.
Habitat in ſylvis nemoribusque arenoſis.
[Gryph. *Bey Kœtenhagen.*] Sund. *im Tannenholz bey Martensdorf.* item *auf dem Devinſchen Ort.* item *im Eichholze vor Brandshagen* copioſe.
Floret Junio, Julio.

530 Gnaphalium *uliginoſum* herbaceum, caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus.
Germ. *Wegruhrkraut.*

Habitat

Habitat ubi aquae hyeme ſtagnarunt, ſaepe in ipſis viis frequens.

Floret aeſtate.

531 CONYZA *ſquarroſa* foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboſo.

Germ. *Dürrwurz.*

Habitat in ſiccis, apricis rariſſima.

Sund. *Beym Papenhæger Schütt*, ubi unicam plantam legi Julio 1762, poſtea fruſtra quaeſivi.

532 ERIGERON *acre* pedunculis alternis unifloris.

Germ.

Habitat in apricis, ſiccis, arenoſis frequens.

Floret Junio, Julio.

533 TUSSILAGO *Farfara* ſcapo imbricato unifloro, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis.

Germ. *Huflattich.* Pharmac. *Farfara, Tuſſilago.*

Habitat in argilloſis, litoribus, ad foſſas, paſſim copioſe. v. gr. [Gryph. *Bey Eldena.*] Sund. *am Strande vorm Knieper und Franken Thor, an den leimigten Ufern*, it. *am hohen Graben.*

Floret Martio et initio Aprili.

534 TUSSILAGO *Petaſites* thyrſo ovato, floſculis omnibus hermaphroditis.

Germ. *Peſtilenzwurz.* Noſtr. *Laddick.* Pharm. *Petaſites.*

Habitat in ruderatis, nec non in cultis.

Gryph. *vor dem Fleiſcherthor am Stadtgraben.* Sund. *vor dem Tribſeer Thor am Barthſchen Wege zur Rechten* copioſe. item *am Franken*

ken Retrenchement, wo es an den Franken Teich ſtœſt copioſe, et alibi. Floret Aprili.

535 Senecio *vulgaris* corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis

Germ. *Kreuzwurz.* Noſtr. *Schwulſtkruut.*

Habitat in cultis, ruderatis, plateis ubique.

Floret Vere et Aeſtate.

536 Senecio *Jacobaea* corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto.

Germ. *Jacobskraut.*

Habitat in paſcuis, et nemoroſis, nec non ad ſepes frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Wall.*] Sund. *im Haynholzſchen Buſch* et alibi.

Floret Julio.

537 Aster *Tripolium* foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inaequatis, floribus corymboſis.

Germ. *Waſſerſternbluhme.*

Habitat in litoribus marinis inundatis, et foſſis ſalſis frequens. v. gr. [Gryph. *auf dem Roſenthal, bey der Salzhûtte.*] Sund. *am Graben beym Franken Retrenchement*, item *auſſer dem Knieper Thor, vor der Salzſiederey, in den Græben wo ehedem das Retrenchement geweſen* copioſe.

Floret Augnſto, Septembri.

538 Solidago *Virgaurea* caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis.

Germ. *Goldruthe.* Pharmac. *Virga aurea.*

Habitat in paſcuis ſiccis, ad ſepes, muros, aggeres paſſim. v. gr. Sund. *in der Voigthæ-*

ger

ger Prieſter Koppel auf dem Ufer des Teiches, item *auf dem Ufer zwiſchen Alte-Fæhr und Grahl*, item *auf dem Devinſchen Ort.*

Floret Auguſto.

539 INULA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis.

Germ. *Aland-Wurzel.* Pharmac. *Enula.*

Habitat in pratis depreſſis, ad foſſas, pagos et templa rarius.

[Gryph. *zu Friedrichshagen und Grubenhagen.*] Sund. *zu Abshagen auf dem Kirchhofe* copioſiſſime. *Nos.* Jasm. *in der Klein Jasmundiſchen oder Schæfereyſchen Koppel, hinter der Scheune* copioſiſſime. *M. Willich.*

Floret Auguſto.

540 INULA *Brittannica* foliis amplexicaulibus lanceolatis diſtinctis ſerratis ſubtus villoſis, caule ramoſo villoſo erecto.

Germ.

Habitat in inundatis, et nemoroſis paludoſis paſſim. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp und bey Wampen.*] Sund. *im ſumpfigten Buſche am Ende der Trift die zur Linken des Weges von Hof-Parow nach Bauer-Parow abgehet*, item *am Strande nach Devin* copioſe, item *vor Neegaſs, wo der Borgwalliſche See an den Weg flieſt* copioſe.

Floret Julio, Auguſto.

541 INULA *Pulicaria* foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis.

Germ.

Habitat

Habitat ad vias ubi aquae pluviales ſtagnarunt frequens ubique.
Floret Julio.

542 INULA *ſalicina* foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſerrato-ſcabris, floribus inferioribus altioribus, ramis ſubangulatis glabris.
Germ.
Habitat Sundiæ *im Haynholzſchen Buſch* rarior.
Floret Julio.

543 CINERARIA *paluſtris* floribus corymboſis, foliis lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caule villoſo.
Germ.
Habitat in aquoſis, paluſtribus frequens. v. gr. Sund. *Beym Knieper-Brunnen.* item, *zur Rechten des Weges von Devin nach Brandshagen im Moor gegen Teſchenhagen über*, & alibi.
Floret æſtate.

544 ARNICA *montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppoſitis.
Germ. *Wolwerley. Mutterwurz.* Pharm. *Arnica.*
Habitat in pratis & paludibus locis elevatis apricis, nec non in ſylvis ſterilibus.
[Gryph. *Im Holze bey Hanshagen.*] Sund *zur Rechten des Weges von Neegaſs nach Seemûhlen, im Moor ohngefehr 300 Schritte vom Wege* copioſe. Pom. *In der Wieſe beym Arbshæger Holz, an der Seite nach Groſs-Kordshagen zu.* item, *Bey Barth im Satelſchen Moor* copioſe.
Floret Junio, Julio.

545 Bellis *perennis* ſcapo nudo.
Germ. *Gænſeblümchen, Marienblümchen, Marlblümchen.* Pharmac. *Bellis minor.*
Habitat in paſcuis apricis, aliisque locis graminoſis ubique.
Floret toto fere anno.

546 Chrysanthemum *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis, inferne dentatis.
Germ. *Iohannis-Blume.* Rupp. jen. Pharmac. *Bellis pratenſis.*
Habitat in pratis ſiccioribus, aggeribus, paſſim; nec non in agris inter ſegetes, ſed rarius.
Floret Julio

547 Chrysanthemum *ſegetum* foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis; inferne dentato-ſerratis.
Germ. Noſtr. *Wokerblume.*
Habitat inter ſegetes æſtivas, præſertim Hordeum, nimium.
Floret Junio, Julio.

548 Matricaria *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis.
Germ. *Mutterkraut.* Noſtr. *Mater.* Pharmac. *Matricaria.*
Habitat in cultis, ruderatis infrequens.
Floret Majo & ſerius.

549 Matricaria *maritima* receptaculis hemiſphæricis, foliis bipinnatis ſubcarnoſis: ſupra convexis, ſubtus carinatis.
Germ.

Habitat

Habitat in litoribus maris.

Sund. *Am Strande vor dem* Knieper *Thor* cop. Floret Septembri.

Nonne eadem planta recenſita eſt nomine CHRYSANTHEMI *inodori* a Linn. Spec. Plant. Ed. 2. pag. 1253? *Nam & huic* calycis ſquamæ margine membranaceo fuſco cinctæ *attribuuntur* in Linn. It. Wgth. 148.

550 MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſeminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus.

Germ. *Chamillen.* Noſtr. *Kamellen.* Pharmac. *Chamomilla noſtras.*

Habitat in cultis, agris ſecalinis frequens. Floret Junio, Julio.

551 ANTHEMIS *arvenſis* receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus coronato-marginatis.

Germ. Noſtr. *wilde Kamellen.*

Habitat in arvis & agris requietis frequens. Floret Junio et ſerius.

552 ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus nudis.

Germ. *Kroten-Till, Hundstill.* Noſtr. *Hundeblumen.*

Habitat ad vias, in ruderatis, & agris ubique. Floret æſtate.

553 ANTHEMIS *tinctoria* foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo.

Germ. *Ochſenauge, Rindsauge,* Rupp. Jen.

Habitat in collibus, aggeribus, litoribus argilloſis, ſiccis paſſim.

Sund. *am Ufer nach Parow,* item *am Altfehrſchen*

ſchen Wall, an der Sûderſeite, und an der Redoute nach dem Grahl hin copioſe. Pom. *auf der alten Burg vor Barth.*

Floret Julio, Auguſto.

554 Achillea *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis.

Germ. *wilder Bertram.* Pharm. *Ptarmica.*

Habitat in pratis humectis & ad ſepes infrequ. [Gryph. *auf dem Galgenkamp, bey Wampen.*] Sund. *im Voigthæger Prieſter-Moor,* item *im Moor zwiſchen Neegaſs und Seemühlen zur Rechten.*

Floret Junio, Julio, Auguſto.

555 Achillea *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſulcatis.

Germ. *Schaafgarbe.* Pharm. *Millefolium.*

Habitat in graminoſis, paſcuis, pratis frequens v. gr. Sund. *auf dem Knieper Kirchhofe* & alibi.

Variat floribus purpureis ſed rarius.

Floret Junio.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

556 Centaurea *Cyanus* calycibus ſerratis: foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis.

Germ. *Kornblume.* Noſtr. *Trempſen.* Pharm. *Cyanus.*

Habitat in agris ſecalinis & triticeis copioſa.

Variat interdum floribus albidis, vel ſaturatiſſime purpureis.

Floret Julio.

557

557 CENTAUREA *Scabioſa* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis.
Germ. *Hartkopf.* Noſtr. *Hartkop.*
Habitat in pratis ſterilibus, agris & litoribus præruptis limoſis frequens.
Floret Auguſto.

558 CENTAUREA *Jacea* calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis.
Germ. *Flockenkraut, Flockblume.* Rupp. Jen.
Habitat in pratis, campeſtribus, apricis, duris. v. gr. [Gryph. *auf dem Galgenkamp.*] Sund. *auf dem Devinſchen Ort* & alibi.
Floret Julio, Auguſto.

POLYGAMIA NECESSARIA.

559 FILAGO *germanica* panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis.
Germ. *Ruhrkraut.*
Habitat in agris & campis ſabuloſis ſiccis & ad vias paſſim.
Sund. *vor Drewshoff* & alibi.
Floret æſtate.
Obſ. *In mea flores axillares & terminales.*

560 FILAGO *montana* caule erecto diviſo, floribus conicis lateralibus axillaribusque.
Germ. *Berg-Ruhrkraut.*
Habitat in ſabuloſis, aridis.
[Gryph. *bey Ungnad.*] Sund. *bey Devin.*
Floret Auguſto.

561 Filago *arvenſis* floribus conicis lateralibus, caule paniculato.
Germ. *Acker-Ruhrkraut.*
Habitat in agris ſabuloſis haud infrequens. v. gr. Sund. *gegen Lüſſow.*
Floret Auguſto.

MONOGAMIA.

562 Jasione *montana.*
Germ.
Habitat in arenoſis ſiccis, campis, collibus, & agris frequens. v. gr. [Gryph. *zwiſchen Helmshagen und Hohenmühlen.*] Sund. *in der Heide vor Pütt* & alibi.
Floret Junio, Julio, Auguſto.

563 Viola *paluſtris* acaulis, foliis reniformibus.
Germ. *Sumpf-Violen.*
Habitat in pratis humidis & ad paludes paſſim frequens. v. gr. [Gryph. *zwiſchen Hinrichshagen und Subſow.*] Sund. *auf der Weide zwiſchen dem Franken und Tribſeer Thor.* item *zwiſchen dem Lüdershæger Eichholz und dem Wege von Voigthagen nach Wendorf.*
Floret Majo.

564 Viola *odorata* acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus.
Germ. *Merz-Violen.* Pharm. *Viola, Violaria.*
Habitat in graminoſis, aggeribus, collibus. Sund. *am Walle* copioſe.
Floret Aprili.

565 VIOLA *canina* caule adultiore aſcendente, foliis oblongo-cordatis.

Germ. *Hunds-Violen.*

Habitat in ſylvis nemoribusque umbroſis ubique. v. gr. Sundiæ *in der Andershœfſchen Koppel.*

Floret Aprili, Majo.

566 VIOLA *tricolor* caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis dentatis.

Germ. *Freyſamkraut*, *Stiefmütterchen.*

A) *bicolor* floribus albis & luteis, rarior floribus albis & cœruleis.

Habitat in arvis, aggeribus ſiccis ubique.

Floret Aprili.

567 IMPATIENS *noli tangere* pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus.

Germ. *Springkraut.*

Habitat in humidis ſpongioſis umbroſis, paſſim copioſe. v. gr. [Gryph. *im Graben, am Wege wenn man von Eldena nach Kœtenhagen geht.*] Sund. *im Lüdershæger Ellerholz*, item *im Ellerholz zu Mittelhagen.*

Floret Julio.

CLASSIS

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

568 ORCHIS *bifolia* bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus.

Germ.

Habitat in paſcuis aſperis, apricis, nec non in ſylvis & nemoribus paſſim. v. gr. Sund. *in der Andershœſſchen Koppel,* item *im Moor, diſſeits Pütt, zur Linken,* item *im Abshæger Holz.*

Floret Junio.

569 ORCHIS *Morio* bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo, petalis omnibus conniventibus.

Germ. *Knabenkraut.*

Habitat in pratis ſubhumidis frequens. v. gr. [Gryph. *bey Hohenmühlen.*] Sund. *auf den Wieſen vor der Vogelſangſchen Brücke, zur Rechten,* item *auf den Wieſen vor Garbodenhagen.*

Floret Junio.

570 ORCHIS *maſcula* bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis.

Germ.

Habitat in pratis ſiccis ſubnemoroſis, præſer-

tim Jasmundiæ. v. gr. *am Wege nach Hagen, zwiſchen Nipmerow und Flegen* copioſe.
Floret Junio, Julio.

571 ORCHIS *uſtulata* bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis diſtinctis.
Germ.
Habitat in Jasmundia in litoribus ſylvæ *Stubbeniz* dictæ frequens. v. gr. *bey Stubbenkammer.*
Floret Junio.

572 ORCHIS *latifolia* bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.
Germ. *breitblættrigtes Knabenkraut.*
Habitat in pratis humidis frequens.
Variatio flore albo rarior. Sund. *am Knieper Mühlengraben, nahe vor dem Vogelſangſchen Buſch,* cum rubra.
Floret Majo, Junio.

573 ORCHIS *maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorſalibus patulis.
Germ. *gefleckte Knabenkraut.*
Habitat in ſucculentis, umbroſis, pratis frequ. v. gr. Sund. *im Voigthæger Moor,* item *im Holze, zur Rechten des Weges von Arndſee nach Benkenhagen.* Jasm. in litoribus *der Stubbeniz* locis ſcaturiginoſis ubique.
Floret Junio.

574 ORCHIS *conopſea* bulbis palmatis, nectarii cornu

cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido; petalis duobus patentiſſimis.

Germ.

Habitat in pratis, nemoroſis infrequens.

[Gryph. *bey Hohenmühlen und Hinrichshagen.*] Jasm. *an den Ufern der Stubbeniz*, v. gr. *bey Stubbenhœrn.*

Floret Junio et Julio.

575 OPHRYS *Nidus avis* bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido.

Germ. *Vogelneſt.*

Habitat in ſylvis umbroſiſſimis.

[Gryph. in ſylva Eldenaenſi, item, inter *Kœtenhagen & Friedrichshagen.*] Sundiæ *im Abshæger Holz.* Jasm. *in der Stubbeniz* paſſim copioſe præſertim verſus litora, v. gr. *in der Hinrichsgrund* copioſiſſime.

Floret Junio.

576 OPHRYS *ovata* bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido.

Germ. *Zweyblatt.*

Habitat in pratis ſylvaticis ſubhumidis.

[Gryph. *bey Hohenmühlen* copioſe.] Sund. *am Barthſchen Wege, zur Linken, im Buſch, gegen Grünehufe über*, item *im Abshæger Holz im Heller* copioſe.

Floret Junio.

577 OPHRYS *Monorchis* bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido cruciato.

Germ.

Habitat in pratis uliginoſis rariſſima.

Rug. *in der Campwieſe bey Tribberaz.* Jasm.

in einer ſumpfigten Wieſe an dem Sagardſchen Bach.

Floret Julio.

578 SERAPIAS *Helleborine* bulbis fibroſis, floribus erectis bractea brevioribus.

Germ.

Habitat in ſylvis, v. gr. [Gryph. in ſylva Grubenhagenſi.] Sund. *im Drigger Holz*, item *im Abshæger Holz.* Jasm. in litoribus *der Stubbeniz.* v. gr. prope *Stubbenkammer* frequens.

Floret Junio, Julio.

Hujus ſingularis varietas; Floribus dimidio brevioribus, ſaturate violaceis, *copioſe naſcitur* in litoribus cretaceis *der Stubbeniz*, v. gr. *beym Hengſt*, item *bey der Fahrniz.*

Floret Julio.

579 SERAPIAS *longifolia* bulbis fibroſis, floribus erectis bractea longioribus.

Germ.

A) paluſtris.

Habitat in paludibus rarior. Sund. *im Voigthæger Moor*, item *im Moor, rechter Hand, zwiſchen Neegaſs und Seemühlen.*

B) montana.

Habitat in ſylvis montoſis. Jasm. in litoribus *der Stubbeniz*, v. gr. *bey Stubbenkammer, neben dem Fuſsſteige der beym Kœnigſtuhl herunter geht.* Rug. *in der Graniz.*

Flore purpuraſcente & candido variat.

Florent Junio, Julio.

580 CYPRIPEDIUM *Calceolus* radicibus fibroſis, foliis ovato-lanceolatis caulinis.

Germ. *Marienſchu.*

Habitat in Jasmundiæ litoribus cretaceis umbroſis *der Stubbeniz.* v. gr. *neben dem Fuſsſteige beym Kœnigſtuhl,* item *zwiſchen Stubbenkammer und Stubberort*, copioſe.

Floret Junio.

POLYANDRIA.

581 CALLA *paluſtris* foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito.

Germ.

Habitat in paludibus præſertim nemoroſis v. gr. Sund. *vor Neegaſs*, *linker Hand*, *im Ellerbruche, und zur Rechten neben dem Borgwalliſchen Teich.*

Floret Julio, Auguſto.

CLASSIS XXI.
MONOECIA.

DIANDRIA.

582 LEMNA *triſulca* foliis petiolatis lanceolatis.
Germ. Noſtr. *Seekreſſe.*
Habitat ſub aquis lente fluentibus, puris, pigris paſſim v. gr. Sund. *im Knieper Mühlengraben, und im Graben bey der Papenhæger Allée.*
Floret Julio.

583 LEMNA *minor* foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis.
Germ. *Waſſerlinſen.* Noſtr. *Entenflott.*
Habitat in aquis ſtagnantibus & quietis frequ. v. gr. Sund. *im Graben beym Schieſswall* & alibi.

584 LEMNA *polyrrhiza* foliis ſeſſilibus, radicibus confertis. †
Germ.
Habitat in paludibus, foſſis.

TRIANDRIA.

585 TYPHA *latifolia* foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula femineaque approximatis.
Germ. *Teichkolben.* Noſtr. *Bullenpæſch.*
Habitat in paludibus, foſſis aquoſis paſſim.
Sund. *im Graben um der Redoute beym Wege*

nach

nach Haynholz, item, in paludoſis *des Devinſchen Orts*, v. gr. *am Anfange deſſelben, nahe beym Devinſchen See* copioſe.

Floret Julio, Auguſto.

Obſ. Folia *ſuperne enſiformia, inferne ſemicylindrica vaginantia.*

586 TYPHA *anguſtifolia* foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula femineaque remotis.

Germ.

Habitat ad ripas piſcinarum, paludum, & in foſſis aquoſis, frequens. v. gr. [Gryph. *im Rickfluſs.*] Sund. *am Knieper Teich* & alibi.

Floret Julio, Auguſto.

587 SPARGANIUM *erectum* foliis erectis triquetris.

Germ.

Habitat in foſſis aquoſis, & ad piſcinas frequ. v. gr. Sund. *in einer ſumpfigten Wieſe dicht vor dem Brandshæger Eichholze* & alibi.

Floret æſtate.

588 CAREX *pulicaris* ſpica ſimplici androgyna: ſuperne maſcula, capſulis divaricatis retroflexis. †

Germ. *kleines Riedgras.*

Habitat in paludibus limo repletis æſtate vix exſiccandis, acceſſu difficilioribus. [Gryph. *im Grubenhæger Torfmoor.*]

589 CAREX *arenaria* ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro.

Germ. *Sand-Riedgras.*

Habitat in arena præſertim mobili frequens.

 v. gr.

v. gr. Sund. *am Strande hinter Bauer-Parow, beym Parowſchen Haken* copioſe, item *auf den Sandbergen diſſeits des Devinſchen Mühlenteiches.* Rug. *auf den Ralſewykſchen Dünen bey Ahlbek,* copioſiſſime, & alibi.

Floret Julio.

590 Carex *uliginoſa* ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo tereti.

Germ. *Sumpf-Riedgras.*

Habitat in uliginoſis ſylvaticis rarior.

Jasm. *zu Saſſeniz auf der Weide zwiſchen der Waſſermühle und der Kalkbrennerey* copioſe.

Floret Julio.

591 Carex *leporina* ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis.

Germ. *Haaſen-Riedgras.*

Habitat in pratis humidioribus rarior.

Sund. *beym Barthſchen Wege, ehe man nach der Vogelſangſchen Brücke kœmt, zur Rechten.*

Floret Majo.

592 Carex *vulpina* ſpica ſupradecompoſita inferne laxiore: ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus glomeratis: ſuperne maſculis.

Germ. *Fuchs-Riedgras.*

Habitat in vepretis & juxta aquas paſſim. v. gr. Sund. *zwiſchen dem Knieper Glacis und der Salpeterſiederey, an den Græben wo vordem das Retrenchement geweſen,* item *beym Barthſchen Wege zur Linken gegen Grünehuſe im Buſch am Graben neben dem Fuſsſteige.*

Floret Majo.

593

593 CAREX *axillaris* ſpiculis ovatis ſeſſilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus.
Germ. —
Habitat in udis ſylvaticis rariſſima.

594 CAREX *flava* ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recurvis.
Germ. *gelbes Riedgras.*
Habitat in paludibus infrequens.
Sund. *hinter Bauer-Parow, am Ende der Trift, im Moor.*
Floret Majo, Junio.

595 CAREX *filiformis* ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis, inferiore foliolo proprio breviore. †
Germ. *dünnes Riedgras.*
Habitat in nemoribus. [Gryphiæ *bey Hohenmühlen.*]

596 CAREX *limoſa* ſpicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente.
Germ. *Sumpf-Riedgras.*
Habitat in paludibus limoſis ſylvaticis. v. gr. Sund. *am Abshæger Holz beym Heller.*

597 CAREX *panicea* ſpicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis.
Germ. *Hirſe-Riedgras.*
Habitat in udis turfoſis paſſim.
Sund. *hinter Bauer-Parow, am Ende der Trift im Moor.* Jasm. in litoribus *der Stubbeniz* locis humentibus frequens.
Floret Junio.

598 Carex *Pſeudo-Cyperus* ſpicis pendulis, pedunculis geminatis.

Germ.

Habitat in foſſis aquoſis.

Sund. *zwiſchen dem Knieper Glacis und der Salpeterſiederey, in dem Graben wo ehedem das Retrenchement geweſen* frequens.

Floret Majo, Junio.

599 Carex *cæſpitoſa*, ſpicis erectis cylindricis tribus ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro.

Germ. *Raaſen-Riedgras.*

Habitat in paludibus, ubi cæſpites virides conſtituit, frequens. v. gr. Sund. *zur Rechten des Weges nach Voigthagen*, *zwiſchen dem Stubbenbrook und dem Lüdershæger Ellerholz, in einem Sumpf* copioſe & alibi.

Floret Aprili, Majo.

600 Carex *acuta* ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis.

Germ. *ſpitziges Riedgras.*

A) *nigra*, minor.

Habitat in campis ſterilibus, pratisque ſiccis. v. gr. Sund. *in der Martensdorfer Heide* & alibi.

Floret Aprili.

B) *ruffa*, major.

Habitat in aquoſis, foſſis, ad ripas rivulorum & piſcinarum frequens. v. gr. Sundiæ *vor der Vogelſangſchen Brücke zur Rechten, zwiſchen die Anhœhen auf der ſumpfigten Stelle*

im

im Graben, item *am Vogelſangſchen Graben* & alibi.

Floret Majo & ſerius.

601 CAREX *veſicaria* ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis.

Germ. *blaſigtes Riedgras*.

Habitat in aquoſis, ad foſſas frequens. v. gr. Sund. *Am Vogelſangſchen Graben* copioſe.

Floret Majo. Junio.

602 CAREX *hirta* ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis.

Germ. *rauhes Riedgras*.

Habitat in glareoſis, ad aquas paſſim. v. gr. Sund. *Vor dem Knieper Thor an dem Graben, wo ehedem das Retrenchement geweſen.*

Floret Majo, et ſerius.

TETRANDRIA.

603 BETULA *alba* foliis ovatis acuminatis ſerratis.

Germ. *Birke*. Pharmac. *Betula*.

Habitat paſſim in ſylvis. v. gr. Sund. *Im Elmenhorſter und Absbæger Holz.*

In Iſthmi Jaſmundiam cum Rugia conjungentis *ſchmale Heide* dicti, collibus arenoſis ſicciſſimis mira hujus ſpeciei arbuſcularum provenit multitudo, unde forſan aliquando non mediocris ſylva oriunda, ſi illis ab injuria brutorum, pabulum quærentium, caveatur.

Floret Majo.

604 BETULA *Alnus* pedunculis ramoſis.
Germ. *Aerle*, *Eller*.
Habitat iu ſylvis locis humidis frequens. v. gr. Sund. *In der Andershœſſchen Koppel*, item *im Lûdershæger Ellerholz &c.*
Floret Majo.

605 URTICA *urens* foliis oppoſitis ovalibus.
Germ. *Eiterneſſel.*
Habitat in cultis, ruderatis ubique.
Floret Majo, Junio, Julio.

606 URTICA *dioica* foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis.
Germ. *Brenneſſel*, *Waldneſſel.* Pharmac. *Urtica major.*
Habitat in ruderatis, ad ſepes ubique.
Floret Junio & ſerius.

PENTANDRIA.

607 XANTHIUM *ſtrumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis.
Germ. *Bettlerlæuſe.* Pharm. *Xanthium.*
Habitat in ruderatis ſterquiliniis. v. gr. Sund. *Am Strande bey der Reiſerbahn.*
Floret Julio.

POLYANDRIA.

608 MYRIOPHYLLUM *ſpicatum* floribus maſculis interrupte ſpicatis.
Germ.

Habi-

Habitat in lacubus, foſſis & aquis quietis. v. gr. Sund. *Im Knieper Teich* copioſiſſime.
Floret Junio, Iulio.

609 SAGITTARIA *ſagittifolia* foliis ſagittatis acutis.
Germ. *Pfeilkraut.*
Habitat ad ripas fluviorum, lacuum, limoſas rarior.
[Gryph. Ad ripas fluvii Ricci.] Pom. Ad viam publicam, qua itur Sundia ad urbem *Tribſees*, proxime ante pagum *Drechow*, a dextra in lacu molendinario. Circa Sundiam non viſa.

610 QUERCUS *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus: angulis obtuſis.
Germ. *Eiche.* Pharmac. *Quercus.*
Habitat in ſylvis.
Floret Majo, Junio.

611 FAGUS *ſylvatica* foliis ovatis obſolete ſerratis.
Germ. *Buche, May-Buche.* Pharm. *Fagus.*
Habitat in ſylvis, ſylvas vaſtas conſtituens. v. g. Sund. *Bey Abshagen.*
Floret Majo.

612 CARPINUS *Betulus* ſquamis ſtrobilorum planis.
Germ. *Hagebüche.*
Habitat in fagetis aliisque ſylvis, nemoribusque locis depreſſis humidis.
Floret Majo.

613 Corylus *Avellana* ſtipulis ovatis obtuſis.
Germ. *Haſelſtaude.* Pharmac. *Corylus.*
Habitat in ſylvis & ſepibus.
Floret Januario, Februario, Martio.

MONADELPHIA.

614 Pinus *ſylveſtris* foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris.
Germ. *Fichte.* Pharmac. *Pinus.*
Habitat in ſylvis paſſim locis elevatis ſiccis. Sylvas ipſa conſtituit in campis ſteriliſſimis glareoſis. v. gr. Gryph. *Zu Hanshagen.* Sund. *zwiſchen Seemühl und Moyſahl.* item, *bey Engelswacht &c.*
Floret Julio.

915 Pinus *Abies* foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis.
Germ. *Tanne.* Pharmac. *Abies.*
Habitat cum præcedente infrequens.

SYNGENESIA.

616 Bryonia *alba* foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris.
Germ. *Zaun-Rübe, Gicht-Rûbe.* Pharmac. *Bryonia.*
Habitat ad ſepes ſuburbiorum, & pagos paſſim.
Floret Julio.

CLASSIS

CLASSIS XXII.
DIOECIA.

DIANDRIA.

617 SALIX *triandra* foliis ſerratis glabris, floribus triandris.
Germ. *Elbweide.*
Habitat ad pagos rariſſima. Copioſe plantata Sundiæ *hinter die Hecken zwiſchen dem* Kûter *und Tribſeer Thor*, allata prædio *Engelswacht*, num ibi ſpontanea?
Floret Vere.

618 SALIX *pentandra* foliis ſerratis glabris, floſculis pentandris.
Germ.
Habitat in humidiuſculis, paludoſis paſſim.
Sund. *Im Moor zwiſchen Neegaſs und Seemühlen zur Rechten* frequens, *& vor dem Tannenholz zwiſchen Seemühlen und Moyſahl.*
Floret Julio.
Staminibus 4 ad 6 variat.

619 SALIX *vitellina* foliis ſerratis ovatis acutis glabris: ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. †
Germ. *Zæhweiden.*
Habitat ad pagos & domos, forte allata.

620 SALIX *amygdalina* foliis ſerratis glabris lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus.
Germ. *Elbweiden.*

Habitat in nemoribus ſolo humidiuſculo infrequens.

Sund. *Im Vogelſangſchen Buſch.*

621 SALIX *fragilis* foliis ſerratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glanduloſis.

Germ. *Sprokweide.*

Habitat in ſylvis rarior, ad pagos & domos paſſim. Floret Majo.

622 SALIX *purpurea* foliis ſerratis glabris lanceolatis: inferioribus oppoſitis. †

Germ. *rothe Sprokweide.*

Habitat ad pagos & foſſas plantata.

623 SALIX *arenaria* foliis integris ovatis acutis: ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis.

Germ.

Habitat in paludoſis frequens, & ad ripas lacuum.

Sund. *Am Voigthæger Teich an der Seite nach Zitterhagen.* item, *zur Rechten des Weges nach Voigthagen, zwiſchen dem Stubbenbrook und dem Lûdershæger Ellerholz.*

Floret Aprili.

624 SALIX *incubacea* foliis integerrimis lanceolatis: ſubtus villoſis nitidis, ſtipulis ovatis acutis.

Germ. *Bruchweiden.*

Habitat in uliginoſis & ad foſſas paſſim. v. gr. Sund. *Am Franken Retrenchements Graben.*

Floret Majo,

625 SALIX *roſmarinifolia* foliis integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis.

Germ.

Habi-

Habitat in foſſis aquoſis paludum turfoſarum paſſim frequens.

Sund. *Im Voigthæger Prieſter Moor* copioſe. item, *beym Wege der vor Brandshagen zur Linken nach Niederhoff abgeht, nahe vor lezterem, zur Rechten, auf der ſumpfigten Wieſe.*

Floret Majo.

626 SALIX *capræa* foliis ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, undatis ſuperne denticulatis.

Germ. *Palmweide.*

Habitat in ſylvis, nemoribus, ſiccis infrequens: Sund. *Im Abshæger Holz.*

Floret Aprili.

627 SALIX *viminalis* foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis.

Germ. *Korbweiden, Aehmtsweiden.*

Habitat ad pagos, forte allata.

Floret Aprili.

628 SALIX *cinerea* foliis ſubſerratis oblongo-ovatis: ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis.

Germ.

Habitat in paludoſis ſubhumidis & ad piſcinas. v. gr. Sund. *An einem kleinen Teich in der Voigthæger Prieſter Koppel.*

629 SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis.

Germ. *weiſſe Weiden, Silberweiden, Zæhweiden.*

Habitat ad pagos & domos.
Floret Aprili, Majo.
Addo Salicem *quæ me quidem judice*

630 Salix *polyandra* foliis ſerratis glabris, floſculis polyandris, *dicenda.*

Germ.

Habitat in paludoſis, turfoſis.

Gryph. *Auf dem Galgenkamp*, ubi primum reperta a Rev. Dno. Paſt. Wilke. vid. Ej. Floram Gryphicam poſt Num. 520. Sund. *Im Voigthæger Moor im Haaſen Winkel* cop.

Floret Junio.

Obſ. Frutex *humilis vix 6 pedum altitudinem excedens; Ramis purpuraſcentibus, tenacibus.* Gemma *univalvis, ſquama decidua, obovata, margine piloſa, ſubcolorata.* Folia *petiolata, alterna, ovato-lanceolata, acuminata, acute ſerrata, ſerraturis glanduloſis ſuccum luteum exſudantibus; Petiolis ſæpius dentato-glanduloſis.* Stipulæ *nullæ, ſed earum loco glandula puncti inſtar prominens.* Amenta *foliacea, pedunculis calycibusque pubeſcentibus.* Flores *polyandri* (*Staminibus 8 ad 10*) *hinc juli flaviſſimi, denſiſſimi.*

Affinis S. *pentandræ*, vix diſtinguenda, niſi *numero ſtaminum, gemmæ ſquama univalvi, petiolis ſæpius dentato-glanduloſis.*

A S. *fragili* differt *foliis magis ovatis, ſerraturis glanduloſis, approximatis, ramis purpuraſcentibus. tenacibus, numero ſtaminum,* & toto habitu.

TETRANDRIA.

631 VISCUM *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. †
Germ. *Miſtel.* Pharmac. *Viſcum.*
Habitat in ſylvis paraſitica in truncis arborum rarius. [Gryph. In ſylva Eldenaenſi.]

632 HIPPOPHAE *Rhamnoides* foliis lanceolatis.
Germ. Noſtr. Jaſm. *Seedorn.*
Habitat in Jaſmundenſis ſylvæ, *Stubbeniz*, litoribus copioſiſſime. v. gr. *zwiſchen Saſſeniz und dem Hengſt.* item, *bey Stubbenkammer; zwiſchen Stubben-Kammer und Stubber-Ort.* item, *auf dem Ufer bey Lohm.* Rug. *An den Ufern der Granitz.*
Floret Majo.

PENTANDRIA.

633 CANNABIS *ſativa.*
Germ. *Hanf.* Pharmac. *Cannabis.*
Habitat in ruderatis ſuburbiorum, & ad pagos,
Floret Junio.

634 HUMULUS *Lupulus.*
Germ. *Wilder Hopfen.* Pharm. *Lupulus.*
Habitat in nemoribus & ſepibus paſſim. v. gr. Sund. *Im Haynholzſchen Buſch.* item, *beym Wege nach Andershoff in der Hœlle.*
Floret Auguſto.

OCTANDRIA.

635 POPULUS *alba* foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis.
Germ. *Weiſſe Pappeln.* Noſtr. *Abelen.*
Habitat in ſylvis & ad domus paſſim.
Floret Aprili

636 POPULUS *tremula* foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris.
Germ. *Eſpen.* Noſtr. *Faul-Eſchen.*
Habitat in ſylvis paſſim, v. gr. *In der Voigthæger Prieſter Koppel.*
Floret Aprili.

637 POPULUS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis ſerratis.
Germ. *Schwarze Pappeln.* Pharm. *Populus.*
Habitat ad pagos, in ſylvis rarior. v. gr. Sund. *In der Voigthæger Prieſter Koppel.*

ENNEANDRIA.

638 MERCURIALIS *perennis* caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris.
Germ.
Habitat in nemoribus, ad margines ſylvarum, locis ſubumbroſis, paſſim copioſe.
[Gryph. *Bey Eldena.*] Sund. *An der Voigthæger Prieſter Trift zur Rechten* frequens. item, *zu Kortsmühl unter den Büſchen am Mühlengraben, und im Holze beym Mühlen-Teich* copioſiſſima.
Floret Majo,

639 MERCURIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis.
Germ. *Bingelkraut.* Pharmac. *Mercurialis.*
Habitat in cultis, ruderatis, infrequens; rariſſima in ſylveſtribus.
Floret Auguſto.

640 HYDROCHARIS *Morſus Ranæ.*
Germ. *Frœſch-Biſs.*
Habitat foſſis limoſis aquoſis, & lacubus verſus ripas, ubique. v. gr. Sund. *Im Graben an der Allee nach Papenhagen* & alibi.
Floret Julio, Auguſto.

MONADELPHIA.

641 JUNIPERUS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus.
Germ. *Wachholderſtrauch.* Noſtr. *Knirk, Ehmkenſtruuk.* Pharm. *Juniperus.*
Habitat in campis & ſylvis ſterilibus ericetoſis ubique.
Floret Aprili, Majo.

642 TAXUS *baccata* foliis approximatis.
Germ. *Taxbaum, Eibenholz.* Noſtr. *Ibenholt.*
Habitat in Jaſmundenſis ſylvæ, *Stubbeniz,* litoribus paſſim frequens. v. gr. *Beym Steige vom Kœnigſtuhl herunter,* item, *beym Mœnchen Steige. Nos.* Pom. *Auf dem Dars* copioſe, ex relatione aliorum.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

643 Holcus *lanatus* glumis bifloris villoſis: hermaphrodito mutico, maſculo ariſta recurva.

Germ. *wollichtes Darr-Graſs.* Schreb.

Habitat in paſcuis et nemoroſis, ſolo utplurimum arenoſo. v. gr. Sund. *im Haynholzſchen Buſch* et alibi.

644 Valantia *Cruciata* floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. †

Germ. *Gülden-Waldmeiſter*, *Creutzkraut*, *gelb Creutzkraut*, *rauch Meyerkraut.*

Habitat in dumetis rarior. [Gryph. *bey klein Zaſtrow.*]

645 Parietaria *officinalis* foliis lanceolato-ovatis alternis.

Germ. *Glaſs-Kraut*, Pharmac. *Parietaria.*

Habitat in ruderatis ad muros.

[Gryph. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden* copioſe.] Sund. *an der Stadtmauer bey der Catharinen Baſtion;* item *am Knieper hohen Wall, an der Mauer, wenn man über dem Thor gehet, wo die Pforte iſt.*

Floret Julio, Auguſto.

646 Atriplex *laciniata* caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis ſubtus argenteis.

Germ.

Germ.
Habitat in litoribus maritimis.
Sund. *Auf dem Ufer beym Kruge zur Alten-Fehr* copioſiſſima.
Floret Auguſto.

647 ATRIPLEX *haſtata* caule herbaceo: valvulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis.
Germ.
Habitat paſſim in cultis ruderatis.

648 ATRIPLEX *patula* caule herbaceo patulo, foliis ſubdeltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis.
Germ. *wilde Melte.*
Habitat in ruderatis, cultis, frequens, v. gr. Sund. *hinter die Hekken zwiſchen dem Küter und Tribſeer Thor* copioſe.
Floret Julio.

649 ATRIPLEX *litoralis* caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis.
Germ.
Habitat in litoribus marinis. v. gr. [Gryph. *bey Wampen.*] Sund. *vor dem Knieper Thor,* item *vor dem Franken Thor wo der Graben vom Andershœſſchen See in den Strand læuft.* copioſiſſime.
Floret Julio.

650 ACER *Pſeudo-Platanus* foliis inaequaliter ſerratis, floribus racemoſis.
Germ.
Habitat in ſylvis rarius, ad pagos paſſim.
Sund. *in der Voigthæger Prieſter Koppel.*
Floret Junio.

651 ACER *Platanoides* foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymboſis.
Germ. Noſtr. *Lœhn.*
Habitat in ſylvis paſſim; frequentius in litoribus ſylvae Jasmundenſis, *Stubbenitz*, v. gr. *bey Stubbenkammer.*
Floret Majo.

652 ACER *campeſtre* foliis lobatis obtuſis emarginatis.
Germ. *Ahorn.*
Habitat in dumetis infrequens.
Sund. *am Voigthæger See an der Seite nach Zitterhagen, wo das Ufer am hœchſten iſt.*
Flores nondum vidi.

DIOECIA.

653 FRAXINUS *excelſior* foliolis ſerratis, floribus apetalis.
Germ. *Eſche.* Pharmac. *Fraxinus.*
Habitat in ſylvis et ad pagos et domus. v. gr. Sund. *in der Voigthæger Prieſter Koppel*, et alibi.
Floret Majo.

*** *** ***
*** ***
***

CLASSIS

CLASSIS XXIV.
CRYPTOGAMIA.

FILICES.

654 EQUISETUM *ſylvaticum* caule ſpicato, frondibus compoſitis.

Germ. *Duwok.*

Habitat in ſylvaticis, agris. v. gr. Sund. *beym Barthſchen Wege zur Rechten im Vogelſangſchen Buſch, und auf den benachbarten Ackkern.*

655 EQUISETUM *arvenſe* ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo.

Germ.

Habitat in pratis, arvis, agris, frequens.

656 EQUISETUM *paluſtre* caule angulato, frondibus ſimplicibus.

Germ.

Habitat locis paludoſis, foſſis aquoſis et limoſis.

(B) polyſtachion *frondibus ſimpliciſſimis longiſſimis, caulem altitudine ſuperantibus, ſpiciferis.* Semel lectum ante aliquot annos Sund. circa *Grünehuſe.*

657 EQUISETUM *fluviatile* caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus.

Germ.

Habitat ad ripas rivulorum, lacuum, v. gr. Sund. *vor dem Knieper Thor bey dem Brunnen* copioſe.

658

658 EQUISETUM *limoſum* caule ſubnudo laevi.
Germ.
Habitat in profundis aquoſis paludoſis v g. Sund. *am Knieper Teich an der Inſul vor der erſten Knieper Bleiche.*

659 EQUISETUM *hyemale* caule nudo ſcabro, baſi ſubramoſo.
Germ. *Schafruſs, Schafthalm, Schaftheu.*
Habitat in uliginoſis, ſylvaticis paſſim.

660 OPHIOGLOSSUM *vulgatum* fronde ovata.
Germ. *Schlangen-Zunge, Nattern-Zunge.*
Habitat in ſubumbroſis rarius.
Sund. *im Vogelſangſchen Buſch an der Seite gegen Jungfernhoff zu* locis minus umbroſis copioſe. Junio.

661 OSMUNDA *Lunaria* ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria.
Germ. *Mondkraut, Mondraute.*
Habitat in montoſis, collibus, apricis ſiccis, præſertim Jasmundiæ.
[Gryph. *am Wege nach klein Zaſtrow, nahe vor ſelbigem, gleich wenn man über den Bach geht,*] *zur Linken.* Sund. *am Barthſchen Wege, nahe vor der Vogelſangſchen Brücke, zur Rechten auf einer von den kleinen Anhœben* copioſiſſime, item *im Haynholzſchen Buſch* locis apricis. Pom. *unten am Ufer der See, zwiſchen Zarrentin und Barhœft.* Jasm. in litoribus montoſis *der Stubbeniz.* v. gr. *auf Tripp-Ort* copioſe, item *auf der äuſſerſten Ecke des Kœnigſtuhls* frequens.
Viget Junio, rarius Julio.

662 OSMUNDA *regalis* frondibus bipinnatis apice racemiferis.

Germ. Noſtr. *Johannis-Fahr.*

Habitat in paludoſis, montoſis rarior.

[Gryph. *in Hanshagen*] Sund. *diſſeits des Devinſchen Orts, am Anfange deſſelben, nahe beym Devinſchen See, an einem kleinen Sumpf* copioſe. Rug. *am Wege von Tribberaz nach Ahlbek im Tannenholze* copioſiſſima.

Floret Julio, Auguſto.

663 ACROSTICHUM *ſeptentrionale* frondibus nudis linearibus laciniatis. †

Germ.

Habitat in rimis murorum locis ruderatis umbroſis rariſſimum.

664 PTERIS *aquilina* frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis; ſuperioribus minoribus.

Germ. Noſtr. *Fahr.*

Habitat in ſylvis ſiccis, frequens. v. gr. Sund. *im Holze vor Brandshagen*, item *auf dem Devinſchen Ort* & alibi.

665 ASPLENIUM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis.

Germ. *Wieder-Tod*, *güldener Wiederthon.* Rupp. Jen.

Habitat in rimis murorum locis ſubumbroſis rariſſimum. Copioſe Sundiæ, *an der Stadtmauer um dem Elmenhorſter Kirchhof, an der Nordweſtlichen Seite.*

666 ASPLENIUM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Germ.

Germ. *Mauer-Raute.* Pharm. *Ruta muraria.*

Habitat in rimis murorum antiquorum infrequens. Sund. *an der Stadtmauer.*

667 POLYPODIUM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata.

Germ. *Engelſüſs, wild Süſsholz.* Pharm. *Polypodium.*

Habitat ad lapides, locis ſubumbroſis haud infrequens.

[Gryph. *bey Hanshagen.*] Sund. inter ſaxa quæ conſtituunt murum, coemeterium *Elmenhorſtenſe* cingentem, adeo ut nusquam alibi copioſe, item *am Strande nach Devin, unter den Büſchen.*

Maximum, pinnis interdum apice bifidis. Sundiæ *in der Heide zwiſchen Seemühl, Moyſahl und Steinhagen, unter den Büſchen.*

668 POLYPODIUM *Phegopteris* frondibus ſubbipinnatis: foliolis infimis reflexis: paribus pinnula quadrangulari coadunatis. †

Germ.

Habitat in Fagetis paſſim.

669 POLYPODIUM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo.

Germ. *Farrenkraut.* Pharm. *Filix.*

Habitat in ſylvis frequens. v. gr. Sund. *in der Andershœfſchen und Voigthæger Prieſter-Koppel.*

670 POLYPODIUM *Filix femina* frondibus bipinnatis:

pinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis.

Germ.

Habitat cum præcedente, ſed rarius.

671 POLYPODIUM *fragile* frondibus bipinnatis: foliolis remotis: pinnis ſubrotundis inciſis.

Habitat in aridis lapidoſis paſſim. v. gr. Sund. *an der Steinmauer am Wege von Hof-Parow nach Bauer-Parow, zur Rechten*, item *an der Elmenhorſter Kirchhofs-Mauer* copioſe.

672 POLYPODIUM *Dryopteris* frondibus ſupradecompoſitis: foliis ternis bipinnatis.

Habitat in nemoroſis & ſylvaticis rarius. Jasm. *in der Stubbeniz rechter Hand vor dem Nipmerowſchen Baum.*

673 ISOETES *lacuſtris*.

Habitat Sundiæ *am Fuſsſteige von Voigthagen nach Zarrendorf, hinter der Brücke, zur Rechten*, in glareoſis nudis, hyberno tempore inundatis, copioſiſſime.

M U S C I.

674 LYCOPODIUM *clavatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis.

Germ. *Bærlap, Wolfsklauen, Gürtelkraut, &c.* Rupp. Jen. Pharm. *Muſcus clavatus, Lycopodium.*

Habitat in ericetis, nec non in ſylvis. v. gr. Sund. *auf der Heide zwiſchen Seemühlen, Moyſahl und dem Steinhæger Holz* frequens. item

item *auf der Heide zwiſchen Voigthagen und Zarrendorf.* Rug. *auf den Bergen zwiſchen Tribberaz und Ahlbek. Nos.* item *auf der Paziger Heide, an der Seite nach Bergen* copioſiſſime. *M. Willich.*

Spicis ſæpius ternis, *an der Graniz gegen Sellien* copioſe.

Floret Julio.

675 Lycopodium *Selago* foliis ſparſis octifariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis.

Germ. Pharm. *Muſcus erectus.*

Habitat in ſaxis muſcoſis ſylvæ Jasmundenſis, *Stubbeniz,* locis umbroſiſſimis rariſſime.

Floret Julio.

676 Lycopodium *annotinum* foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis; ſpicis terminalibus glabris erectis.

Habitat in ſylvis, locis ſubumbroſis rarius.

Sund. *zur Rechten des Weges vom Arndſeeſchen Kruge nach Benkenhagen, im Holze, nahe bey den Fichten.* Jasm. *in der Stubbeniz;* v. gr. *wenn man von Saſſeniz nach Ranzow gehet, neben dem Wege von Werder nach Hagen, gegen lezterem,* item *zur Rechten vor dem Nipmerowſchen Baum.*

Floret Junio, Julio.

677 Sphagnum *paluſtre* ramis deflexis.

Habitat in paludibus frequens. v. gr. Sund. *im Voigthæger Prieſter-Moor* & alibi.

678 Splachnum *ampullaceum* umbraculo ampullaceo obconico.

Habitat

Habitat in paludibus cæſpitoſis, ſtercore conſpurcatis. Sund. *im Moor, zur Rechten des Weges zwiſchen Neegaſs und Seemühlen, neben die Aecker gegen Seemûhlen zu.*

679 POLYTRICHUM *commune* caule ſimplici.

A) *majus.*

Habitat in uliginoſis. Sund. *im Lüdershæger Ellerholz*; item *zwiſchen dem Wege von Voigthagen nach Devin und dem Voigthæger Prieſter-Moor, im Kaalholz.*

B) *medium.* Pharm. *Adianthum aureum.*

Habitat in paſcuis & campis ſterilibus frequens. Sund. *in der Heide zwiſchen Seemûhlen, Moyſahl und dem Steinhæger Holze* copioſe, item *auf der Franken Weide*, item *zwiſchen dem Haynholzſchen Buſch und der Vogelſtange*, & alibi.

C) *minus* ſ. piloſum. †

Habitat in arenoſis, ſiccis ſteriliſſimis. Hoc (C) a me non lectum.

680 MNIUM *pellucidum* caule ſimplici, foliis ovatis.

Habitat in ſucculentis umbroſis. [Gryph. *am Stadtgraben unter den Weiden.*] Sund. *im Absbæger Holz* & alibi.

Obſ. *Pedunculus* Antheram *ferens, ex tuberculo, in diſtincta planta; Calyptra ſubæqualis. Pedunculus cum* Capitulo pulverulento, *in alio individuo.* Stella *denique* feminea, *centro purpurea, etiam in individuo diſtincto.* Num ideo fructificatio triplex?

681 MNIUM *hygrometricum* acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. †
Habitat in apricis, umbroſis, ſterilibus, vel paulo fertilioribus. [Gryph. *hinter der Stadtmauer beym Rickfluſs.*]

682 MNIUM *ſerpyllifolium* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis.
A) *proliferum* foliis roſaceo-congeſtis lanceolatis acutis. †
Habitat in muſcoſis.
B) *undulatum* foliis oblongis undulatis.
Habitat in pratis humidis, aliisque locis muſcoſis ubique. v. gr. Sund. *in der Andershæfſchen Koppel* & alibi.

683 MNIUM *Jungermannia* foliis diſtichis, pinnis ſubtus auriculatis. †
Habitat in ſubhumidis. [Gryph *am Rick.*]

684 BRYUM *apocarpum* antheris ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima.
Habitat in arboribus ubique, nec non in ſaxis.

685 BRYUM *ſtriatum* antheris ſubſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumve piloſis.
A) *majus.* Habitat in arboribus, truncis. †
B) *minus.* Habitat in ſaxis & arboribus freq.
C) *piloſum* ſ. *criſpum.* Habitat in ſylvis, in truncis arborum. v. gr. Sund. *im Abshager Holz.*

686 BRYUM *pomiforme* antheris erectis ſphæricis. †
Habitat ad aggeres ſylvarum truncosve locis ſucculentis. [Gryph. *im Eldenaer Holz.*]

687 BRYUM *pyriforme* antheris erectis obovatis,

calyptra

calyptra ſubulata, ſurculis acaulibus, foliis ovatis muticis.

Habitat in pratis, & ad foſſarum aggeres, in humidis, nemoroſis. v. gr. Sund. *an dem Graben vor dem Lüdershæger Ellerholz, wenn man von Voigthagen dahin geht*, copioſe.

688 BRYUM *extinctorium* anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus.

Habitat in arenoſis, rarius. Sund. *am Franken Retrenchement zwiſchen der Wache und dem Strande.*

689 BRYUM *rurale* antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis.

Habitat in muris, tectis ſtramineis, frequens.

690 BRYUM *murale* antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus cæſpitoſis.

Habitat in ſaxis, muris, tectis tegulis, aggeribus ubique. v. gr. Sund. *an den Stadtwællen.*

Floret cum præcedentibus Vere.

691 BRYUM *ſcoparium* antheris erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato.

Habitat in ericetis, & ſylvis ad arborum putridarum truncos v. gr. Sund. *im Abshæger Kronholz* copioſe. Rug. *in der Heide zwiſchen Bergen und der Jasmundiſchen Fehr.*

Floret Majo, Junio.

Peduucnlus ex tuberculo, ſed involucratus.

692 BRYUM *undulatum* antheris erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis.

Habitat in ſylvis v. gr. Sund. *in der Andersbœſſchen Koppel beym Scheide-Graben*, zwiſchen *dieſer und der Voigthæger Prieſter-Koppel.*
Floret Autumno.

693 Bryum *truncatulum* antheris erectis ſubrotundis: operculo mucronato.
Habitat ad agrorum foſſas & ſepes rarius.
Floret æſtate exeunte.

694 Bryum *viridulum* antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis.
Habitat ad latera foſſarum, inque aggeribus v. gr. Sund. *am Graben der am Ende der Andershœſſchen Koppel die erhabene Gegend*, wo *das Luſthaus geweſen, einſchlieſt* copioſe.
Floret Auguſto, Septembri.

695 Bryum *Hypnoides* antheris erectis, caule erectiuſculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. †
Habitat in ſylvis, ſaxis, ſabuloſis rarius. [Gryphiæ *bey Hanshagen im Kirchenholz.*]

696 Bryum *pulvinatum* antheris ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis.
Habitat in ſaxis frequens.
Floret Vere.

697 Bryum *cæſpiticium* antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis.
Habitat in glareoſis, muris, tectis, frequens.

698 Bryum *capillare* antheris pendulis, foliis

ovatis

ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis.

Habitat in glareoſis, ſiccis, & cum præcedente. v. gr. Sund. *am Fuſsſteige von Voigthagen nach Zarrendorf, vor der Brücke zur Rechten;* nec non ad paludes ſylvaticas. v. gr. Sund. *beym Anfange des Lüdershæger Holzes.*

Floret æſtate cum præcedente.

699 HYPNUM *taxifolium* fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata baſi pedunculifera.

Habitat in umbroſis rarius. Sund. *zur Rechten des Weges nach Voigthagen* in nemore *Stubbenbrook* dicto.

Floret primo Vere.

700 HYPNUM *complanatum* fronde pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis.

Habitat ad radices arborum infrequens. [Gryphiæ *hinter der Stadtmauer gegen Norden.*] Jasm. *am Wege von Crampaz nach Saſſeniz, nahe vor der Waſſermühle.* Sundiæ nondum viſum.

701 HYPNUM *triquetrum* ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis.

Habitat in ſylvis rarius. Rug. *im Holze bey klein Kubbelkow.*

702 HYPNUM *rutabulum* ramis vagis ſubrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis.†

Habitat in ſepibus, umbroſis, ad arborum truncos antiquos.

703 HYPNUM *filicinum* ſurculis pennatis: ramulis

mulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis ſecundis.

Habitat in humidiuſculis, præſertim in litoribus argilloſis ad fonticulos, haud infrequ.

704 HYPNUM *proliferum* ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis, ſylvis. [Gryph. *bey Hinrichshagen am Waldgraben.*] Sund. *in der Andershœſſchen Koppel* v. gr. *am Scheidegraben zwiſchen dieſer und der Voigthæger Prieſter-Koppel*, item *im Abshæger Kronholz* locis umbroſiſſimis copioſiſſimum.

705 HYPNUM *parietinum* ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis & ſylvis ſiccis frequens.

706 HYPNUM *cupreſſiforme* ſurculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. †

Habitat ad truncos & radices arborum locis ſucculentis. [Gryph. *hinter der Mauer.*]

707 HYPNUM *ſquarroſum* ramis vagis, foliis ovatis apice ſubulatis, undique reflexis. †

Habitat in umbroſis, ſubhumidis. [Gryph. *hinter der Mauer.*]

708 HYPNUM *curtipendulum* ſurculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis. †

Habitat ad truncos & radices arborum locis ſucculentis. [Gryph. *hinter der Mauer.*]

709 HYPNUM *purum* ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus.

Habitat in paſcuis, ſylvis. [Gryph. inter hor-

tos

tos ad ſepes.] Sund. *in der Andershœſſchen Koppel.*

710 HYPNUM *illecebrum* ſurculis ramisque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis.

Habitat in paſcuis, nec non in ſaxis, locisque ſubumbroſis.

711 HYPNUM *cuſpidatum* ſurculis vagis: apice foliis convolutis acuminatis.

Habitat in paludibus muſcoſis frequens. Sund. *beym Fuſsſteige von Voigthagen nach Zarrendorf, zur Rechten bey der Brücke,* item *wenn man zu Devin, an der Seite da die Sandberge ſind, længſt dem Mühlenteich gehet, am Anfange deſſelben, an ſumpfigten Stellen* copioſe.

712 HYPNUM *ſericeum* ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis.

Habitat ad truncos arborum, inque campis ubique.

713 HYPNUM *ſerpens* ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis.

Habitat ad caudices, ligna, ſaxa, & in terra.

ALGAE.

714 JUNGERMANNIA *aſplenioides* frondibus ſimpliciter pinnatis: foliolis ovatis ſubciliatis. †

Habitat ad radices ſalicum locis umbroſis.

715 JUNGERMANNIA *complanata* ſurculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus.

Habitat in umbroſis ad truncos arborum rarior; ſemel copioſe lecta in Jasmundia *am Wege von Crampaz nach Saſſeniz, nahe vor der Waſſermühle, zur Rechten.*

716 Jungermanna *dilatata* ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus.

Habitat in truncis arborum copioſa.

717 Jungermannia *tamariſci* foliis imbricatis ſerie duplici; ſuperioribus ſubrotundis convexis obtuſis quadruplo majoribus.

Habitat in corticibus arborum, præprimis lævioribus. v. gr. Fagi & Pruni *avium* freq.

Jungermanniæ florent hieme.

718 Marchantia *polymorpha* calyce communi decemfido.

Habitat ad ripas rivulorum umbroſas & fontes, nec non juxta aquas in paludoſis frequens. v. gr. Gryph. *an dem Bache zu Hanshagen.* Sund. *beym Fuſsſteige von Voigthagen nach Zarrendorf, zur Linken von der Brücke* copioſe. Jasm. *an der Trift vor Sagard nach der Obermühle, nahe vor Sagard zur Rechten am Graben* copioſe, item *in der Sagardſchen Prieſter-Koppel, am Bach beym Eller-Moor* & alibi.

Floret Junio, Julio.

719 Marchantia *hemiſphærica* calyce communi quinquefido hemiſphærico, perichætio nullo. †

Habitat in paſcuis humidis rarior. [Gryph. *bey Kæten.*

Kœtenhagen haud procul a ſcaturigine, item *im Torfmoor beym Pottkruge.* Menſe Julio.]

720 RICCIA *minima* frondibus glabris bipartitis acutis. †

Habitat in paſcuis arenoſis, ubi per hiemem aquæ ſtagnarunt.

721 LICHEN *ſcriptus* leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis characteriformibus.

Habitat in corticibus arborum lævioribus, præſertim in Fagis, paſſim.

722 LICHEN *geographicus* leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens.

Habitat rarius in ſaxis majoribus quarzoſis. v. gr. Sund. *auf dem Devinſchen Ort*, & *am Wege nach Neegaſs, zur Rechten, nahe vor der Stelle wo der Teich an den Weg ſtœſt.*

723 LICHEN *rugoſus* leproſus albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis.

Habitat in corticibus arborum.

724 LICHEN *ſanguinarius* leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris.

Habitat in arboribus frequens.

B) cinereo-vireſcens, lineis nigris anaſtomoſantibus diſtinctus, tuberculis atris.

Habitat in corticibus lævioribus arborum, præprimis ramorum Betulæ *Alni.*

Hujus num varietas?

LICHEN leproſus dilute fuſcus, tuberculis atris gibbis majuſculis carne nigris. *Nobis.*

Habitat in ſylvis in Fagis rarior.

725 LICHEN *fuſco-ater* leproſus fuſcus, tuberculis atris. †

Habitat in muris, lapidibus petris.

Num huc pertinet?

Lichen leproſus rufo-fuſcus, tuberculis atris minimis confertis carne nigris. *Nobis.*

Habitat in Fagis paſſim.

726 Lichen *Fagineus* leproſus albus, tuberculis albis farinaceis.

Habitat in Fagis frequens, nec non in aliis arboribus.

727 Lichen *Carpineus* leproſus candidus, tuberculis albidis rugoſis.

Habitat in truncis Carpini, nec non in Fagis.

728 Lichen *ericetorum* leproſus cinereus, tuberculis incarnatis.

Habitat in ericetis, ſteriliſſimis, glareoſis, in terra nuda, nec non in ſylvis paludoſis Sphagno paluſtri innaſcens v. gr. [Gryph. *im Grubenhæger Moor.*] Sund. *in der Heide zwiſchen Voigthagen und Zarrendorf* frequentiſſimus.

Tubercula ſubgloboſa, brevi pedunculo inſidentia.

729 Lichen *candelarius* cruſtaceus flavus, ſcutellis luteis.

Habitat in parietibus, muris antiquis frequens; & in aggeribus terrenis in terra nuda. v. gr. Sund. *am Franken Retrenchement.*

730 Lichen *palleſcens* cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis.

Habitat in corticibus arborum.

731 Lichen *ſubfuſcus* cruſtaceus albicans, ſcutellis ſubfuſcis: margine cinereo ſubcrenato.

Habitat in arboribus frequens, nec non in muris.

732 LICHEN *centrifugus* imbricatus, foliolis multifidis obſolete lævibus albidis centrifugis, ſcutellis rufo fuſcis.

Habitat in ſaxis majoribus paſſim frequens.

733 LICHEN *ſaxatilis* imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis folio concoloribus.

Habitat in ſaxis paſſim. v. gr. Sund. *Auf dem Devinſchen Ort*, & *am Kirchhofe zu Guſtow.* item *in der Heide zwiſchen Seemühlen und Moyſahl* frequens & alibi.

734 LICHEN *olivaceus* imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis.

Habitat in arboribus frequens, nec non in lapidibus.

735 LICHEN *parietinus* imbricatus, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis.

Habitat in parietibus, lignis, arboribus, ubique.

736 LICHEN *phyſodes* imbricatus: laciniis obtuſis ſubinflatis.

Habitat in arboribus frequens.

Apices foliorum primo vere ſubtus virides farinacei, dein inflati ſubtus fuſci.

737 LICHEN *ſtellaris* imbricatus: foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis.

Habitat in ramis arborum ubique.

Scutella nigra, farina alba primum adſperſa, ut primo intuitu albida videantur, margine cinereo.

738 LICHEN *ciliaris* foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis.

Habi-

Habitat in arboribus ubique.

739 LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus; ſubtus tomentoſus.

Germ. *Baum-Lungenkraut.* Noſtr. *Lunggraff.* Pharm. *Pulmonaria arborea.*

Habitat in ſylvis umbroſis, ſuper arbores antiquas, præſertim in Fagis & Quercubus. v.gr. [Gryph. *Im Eldenaer Holz.*] Sund. *Im Steinhæger Holz.* item, *im Abshæger Holz.*

740 LICHEN *furfuraceus* foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis: ſubtus lacunoſis atris.

Habitat rarius in corticibus arborum præſertim Pini *ſylveſtris.*

741 LICHEN *farinaceus* foliaceus erectus compreſſus ramoſus farinaceus: lateribus verrucoſis.

Habitat in arboribus antiquis, præprimis Quercubus.

742 LICHEN *calicaris* foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus.

Habitat in arboribus antiquis folioſis.

743 LICHEN *fraxineus* foliaceus erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber, ſcutellis ſubpedunculatis.

Habitat in arboribus, inprimis Quercubus & Fraxinis.

744 LICHEN *prunaſtri* foliaceus erectiuſculus lacunoſus: ſubtus tomentoſus albus.

Habitat in arboribus, copioſiſſimus in Pruno *ſpinoſa.*

745 LICHEN *juniperinus* foliaceus laciniatus criſpus fulvus, peltis lividis.
Habitat in Juniperis, aliisque arboribus.

746 LICHEN *glaucus* foliaceus depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo.
Habitat in arboribus fere ubique, nec non in ſaxis.

747 LICHEN *aphtoſus* foliaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. †
Pharmac. *Muſcus cumatilis.*
Habitat in ſylvis ſterilibus muſcoſis ſub juniperis.

748 LICHEN *caninus* foliaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente.
Pharmac. *Muſcus caninus.*
Habitat in ſylvis ad radices arborum, & juxta lapides in terra frequens, & in ericetis. v. g. Sund. *In der Heide zwiſchen Seemühlen und Moyſahl.*

749 LICHEN *cocciferus* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis.
Pharmac. *Muſcus pyxidatus.*
Habitat in ericetis, ſylvis ſterilibus frequens. Copioſiſſimus in Rugia *auf dem Ralſewykſchen Dünen bey Ahlbek.*

750 LICHEN *pyxidatus* ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis.
Habitat in ſterilibus, arenoſis, frequens in terra nuda, nec non in truncis putridis arborum;

rum; interdum quoque legi Polytricho *communi* innatum.

751 LICHEN *fimbriatus* ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico.

Habitat in ſylvis ſterilibus, arenoſis, ericetis, frequens. v. gr. Sund. *In der Heide zwiſchen Seemühlen und Moyſahl* copioſe.

752 LICHEN *gracilis* ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis. †

Habitat in ſterilibus, petroſis, muris antiquis.

753 LICHEN *cornutus* ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris.

Habitat in ericetis & in lignis, truncisque arborum putridis paſſim.

754 LICHEN *deformis* ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. †

Habitat in ſylvis, muris anitquis umbroſis.

755 LICHEN *rangiferinus* fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. B) *ſylvaticus.*

Habitat in ſterilibus, ericetis ubique. v. gr. Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* copioſe.

756 LICHEN *ſubulatus* fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. †

Habitat in ſylvis.

757 LICHEN *plicatus* filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. †

Pharmac. *Muſcus arboreus.*

Habitat in denſis ſylvis.

758 LICHEN *barbatus* filamentoſus pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. †

Habi-

Habitat in Fagis, aliiſque arboribus aceroſis antiquis.

759 LICHEN *jubatus* filamentoſus pendulus: axillis compreſſis.

Habitat in arboribus aceroſis. v. gr. Sund. *An den Fichten im Holze zur Rechten des Weges von Arndſee nach Benkenhagen.*

Rami implexi, non articulati; Tubercula farinacea lateralia.

760 LICHEN *chalybeiformis* filamentoſus ſubramoſus decumbens implicato-flexuoſus.

Habitat ſupra truncos arborum & ſepimenta rarior.

761 LICHEN *hirtus* filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis.

Habitat ubique in arboribus frequentiſſimus.

762 CHARA *vulgaris* caulibus lævibus, frondibus interne dentatis.

Habitat in aquis pigris. v. gr. [Gryph. *Vor dem Fetten Thor auf der Weide.*] Sund. *In den alten Torfgruben im Voigthæger Prieſter Moor.*

763 CHARA *hiſpida* aculeis caulinis capillaribus confertis.

Habitat in Mari verſus litora arenoſa, frequens. v. gr. Sund. *Im Strande vor dem Knieper Thor* copioſe & alibi.

764 TREMELLA *juniperina* ſeſſilis membranacea auriformis fulva.

Habitat in juniperis primo Vere.

765 TREMELLA *Noſtoc* plicata undulata. †

Habitat in pratis rarius.

766 TREMELLA *Auricula* ſeſſilis membranacea auriformis cinerea.

Germ. *Fliederſchwamm.* Pharm. *Fungus ſambucinus. Auricula Iudæ.*

Habitat ad arbores putridas, & in ſepibus putridis. Vere.

Colore rubro variat, licet rarius.

767 TREMELLA *hemiſphærica* hemiſphærica ſparſa.

Habitat in lapidibus ſubmarinis verſus litora copioſa. v. gr. Sund. *Auf den Steinen im Strande vor dem Knieper Thor.*

768 TREMELLA *purpurea* ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra.

Habitat in arborum ramis moribundis, & ſepibus ligniſque putridis, tempore pluvioſo, præſertim Vere.

769 FUCUS *ſerratus* fronde plana dichotoma ſerrata ad apices tuberculata. †

Habitat in Mari Balthico. In litoribus maris paſſim rejecta reperitur.

770 FUCUS *veſiculoſus* fronde dichotoma integra, caule medium folium transcurrente, veſiculis verrucoſis terminalibus.

Habitat in lapidibus ſubmarinis Maris Balthici, verſus litora frequentiſſimus.

771 FUCUS *faſtigiatus* dichotomus ramoſiſſimus teres uniformis faſtigiatus.

Habitat in Mari Balthico. Ad litora paſſim rejicitur.

772 FUCUS *Filum* filiformis ſimplex ſubfragilis opacus.

Habi-

Habitat cum præcedente.

773 Ulva *inteſtinalis* tubuloſa ſimplex.
Habitat in lapillis ſubmarinis Maris Balthici frequens.

774 Ulva *compreſſa* tubuloſa ramoſa compreſſa. †
Habitat in Mari Balthico.

775 Ulva *latiſſima* oblonga plana undulata membranacea viridis.
Habitat in Mari Balthico, ad litora paſſim rejecta occurrit.

776 Ulva *Linza* fronde oblonga bullata.
Habitat in Mari Balthico verſus litora ad lapides haud infrequens.

777 Ulva *granulata* ſphærica aggregata. †
Habitat ad ripas paludum.

778 Conferva *bulloſa* filamentis æqualibus ramoſis, bullas aëreas includens.
Habitat in aquis pigris & ſtagnantibus frequens.

779 Conferva *litoralis* filamentis æqualibus ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis.
Habitat in Mari Balthico verſus litora arenoſa, & in lapidibus ſubmarinis frequens.
Colore fuſco & viridi variat.

780 Conferva *gelatinoſa* filis ramoſis moniliformibus: articulis globoſis gelatinoſis.
Habitat in fontibus limpidiſſimis, & rivulis. Sund. *Am Wege von Voigthagen nach Wendorf zur Rechten bey der Brücke, im Graben der aus dem Lüdershæger Ellerholz in den Voigthæger Teich geht* copioſe.

781 Byssus *Flos aquæ* filamentis plumoſis natantibus.

Habitat in aquis prima æſtate.

782 Byssus *phoſphorea* lanuginoſa violacea lignis adnaſcens.

Habitat in lignis vetuſtis & putridis.

783 Byssus *velutina* filamentoſa viridis.

Habitat in terra ſubumbroſa ſubhumida.

784 Byssus *ſaxatilis* pulverulenta cinerea rupes operiens. †

Habitat in ſaxis.

785 Byssus *candelaris* pulverulenta flava lignis adnaſcens.

Habitat in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis, nec non in ſaxis & muris.

786 Byssus *botryoides* pulverulenta viridis.

Habitat in terra diutius humida, ad radices murorum umbroſas, humidas, v. gr. in cellis concameratis & alibi frequens.

Initio læte vireſcit, dein ſaturate viridis evadit. Tandem ætate hic color mutatur in atrum.

787 Byssus *lactea* pulverulento-cruſtacea albiſſima.

Habitat in corticibus arborum, præſertim Salicis *albæ.*

FUNGI.

788 Agaricus *Cantharellus* ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus.

Habitat in ſylvis & pratis ſylvaticis. v. gr. [Gryph. *Zu Hanshagen.*] Sund. *Im Holze vor Brandshagen* & alibi. Occurrit Julio Auguſto.

789 AGARICUS *integer* ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus.

Habitat in ſylvis, ſiccis rarior. Sund. *Im Tannenholz zwiſchen Seemûhl und Moyſahl.* Auguſto.

Pileus *ſanguineus*. Lamellæ *niveæ*.

790 AGARICUS *muſcarius* ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite volvato: apice dilatato, baſi ovato.

Habitat in pratis & ſylvis rarior. Sund. *Im Tannenholz zwiſchen Seemühl und Moyſahl.* Septembri, Octobri.

Pileus *ſanguineus*, *verrucis albis maculatus*. Lamellæ *albæ*.

791 AGARICUS *dentatus* ſtipitatus, pileo convexo, lamellis baſi mucrone dentatis.

Habitat in ſylvis paſſim. v. gr. Sund. cum præcedente, & *im Holze vor Brandshagen.* Exeunte Æſtate & Autumno.

792 AGARICUS *delicioſus* ſtipitatus, pileo teſtaceo: ſucco luteſcente.

Germ. *Reiſchen.*

Habitat in ſterilibus, montoſis, arenoſis, frequens. [Gryph. Hanshagæ & *zu Klein Zaſtrow.*] Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* cop. item, *auf dem Kœpfenberge* & alibi. Reperitur Auguſto & ſerius.

793 AGARICUS *piperatus* ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. †

Germ. *Pfifferling.*

Habitat in ſylvis. [Gryph. Inter *Eldena* & *Diedrichshagen.*]

794 AGARICUS *campeſtris* ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis ruffis.

Germ. *Champignon.*

Habitat in pratis, campis, paſcuis, paſſim frequens. [Gryph. *Auf der Straſſe in Neuen-Kirchen.*] Sund. *Auf dem Devinſchen Ort* copioſe & alibi. Auguſto.

795 AGARICUS *violaceus* ſtipitatus, pileo rimoſo: margine violaceo tomentoſo, ſtipite cœruleſcente lana ferruginea.

Habitat ad margines ſylvarum rarior. Sund. *Im Tannenholz zwiſchen Seemühl und Moyſahl.* Autumno.

796 AGARICUS *cinnamomeus* ſtipitatus, pileo ſordide flavo, lamellis luteo-ruffis.

Habitat in ſylvis rarior. Sund. *Am Ende der Trift die von dem Wege, von Hoff-Parow nach Bauer-Parow zur linken abgeht, beym Moor, bey den hohen Ellern.* item, *im Holze vor Brandshagen.* Julio, Auguſto, Septembri.

797 AGARICUS *equeſtris* ſtipitatus, pileo pallido: diſco ſtellatim luteo, lamellis ſulphureis.

Habitat in paſcuis, ſylvis paſſim. Sund. *Im Holze vor Brandshagen.* Septembri.

798 AGARICUS *campanulatus* ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo.

Habitat in pratis, ſylvis. v. gr. Sund. cum præcedente, nec non ad ambulacra, & ligna putrida, præprimis Autumno.

799 AGARICUS *Quercinus* acaulis, lamellis labyrinthiformibus.
Germ. *Eichenſchwamm.*
Habitat in ſylvis, in truncis quercinis frequens. v. gr. Sund. *Im Elmenhorſter Holze.*

800 AGARICUS *Betulinus* acaulis coriaceus villoſus: margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus.
Germ. *Baumſchwamm.*
Habitat in Betulis aliisque arboribus paſſim. v. gr. Sund. *Im Abshæger Holz, & in der Andershœſſchen Koppel.*

801 BOLETUS *ſuberoſus* acaulis pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus.
Habitat in ſylvis in truncis arborum præſertim Betulæ rarior. Sund. *Im Abshæger Holz beym Heller*

802 BOLETUS *fomentarius* acaulis pulvinatus inæqualis obtuſus, poris teretibus æqualibus glaucis.
Germ. *Feuerſchwamm.*
Habitat in Betulis aliisque arboribus frequens.

803 BOLETUS *verſicolor* acaulis: faſciis dicoloribus, poris albis.
Habitat ad truncos arborum antiquarum frequens. v. gr. Sund. *In der Voigthæger Prieſter Koppel,* copioſe, nec non in ligneis parietibus & aſſeribus prope terram.

804 BOLETUS *ſuaveolens* acaulis, ſuperne lævis, ſalicinus.
Germ. *Weidenſchwamm.*
Habitat paſſim in Salice *alba.*

805 Boletus *luteus* ſtipitatus pileo pulvinato ſubviſcido, poris rotundatis flaviſſimis, ſtipite albido.

Habitat in ſylvis. Sund. *im Tannenholz zwiſchen Seemühl und Moyſahl*, item *auf dem Devinſchen Ort.* Auguſto.

806 Boletus *bovinus* ſtipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compoſitis acutis: porulis angulatis brevioribus. †

Habitat in pratis & ſylvis menſe Auguſto.

807 Boletus *ſubtomentoſus* ſtipitatus, pileo flavo ſubtomentoſo, poris ſubangulatis difformibus fulvis planis, ſtipite flavo.

Habitat in ſylvis, præſertim Pinetis rarior. Sundiæ *im Tannenholz zwiſchen Seemühl und Moyſahl*, item *im Holze, zur Rechten des Weges von Arndſee nach Benkenhagen, um die Fichten.* Auguſto.

808 Boletus *ſubſquamoſus* ſtipitatus, pileo albido, poris difformibus oblongo-flexuoſis niveis.

Habitat in ſylvis ſtipitatus, & ad truncos arborum ſubſeſſilis ſubdimidiatus ſtipite breviſſimo. Sund. *zwiſchen Elmenhorſt und Abshagen, zur Rechten im Mittelbuſch*, item *in der Voigthæger Prieſter-Koppel, neben der Scheide zwiſchen dieſer und der Andershæfſchen Koppel.* Semel quoque lectus *vor Garbodenhagen.*

Primo initio eſt ſubſtantia gelatinoſa, inſtar Tremellæ.

Hujus forſan varietas eſt fungus cujus ſequitur deſtriptio.

Fungus

Fungus *acaulis, ſuborbicularis (diametro fere ulnam æquante) ſupra ſeſſilis, ſubcoriaceus, ſubſquamoſus, albidus, margine obtuſo niveo: ſubtus poroſus fulvus.* Pori *maxime inæquales, oblongo-flexuoſi; in centro fungi altiores, anguſtiores & ſoluti: verſus marginem fungi evaneſcentes, latiores & connexi.* Stipes *nullus cum pilei ſuperior pars ejus vices ſuſtineat.* Odor *B. ſvaveolentis.*

Habitat in cellarum concameratarum, aëris liberiore acceſſu privatarum, cameris rariſſim.

809 PHALLUS *eſculentus* pileo ovato celluloſo nudo rugoſo. †

Germ. *Murchel.*

Habitat in ſylvis antiquis. [Gryph. *zu Grubenhagen*]

810 HELVELLA *Mitra* pileo deflexo adnato lobato difformi. †

Germ. *Steinmurchel.*

Habitat in truncis putridis, locisque ſucculentis umbroſis ſylvarum.

811 PEZIZA *lentifera* campanulata lentifera. †

Habitat in ſepibus & areis hortorum.

812 PEZIZA *punctata* turbinata truncata, diſco punctato. †

Habitat ſupra equorum ſtercorea. Vere tantum reperitur.

813 PEZIZA *ſcutellata* plana: margine convexo piloſo.

Habitat in parietibus ligneis putridis, & ſalicibus vetuſtate excavatis putridis. v. g. [Gryph. *vor den Thoren zwiſchen die Gærten.*] Sund.

in alten Weiden auf dem Wall rarior. Vere & Autumno poſt tempeſtates pluvioſas.

814 PEZIZA *cochleata* turbinata cochleata.

Habitat in ſubumbroſis paſſim frequens major, in apricis arenoſis rarior & minor. Lecta Sund. *am hohen Graben bey der hohen Brûcke, zur Linken, jenſeits des Grabens* copioſe, item *im Scheidegraben zwiſchen der Andershœſſchen und Voigthæger Prieſter-Koppel.* Aprili. Item *bey Devin auf den Sandbergen, diſſeits des Mühlenteiches.* Septemb. In iisdem locis eam poſtea fruſtra quæſivi.

815 ? CLAVARIA *digitata* ramoſa lignea nigra.

? Agaricus digitatus, niger, humilior, & inſtar corii canis carchariæ tuberculis exaſperatus, quæ ſingula totidem ovata indicant nigerrimi pulveris receptacula. *Rupp. jen. Edit. Francof. p. m. 306. Haller jen. p. 384.*

? Lichenagaricus terreſtris, digitatus, niger, apicibus albo-ruffis, ſeminibus griſeis undique conſperſis, radice membranacea longiſſima, varie divaricata, & implexa. *Michel. vide Haller. jen. l. cit.*

Habitat rarior ad ligna putrida prope terram Autumno.

Radix *atra, compreſſa, ramoſa; ſingulo ramo inſidet* Fungus *ſubclavatus obtuſus, vel ovatus acutus, teres vel ſubcompreſſus, circiter unciam longitudine, quartam ejusdem vel dimidiam partem craſſitie æquans:* Superficie *inæquali, ſcabra, nigra; in qua apparent puncta minima, aterrima, nitida, quæ,*

quæ, ſi cultro Botanico ſubjiciantur, ſunt globuli pulvere nigro vel liquore nigro pleni, fere magnitudine ſeminis ſinapis, ultra dimidiam partem intra ſuperficiem Fungi abſconditi. Fungus *hic, ſi longitudinaliter diſſecetur, conſtat ex fibris, primum quaſi ad axem longitudinalem adſcendentibus purpuraſcentibus, dein arcu ad ſuperficiem flexis albis.*

816 Clavaria *Hypoxylon* ramoſo-cornuta compreſſa.

Habitat ad ligna putrida & ad radices ſalicum rarior. Autumno & Hyeme.

Fungus *baſi ſubramoſus pilis atris quaſi velutinus, media parte cinereus, verſus apicem integer vel ramoſo-cornutus, apicibus glabris ex luteo albis obtuſiuſculis, extus pulverulentis.*

817 ? Clavaria *faſtigiata* ramis confertis ramoſiſſimis faſtigiatis obtuſis luteis.

Habitat in arboribus putridis rariſſima. Semel lecta in Rugia prope *klein Kubbelkow* in Salice putrida cum Peziza *ſcutellata*, initio Autumni.

Baſis coriacea ſubtus glabra, ſupra obſita: Tubulis teretibus, confertis, dichotomo-ramoſis, obtuſis, faſtigiatis, ex membrana tenuiſſima pellucida conſtantibus, pulvere ſubtiliſſimo fuſco repletis, qui, ſi vel minima vi comprimantur, apice aperiuntur, pulveremque emittunt: Sub primo initio ſunt ſubſtantia gelatinoſa, lutea, ut alii Fungi.

Fungi *hi* (815, 816, 817.) *ſunt* perpendiculares, ſuperficie unica, *quapropter* Clavariis Linneanis *ſunt aſſociandi. Sed quia Primus*

(815) *ſolidus, in ſuperficie globulos (qui mihi fructificationes eſſe videntur) fert; Secundus* (816) *plerumque ſolidus, fructificationes conſpicuas vix oſtendit, niſi pulverem ſubtiliſſim. apices tegentem fructificationem dicas; Tertius* (817) *tubuloſus, pulvere repletus eſt; me quidem judice ſub eodem genere militare non poſſunt, & propterea ſunt ſeparandi. Cum vero leviuſcula mea cognitio, & parva librorum ſuppellex, mihi non ſufficiant, qui juſta certaque iis imponam nomina, ea, quæ reperire potui, nomina, iis quodammodo competentia, recenſere, & quæ in ſpeciminibus lectis obſervare licuit, adjungere viſum eſt. Determinent Botanici peritiores.*

818 LYCOPERDON *Boviſta* ſubrotundum: lacerato-dehiſcens.

Germ. *Boſiſt.* Pharm. *Crepitus Lupi.*

Habitat in campis ſterilibus ubique. v. gr. Sundiæ *auf dem Devinſchen Ort* copioſe.

819 LYCOPERDON *ſtellatum* volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. †

Habitat in collibus. [Gryphiæ in monticulo *Fuchsberg* dicto.]

820 LYCOPERDON *epidendrum* cortice farinaque purpurea.

Habitat in hortorum aſſeribus & parietibus antiquis, nec non arboribus.

821 LYCOPERDON *epiphyllum* aggregatum paraſiticum: ore multifido lacero: pulvere fulvo.

Habitat in dorſo foliorum Tuſſilaginis *Farfaræ.*

ra. v. gr. [Gryph. *im Eldenaer Holz.*] Sund. *am Ufer des Devinſchen Sees* & alibi.

822 Lycoperdon *ſepium* ſeſſile ſubgloboſum, cortice duplici, farina atra compacta. *Nobis.*

?Lichenoides tuberculoſum compreſſum nigrum, lignis putridis adnaſcens. *Dill. muſc. Tab. 18. Fig. 7.*

?Lichenagaricus diſciformis punctatus nigricans. *Haller. Jen. p. 385.*

Habitat in ſepibus putreſcentibus paſſim freq.

Obſ. *Fungus ſubgloboſus ſ. lenticularis, parvus, vix ultra piſi magnitudinem excedens, ſeſſilis, naſcitur vernali tempore.* Cortex exterior *fulvus, tener, ſubfriabilis, brevi tempore dehiſcit in partes irregulares.* Cortex interior *craſſior, durior, ſubſtantia quaſi cornea, ſuperficie inæquali rugoſa ſ. tuberculoſa, fuſco-nigricans, perſiſtit per aliquot menſes, interdum ad annuum tempus, & alius ſpeciei fungum mentitur, ſimilem Figuræ Dillenii citatæ.* Farina *atra, a centro verſus peripheriam compactior.*

823 Mucor *Mucedo* ſtipitatus, capſula globoſa.

Germ. *Schimmel.*

Habitat in putridis.

824 Mucor *Eryſiphe* albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus.

Germ. *Honigthau.*

Habitat in plantis variis v. gr. Aſperugine, Lithoſpermo, cet.

825 Mucor *ſepticus* unctuoſus flavus.

Habitat in terra prægnante & ad parietes ligneos.

APPEN-

APPENDIX.

OMISSA.

826 GALIUM *ſylvaticum* foliis octonis lævibus ſubtus ſcabris: floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule lævi.
Germ.
Habitat in ſylvoſis, collium & litorum vepretis paſſim. v. gr. Sund. *auf dem Ufer zwiſchen Alte-Fehr und Grahl.*
Floret Junio.

827 ANETHUM *graveolens* fructibus compreſſis.
Germ. *Dill*, *Till.* Pharm. *Anethum.*
Habitat in cultis, ruderatis paſſim.
Floret Junio, Julio.

828 SCHEUCHZERIA *paluſtris.*
Germ.
Habitat in paludoſis rarior. Sund. *im Moor, zur Rechten des Weges von Neegaſs nach Seemühlen* ubi eam cum fructu legi Junio.

829 VACCINIUM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis.
Germ. *Preuſſelbeeren.* Rupp. Jen. Svecis Lingon. Pharm. *Vitis idæa.*
Habitat in ſylvis. Pom. *auf dem Dars.* v. gr. *zwiſchen Born und Ahrenshoff* copioſiſſime, item *im Sûlzer Moor.*

830 RUBUS *Chamæmorus* foliis ſimpliciter lobatis, caule inermi unifloro.

Germ. Svecis *Hiortron.* Pharmac. *Chamæmorus.*

Habitat in nemoribus paludoſis. Pom. *auf dem Darſ* ubique.

Hanc plantam & præcedentem legit, earumque loca natalia benevolus communicavit Illuſtriſſ. & Excellentiſſ. Dn. Comes *von* LIEWEN, S. Maj. Reg. & Regni Svec. Senator, & per Pom. atque Rug. Gubernat. General. &c. &c.

831 ERVUM *Lens* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis.

Germ. *Linſen.* Pharm. *Lens.*

Habitat nonnunquam inter ſegetes, præſertim Jasmundiæ. Floret Junio.

832 ZOSTERA *marina.*

Germ. Noſtr. *Dank.*

Habitat in fundo maris Balthici verſus litora ubique, copioſa ad litora rejicitur.

833 HYPNUM *velutinum* ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris ſubnutantibus.

Habitat ad radices arborum umbroſas.

834 ?JUNGERMANNIA *bidentata* frondibus ſimpliciter pinnatis apice floriferis, foliolis bidentatis.

Habitat in ſubumbroſis. Jasm. *am Graben der um die Prieſter-Koppel zu Sagard gezogen iſt* frequens. *M. Willich.*

Frondes *ramoſæ, ſimpliciter pinnatæ.* Foliola *pellucida ſubovata, apice bidentata, dentibus acuminatis patentibus.* Flores *non vidi.* 835

835. HYDNUM *paraſiticum* acaule arcuato-rugoſum tomentoſum.

Germ.

Habitat rarius in arboribus, Autumno & Hyeme.

Fungus *acaulis, initio gelatinoſus: deinde ſubcoriaceus, arcubus elevatis rugoſis flexuoſisque inæqualis;* ſupra *tomentoſus, violaceus marginibus pallidis:* ſubtus *fibris brevibus rectis rigidiuſculis primum albis dein ſubfuſcis obſitus.*

ADDENDA.

JUNCUS *articulatus* No. 229.

B) *viviparus* faſciculis foliorum, loco florum, prodeuntibus.

Gramen junceum, folio articulato, cum utriculis. *Scheuchz. gram.* 333.

Occurrit Autumno ad ripas lacuum, foſſarum, & in ericetis locis depreſſis humentibus.

I. INDEX.

GENERUM.

A

	No.
Acer	650
Achillea	554
Aconitum	345
Acorus	225
Acroſtichum	663
Actaea	336
Adoxa	261
Aegopodium	203
Aethuſa	195
Agaricus	788
Agrimonia	303
Agroſtemma	291
Agroſtis	46
Aira	51
Ajuga	370
Alchemilla	106
Aliſma	243
Allium	215
Alopecurus	42
Alſine	207
Alyſſum	418
Anagallis	134
Anchuſa	119
Andromeda	265
Anemone	348
Anethum	827
Angelica	189
Anthemis	551
Anthoxanthum	25
Anthyllis	457
Antirrhinum	405
Apium	202
Aquilegia	346
Arabis	430
Arbutus	266
Arctium	509
Arenaria	284
Arnica	544
Artemiſia	523

Arundo

	No.		No.
Arundo	78	Butomus	262
Aſclepias	162	Byſſus	781
Aſparagus	220		
Aſperugo	123	C.	
Aſperula	93		
Aſplenium	665	Calla	581
Aſter	537	Callitriche	3
Aſtragalus	473	Caltha	369
Athamanta	186	Campanula	137
Atriplex	646	Cannabis	633
Avena	76	Cardamine	420
		Carduus	512
B		Carex	588
		Carlina	518
Ballota	386	Carpinus	612
Bellis	545	Carum	200
Berberis	234	Centaurea	556
Betonica	383	Ceraſtium	295
Betula	603	Chaerophyllum	197
Bidens	519	Chara	762
Boletus	801	Chelidonium	337
Braſſica	433	Chenopodium	164
Briza	64	Chryſanthemum	546
Bromus	72	Chryſoſplenium	269
Bryonia	616	Cichorium	508
Bryum	684	Cicuta	194
Bunias	437		

	No.		No.
Cineraria	543	Daucus	183
Circaea	6	Delphinium	344
Clavaria	815	Dentaria	419
Clinopodium	389	Dianthus	275
Cnicus	517	Draba	410
Cochlearia	415	Droſera	212
Comarum	335	**E.**	
Conferva	778		
Conium	184	Echium	125
Convallaria	221	Elymus	84
Convolvulus	135	Epilobium	246
Conyza	531	Equiſetum	654
Cornus	105	Erica	253
Corylus	613	Erigeron	532
Crambe	438	Eriophorum	35
Crataegus	312	Ervum	469, 831
Crepis	504	Eryngium	179
Cucubalus	279	Eryſimum	426
Cuſcuta	107	Evonymus	154
Cynoſurus	66	Eupatorium	521
Cynogloſſum	120	Euphorbia	305
Cypripedium	580	Euphraſia	396
D.		**F.**	
Dactylis.	65	Fagus	611
Datura	148	Feſtuca	67

P Filago

	No.		No.
Filago	559	Hippophaë	632
Fragaria	327	Hippuris	2
Fraxinus	653	Holcus	643
Fucus	769	Holoſteum	87
Fumaria	451	Hordeum	85
G.		Hottonia	129
		Humulus	634
Galeopſis	380	Hydnum	835
Galium	94, 826	Hydrocharis	640
Geniſta	455	Hydrocotyle	180
Gentiana	176	Hyoscyamus	149
Geranium	439	Hyoſeris	505
Geum	333	Hypericum	484
Glaux	161	Hypnum	699, 833
Glecoma	376	Hypochaeris	506
Gnaphalium	527	I.	
Gratiola	19		
H.		Iaſione	562
		Iberis	417
Hedera	160	Ilex	108
Hedyſarum	472	Impatiens	567
Helvella	810	Inula	539
Heracleum	188	Iris	29
Herniaria	163	Iſoëtes	673
Heſperis	429	Iuncus	226
Hieracium	497	Iungerman.	714. 834

Iuniperus

	No.
Iuniperus	641

L.

Lactuca	492
Lamium	377
Lapſana	507
Laſerpitium	187
Lathraea	402
Lathyrus	461
Ledum	264
Lemna	582
Leontodon	494
Leonurus	388
Lepidium	411
Lichen	721
Liguſtrum	5
Linum	210
Lithoſpermum	117
Lolium	82
Lonicera	144
Lotus	482
Lychnis	292
Lycoperdon	818
Lycopodium	674
Lycopſis	124
Lycopus	24
Lyſimachia	130

	No.
Lythrum	302

M.

Malva	448
Marchantia	718
Marrubium	387
Matricaria	548
Medicago	483
Melampyrum	398
Melica	57
Mentha	374
Menyanther	128
Mercurialis	638
Meſpilus	315
Milium	45
Mnium	680
Monotropa	263
Mucor	823
Myagrum	408
Myoſotis	116
Myoſurus	214
Myriophyllum	608

N.

Nardus	37

	No.
Nepeta	373
Nymphaea	341

O.

Oenanthe	192
Ononis	456
Ophiogloſſum	660
Ophrys	575
Orchis	568
Origanum	390
Ornithogalum	218
Ornithopus	471
Orobus	458
Oſmunda	661
Oxalis	290

P.

Panicum	40
Papaver	338
Parietaria	645
Paris	260
Parnaſſia	208
Paſtinaca	199
Pedicularis	403
Peziza	811
Phalaris	38

	No.
Phallus	809
Phellandrium	193
Phleum	41
Phytevma	143
Picris	489
Pimpinella	201
Pinguicula	20
Pinus	614
Plantago	99
Poa	58
Polygala	453
Polygonum	255
Polypodium	667
Polytrichum	679
Populus	635
Potamogeton	109
Potentilla	328
Prenanthes	493
Primula	126
Prunella	394
Prunus	308
Pteris	664
Pulmonaria	121
Pyrola	267
Pyrus	316

	No.
Q.	
Quercus	610
R.	
Ranunculus	354
Raphanus	436
Reſeda	304
Rhamnus	152
Rhinanthus	395
Ribes	155
Riccia	720
Roſa	320
Rubus	323, 830
Rumex	235
S.	
Sagina	115
Sagittaria	609
Salicornia	1
Salix	617
Salſola	174
Sambucus	205
Sanguiſorba	104
Sanicula	181
Saponaria	274
Saxifraga	270
Scabioſa	88
Scandix	196
Scheuchzeria	828
Scirpus	30
Scleranthus	272
Scrophularia	407
Scutellaria	393
Sedum	288
Selinum	185
Sempervivum	307
Senecio	535
Serapias	578
Serratula	510
Sherardia	92
Silene	280
Sinapis	434
Siſymbrium	421
Sium	191
Solanum	150
Solidago	538
Sonchus	490
Sorbus	314
Sparganium	587
Spartium	454
Spergula	300
Sphagnum	677

	No.		No.
Spiraea	318	Tuſſilago	533
Splachnum	678	Typha	585
Stachys	384	**U.**	
Statice	209		
Stellaria	281	Ulmus	175
Stratiotes	347	Ulva	773
Symphytum	122	Urtica	605
		Utricularia	21
T.		**V.**	
Tanacetum	522		
Taxus	642	Vaccinium	250, 829
Teucrium	372	Valantia	644
Thalictrum	352	Valeriana	26
Thlaſpi	412	Verbaſcum	146
Thymus	391	Verbena	23
Tilia	343	Veronica	7
Tordylium	182	Viburnum	204
Tormentilla	332	Vicia	464
Tragopogon	488	Viola	563
Tremella	764	Viſcum	631
Trientalis	245	**X.**	
Trifolium	474		
Triglochin	241	Xanthium	607
Triticum	86	**Z.**	
Trollius	68		
Turritis	431	Zoſtera	832

** ** **
* * *

II. INDEX.

NOMINUM GERMANICORUM.

A.

Abelen 635
Abbiſs 88
-- *Teufels* 88
Adbars Nibben 344
Aehmts Weiden 627
Aeppel-Höltik 317
Aerle 604
Aeſchen, faul 636
Aggermennig 303
Aborn 652
Akkeley 345
Akker, Diſtel 490, 511
Mohn 338
Münze 375
Ruhrkraut 561
Senf 434
Stein Saamen 118
Strauſsgraſs 46
Treſp 73
Winde 135
Zwiebel 218
— *kleine* 217
Alandwurzel 539
Alfranken 144
Aloe-Waſſer 347
Andorn, ſchwarzer 386
-- *Waſſer* 24
-- *weiſſer* 387
Angelik 189
-- *wilde* 190
Apfelbaum, wilder 317
-- *Dorn* 148
-- *Stech* 148
Apoſtemkraut 89
Attich 205
Augentroſt 396
-- *brauner* 3 7
Auge-Ochſen 553
— *Rinds* 553

B.

Baarendreck 325
Bachbungen 9

	No.		No.
Diſtel, Milch	491	*Egelkraut*	133
-- *Sau*	511	*Ehmkenſtruuck*	641
-- *Sood*	518	*Ehrenpreis*	7
-- *Sumpf*	515	*Eibenholz*	642
-- *Weg*	513	*Eiche*	610
Doofradel	395	*Eichen Schwamm*	799
Dollkraut	149	*Einblat*	224
Dorn Apfel	148	*Beer*	260
-- *Hage*	313	*Eiſenhart*	23
-- *Schleen*	311	*Hütlein*	345
-- *See*	632	*Kraut*	23
-- *Wege*	152	*Eiterneſſel*	605
Doſten	390	*Elbweiden*	617, 620
-- *Wirbel*	389	*Eller*	604
-- *Waſſer*	521	*Elzbeer*	312
Dotterblume 369,	494	*Engelſüs*	667
		Entenflott	583
Drat Schmielen	54	*Enzian, Feld*	178
Dreſpel	72	-- *Herbſt*	176
Dreyblat	128	*Epheu*	160
-- *Waſſer*	128	*Eppich, Waſſer*	202
Dulbillerkraut	149	*Erdbeerkraut*	327
Dungras, Sumpf	35	*Erd Galle*	19
-- *Wieſen*	36	*Rauch*	452
Dürwurz	531	*Eſpen*	636
Duwok	654		
Dwelk	82	**F.**	
E.		*Fahr*	664
		-- *Iohannis*	662
Eberwurz gemein	518	*Fahren, Rein*	522

Fackel-

No.

Fackelkraut 146
Færber Pfriemen 455
Farrenkraut 669
Faſamenkraut 458
Faul Aeſchen 636
Baum 153, 303
Feder Nelken 278
Feigwarzen-kraut 357
Feld Enzian 178
Kümmel 391
Wermuth 523
Fette Henne 283
Fett Kraut 20
-- *Gras* 241
Feuer Schwamm 802
Fichte 614
Fladdergras, Strauſigtes 45
Flachs Seide 107
Fleeder, Goos 204
Fliederbaum 206
Schwamm 766
Flœhkraut 257
Flokblumen 558
Flockenkraut 558
Flugſandgras 84
Fœnich, Wieſen 41
Frauen Haar 107
Freyſamkraut 566

No.

Froſch Lœffel-kraut 243
Biſs 640
Frühjahrs Stern-blume 3
Fuchs Riedgras 592
Schwanz 42
-- *Knoten* 43
-- Wieſen 41
Fus, Hanen 362
-- *Kræhen* 362
-- *Lœwen* 106
-- *ſeiden Hahnen* 365
-- *Vogel* 471
-- *weiſſer Hahnen* 361
-- Waſſer *Hahnen* 360
-- *Ziegen* 203
Fünffingerkraut 331
-- klein 330
-- weis 329

G.

Gænſe Blümchen 545
-- *Pappeln* 448
-- *rich* 328
Garaffel 333

Gauch-

	No.
Gauchheil	134
-- Waſſer	10
Geisbart	319
Gelkkraut	419
Gerſte, Mauſe	85
Gichtbeer	157
Baum	157
Rübe	616
Glanz, Fœnichartiger	38
-- Rohrartiger	39
Glaskraut	645
Gliederkroetengras	224
Glœcklein	137
Glocken.Blumen	139
-- Zaun	136
Glœſen	455
Goldblumen	359
Neſſel	382
Ruthe	538
Goos Fleeder	204
Gottes Gnadenkraut	19
Gras, Buſchkrœten	227
-- Fett	2[illegible]1
-- Flugſand	84
-- gefiedertes Kamm	66
-- Glicderkrœten	229
Gras, hangendes Schœn	[illegible]7
-- haariges Krœter	232
-- Kr[illegible]ut	65
-- Knopfkrœten	226
-- kriechendes Krœten	231
-- Queck	86
-- Wieſenkrœten	233
-- Zitter	64
-- wollichtes Darr	643
-- Wege	258
Grindwurz	237
-- krauſe	235
-- Strand	236
-- Waſſer	238
Grundheil	134
Gukgu[illegible]sblumen	292
Kohl	290
Gülden Günſel	370
kriechender	371
Milzkraut	269
Wagmeiſter	633
Gundelreben	376
Gundermann	12
Gürtelkraut	674
Guter Heinrich	164

	No.
H.	
Haar-Frauen	107
Kraut	367
Strausgras	50
Haaſengeil	454
Kohl	290, 491
Pfötgen	478
Pœppeln	449
Poten	209
Riedgraſs	591
Habichtskraut	502
Hafer-Wieſen	77
-- *wilder*	76
Hagebuche	612
Dorn	313
Hahnenfuſs	362
-- *ſeiden*	365
-- *Waſſer*	360
-- *weiſſer*	367
Hahnenkam	395, 472
Kopf	472
Hanbutten-ſtræuche	321
Händleinkraut	17
Hanf	633
Harnkraut	163, 406
Hartkopf	557
Riegel	5
Haſelſtaude	613
Haubechel	456
Hauslauch	307

	No.
Hederich	436
Heidelbeeren	250
Heidenkraut	253, 254
Korn, wild	259
Nelken	277
Heinrich, guter	164
-- *ſtolzer*	164
Hecken Neſſel, taube	384
Helmkraut	393
Henne, fette	288
Herbſtdiſtel	516
Enzian	176
Sternblume	4
Herzgeſpann	388
Hexenkraut	6
Hindbeeren	323
læufte	508
Hindſchkraut	150
Hiortron	830
Hirſchholder	204
Hirſe Graſs, granichtes	40
Meer	117
Riedgraſs	597
-- *Stein*	117
Hirzwurz, weiſſe	187
Hohlbeeren	323
wurz	451
Hollunder	206
Holtik Aeppel	317

Höltik-

	No.
Höltik Beeren	316
Honigthau	824
Hopfen Klee	480, 483
-- wilder	634
Huder	376
Huflattich	533
Hülſen Buſch	108
Hundsblume	552
Peterſilie	195
Till	552
Violen	565
Zunge	120
Hühnerbiſs	207
Darm	207
Hüngerblümchen	410

I.

Iacobskraut	536
Ibenholt	642
Ie länger je lieber	150
Iohannisbeer	155
- *Blume*	546
Fahr	662
Kraut	273, 485

K.

Kalmuſs	225
K*alwerkrop*	197
-- kleiner	198
K*amellen*	550
-- *wilde*	551
K*ammgraſs*	
-- *geſiedertes*	66
K*attenkees*	448
K*atzenmünze*	373
Pfœtgen	528
Klee	478
Ke*rze, Kœnigs*	146
-- *Weg*	147
K*irſchen*	309
-- *Vœgel*	308, 310
Klapperroſen	340
K*lebkraut*	98
K*lebrich*	98
K*lee, Bieber*	128
-- *gelber Schoten*	482
-- *Hopfen*	480, 483
-- K*atzen*	478
-- *Sauer*	290
-- *Stein*	474
-- *Sumpf*	128
-- W*ieſen*	477
K*lewer, Berg*	479
-- *gelber*	484
-- *rother*	477
-- w*eiſſer*	476
K*letten Diſtel*	509
K*nabenkraut*	569
-- *breitblâtrigtes*	572

K*naben-*

	No.
Knabenkraut	
-- gefleckte s	573
Knaulgraſs	65
Knirk	641
Knoblauchskraut	428
Knœterich	300
Knopf krœten-graſs	226
Knoten Fuchs Schwanz	43
Knütgen	409
Kohl-Buch	500
Diſtel	517
-- Gukguks	290
-- Haaſen	290, 491
-- Rein	507
-- See	438
-- Strand	438
Kœnigskerze	146
Kornblume	556
Kœrwel, wilder	200
Korbweiden	627
Kræhenfuſs	362
Kramsbeeren	252
Kraut, Acker-ruhr	561
-- Apoſtem	89
-- Baumlungen	739
-- Benedicten	333
-- Bergruhr	560
-- Bilſen	149
Kraut, Bingel	639
-- Blut	104
-- Bocks	171
-- Bruch	153
-- Creuz	644
-- Doll	149
-- Dulbiller	149
-- Edel-Leber	348
-- Egel	133
-- Eiſen	23
-- Erdbeer	327
-- Fackel	146
-- Farren	669
-- Faſanen	458
-- Feigwarzen	357
-- Fett	20
-- fleckiges Lungen. A.	121
-- flieſſend Saam	109
-- Flœh	257
-- Flocken	558
-- Freyſam	566
-- Froſchlœffel	243
-- fünf Finger	331
-- gelb Creuz	644
-- Gelk	419
-- Glaſs	645
-- glatt Thurm	431
-- Gottes Gnaden	19

Kraut	No.
-- *gülden Milz*	269
-- *Gürtel*	674
-- *Haar*	367
-- *Habichts*	502
-- *Hændlein*	17
-- *Harn*	163, 406
-- *Heiden*	253, 254
-- *Helm*	293
-- *Hexen*	6
-- *Hindſch*	150
-- *Iacobs*	536
-- *Iohannis*	273 485
-- *klar Saam*	111
-- *Kleb*	98
-- *klein fünf Finger*	330
-- *klein Saam*	114
-- *Knaben*	569
-- *Knoblauchs*	428
-- *krauſs Saam*	112
-- *Lab*	96
-- *Laus*	403, 404
-- *Lein*	406
-- *Lœffel*	415
-- *Lungen B.*	121
-- *Meyen*	96
-- *Milch*	161, 306
-- *Mond*	661
-- *Mutter*	548
-- *Pfeil*	609
-- *Pfennig*	133
-- *Pferſing*	257

Kraut	No.
-- *rauch*	
Meyer	644
Thurm	432
-- *Ruhr*	559
-- *Ruprechts*	442
-- *Saam*	109
-- *Salz*	174
-- *Sau*	151
-- *Scharten*	510
-- *Schell*	337
-- *Schlag*	126
-- *Schwulſt*	535
-- *See Saam*	113
-- *Seiſen*	274
-- *ſiebenFinger*	335
-- *Sophien*	424
-- *Spring*	567
-- *St. Barben*	427
-- *Sternleber*	93
-- *St. Roberts*	442
-- *Tæſchel*	414
-- *Tauben*	23
-- *Tauſendgülden*	177
-- *Thurm*	431
-- *Wegruhr*	530
-- *weiſs fünf Finger*	324
-- *weiſsMeyen*	97
-- *Woll*	146
-- *Wuhl*	171

Kraut

Kraut	No		No.
-- *Wund*	457	*Lauch, Haus*	307
Kratzbeeren	325	-- *Sand*	216
Kreſſe, Born	421	*Laus* Kraut	403, 404
-- *Brunnen*	421	*Leberkraut, Stern*	93
-- *See*	587	-- *Edel*	348
-- *Stink*	411	Blumen, *weiſſe*	208
-- Wieſen	420	*Leindotter*	408, 409
-- Winter	427	Kraut	406
Krœtengraſs,		*Leopardenwurz*	358
-- Buſch	227	*Lingon*	829
-- *Glieder*	229	*Lilien Convallien*	221
-- *haariges*	232	*Linde*	343
-- Knopf	226	*Linſen*	831
-- kriechendes	231	-- Waſſer	583
-- Wieſen	233	*Loddik*	534
Krœten Till	552	*Lœffelkraut*	415
Kruut, Wrief	456	-- *Froſch*	243
Küchenſchellen	349	*Lœhn*	651
Küdik	433, 434, 435	*Lœwenfuſs*	106
Kuhblume	369	*Lülch, perenniren-der*	82
Kümmel, Feld	391	-- *Taumel*	83
-- Wieſen	200	*Lungenkraut* B.	121
		-- Baum	739
L.		-- *fleckigtes* A.	121
Labkraut	96	*Lunggraſ*	739
Læmmer Feld-lattig	28	*Lünich*	9
Lattich, Huf	533	*Luusbeeren*	322
Lattig, Læmmer Feld	28		

M.

	No.
Mangold, Wald	267
Manna	71
Schwingel	71
Mannes Treu	179
-- *gemein*	179
*Marien*Blümchen	545
Schu	580
Marlblümchen	545
Mater	548
Mauer Pfeffer	289
Raute	666
Mauſe Gerſte	85
Ohr	497
Schwanz	214
May Blumen	221
Büche	611
Meer Hirſe	117
Rettich	416
Meliloten	474
Melthe, gelbe	170
-- *grûne*	169
-- *rothe*	166
-- *ſtinkende*	171
-- *weiſſe*	168
-- *wilde*	648
Merzviolen	564
Meyenkraut	96
-- *rauch*	644
-- *weiſs*	97
Mihre	207

	No.
Milch Diſtel	491
Kraut	161, 306
-- Wolfs	305, 306
Milzkraut, gûlden	269
Miſtel	631
Mohn, Acker	338
-- wilder	339
Mond, Kraut	661
-- *Raute*	661
Mooſsbeeren	252
Mümmelken,	
-- *geele*	341
-- witte	342
Mundholz	5
Mûnze, Acker	375
-- Katzen	372
-- Waſſer	374
Murchel	809
-- *Stein*	810
Mutterkraut	548
Wurz	544
Mütz un Huuwe	345

N.

Nacht Schatten	151
Nægenknee	300
Nattern Zunge	660
Nelken, Feder	278
-- *Heide*	277

	No.
Nelken, Pech	293
Neſſel, blaue taube	380
-- *brenn*	606
-- *bunte taube*	381
-- *Eiter*	605
-- *gelbe taube*	382
-- *Gold*	382
-- *rothe taube*	378
-- *taube Hecken*	384
-- *weiſſe taube*	377
-- *Wald*	606
Neſt, Vogel	183, 575
Nüſsgen Sallat	28

O.

Ochſen Auge	553
Zunge	119
-- *blaue*	125
-- *rothe*	119
-- *wilde*	125
Odermenning	303
Oegſchen, blaage	348
-- *geele*	351
-- *witte*	350
Orant, kleiner	405
Organ	390

P.

	No.
Palmen, Stech	108
Palmweiden	626
Pappeln, Gænſe	418
-- *Roſen*	450
-- *Roſs*	449
-- *ſchwarze*	637
-- *weiſſe*	635
Parnaſsgraſs	208
Paſtinak, Waſſer	191
-- *wilde*	199
Pech Nelken	293
Peſtilenzwurz	534
Peterlein, Bocks	201
Peterſilie, Hunds	195
-- *wilde*	195
Pfaffenröhrlein	494
Pfeffer, Mauer	289
-- *Waſſer*	256
Pfeilkraut	609
Pfennigkraut	133
Pferſingkraut	257
Pfifferling	793
Pinnholz	153
Pœppeln, Haaſen	449
Pors	264
Poſt	264
Preuſſelbeeren	829
Puttegnaden	251

Q.

Quækgraſs	86
Quæcken	86

	No.
Quæckweitzen	86
Quendel	391
Quitſchenbaum	314

R.

Raaſen Binſen	31
Riedgraſs	599
Schmielen	53
Radel	291
-- *Doof*	395
-- *ſchwarzer taub*	398
Rapûnzel	28
Raubbeer	158
Raute, Mauer	666
-- *Mond*	661
-- *Wieſen*	353
Rein Blumen	527
Fahren	522
Holz	5
Kohl	507
Reiſchen	792
Rettich, Meer	416
Rhabarber, wilde	237
Riedgraſs, blaſigtes	601
-- *dünnes*	595
-- *Fuchs*	592
-- *gelbes*	594
-- *Haaſen*	591

	No.
Riedgraſs, Hirſe	597
-- kleines	588
-- *Raaſen*	599
-- *rauhes*	602
-- *Sand*	589
-- *ſpitziges*	600
-- *Sumpf*	590, 596
Rinds Auge	553
Ritterſporen	344
Rohr Schilf	78
Rocken Treſp	72
Roſen, Klapper	340
Pappeln	450
-- *Waſſer*	342
-- *wilde*	320, 321
Rœſslein, Weiderich	246
Roſs Pappeln	449
Rübe, Gicht	616
-- *Zaun*	616
Ruchgraſs	25
Ruhrkraut	559
-- *Acker*	561
-- *Berg*	560
-- *Weg*	530
Ruprechtskraut	442
Rüſter	175

S.

Saame, Acker Stein	118

Saame,

	No.
Saame, Stein	117
Saamkraut	109
-- *durchgewachſenes*	110
-- *flieſſend*	109
-- *klar*	111
-- *klein*	114
-- *krauſs*	112
-- *See*	113
Sallat, Nûſsgen	28
Salzkraut	174
Sand Blume	287
Lauch	216
Riedgraſs	589
Schilf	81
Sannikey	181
Sau Diſtel	511
-- Kraut	151
Sauerampfer,	
-- *kleiner*	240
-- *wilder*	239
Klee	290
Scabioſen	89
Schaafgarbe	555
Schwingel	67
Schaffruſs	659
Schafthalm	659
Heu	659
Schartenkraut	510
Schellkraut	337
Schierling	184

	No.
Schierling,	
-- *ächter*	194
-- *unächter*	193
-- *Waſſer*	194
Schilf, Berg	79
-- *Rohr*	78
-- *Sand*	81
Schimmel	823
Schlagkraut	126
Schlangenzunge	660
Schleendorn	311
Schlûſſelblume	125
Schmargeln	156
Schmarten	156
Schmielen, Berg	55
-- *blaue*	51
-- *Drat*	54
-- *graue*	56
-- *Raaſen*	53
-- *Waſſer*	52
Schminkwurz	124
Schmirgel	164
-- *kleiner*	170
Schœngraſs,	
-- *hangendes*	57
Schotenklee,	
-- *gelber*	482
Schuppenwurz	419
Schwalbenwurz	162
Schwamm, Baum	800
-- *Eichen*	799
-- *Feuer*	802

Schwamm, No.
-- *Flieder* 766
-- *Weiden* 804
Schwarzwurz 122, 336
Schwertel 29
-- *gelber* 29
Schwingel, *kriechender* 69
-- *Manna* 71
-- *rother* 68
-- *Schaaf* 67
-- *Wieſen* 70
Schwulſtkraut 535
Scordien 372
See Binſen 33
Blumen 341
-- *weiſſe* 342
Dorn 632
Kohl 438
Kreſſe 582
Saamkraut 113
Wegerich 102
Wermuth 524
Seide, *Flachs* 107
Seiden Hahnenfuſs 365
Seifenkraut 2[illegible]4
Sellerie, *wilder* 202
Senf, *Acker* 434
-- *Bauren* 412. 413
-- *Wege* 426
Senf, No.
-- *wilder* 435
Sieben Fingerkraut 335
Silberweiden 629
Sinau 106
Sommer Viehgraſs 61
Sonnen Thau 212, 213
Sooddiſtel 518
Sophien Kraut 424
Spargel, *wilder* 220
Speerberbaum 314
-- *wilder* 312
Spillbaum 154
Spindelbaum 154
Spricker 153
Springkraut 567
Sprokweiden 621
-- *rothe* 622
Stabwurz 526
Stachel 366
Beeren 159
Stauderich 172
St. Barben Kraut 427
Stech Apfel 148
Palmen 108
Steinbrech, *rother* 318
-- *Waſſer* 192
-- *weiſſer* 2[illegible]0
Stein Hirſe 117
Klee 4[illegible]4
Murchel 810

Stein

Stein No.
Saamen 117
-- *Acker* 118
Sternblume 283
-- *Frühjars* 3
-- *Herbſt* 4
-- Wald 281
-- Waſſer 537
Sternleberkraut 93
Stickelbeeren 159
Stiefmütterchen 566
Stinkkreſſe 411
Stolzer Heinrich 164
Storchſchnabel,
-- *gemeiner* 439
-- *runder* 446
-- Wald 440
-- *weicher* 443
-- Wieſen 441
Strand Grind-wurz 236
Kohl 438
Strauſsgraſs,
-- *Acker* 46
-- *braunes* 49
-- *Haar* 50
-- *Rohrartiges* 47
-- *rothes* 48
St. Robertskraut 442
Stroh, Wald 96
Sumpf Beeren 252
Binſen 30
Sumpf No
Diſtel 515
Dungraſs 35
Klee 128
Riedgraſs 590, 596
Violen 563
Süſsholz,
-- wild 473, 667

T.

Tag und Nacht 399
Tanne 615
Tæſchelkraut 414
Taubenkraut 23
Taub Radel,
-- *ſchwarzer* 398
Tauſendgülden-kraut 177
Taxbaum 642
Teich Binſen 32
Kolben 585
Teufels Abbiſs 88
Teutſch Bæren-klau 188
Thurmkraut 431
-- *glatt* 431
-- *rauch* 432
Till 827
-- *Hunds* 552
-- Krœten 552
Tormentillwur-zel 332

No.

Traube, Bæren 266
Trempſen 556
Treſp 72
-- *Acker* 73
-- *hoher* 75
-- *Rocken* 72

U.

Ulmbaum 175
Unſer Frauen Bettſtroh 96

V.

Vergiſs mein nicht 116
Viehgraſs, Berg 62
-- *dreyblütiges* 59
-- *fünf blütiges* 60
-- *Sommer* 61
-- *Wald* 63
-- *Waſſer* 58
Violen, Hunds 565
-- *Merz* 564
-- *Sumpf* 563
-- *Waſſer* 129, 247
Vogel Beeren 314
Füſs 471
Kirſchen 308, 310
Neſt 183, 575
Zunge 259

W.

No.

Wacholder-ſtrauch 641
Wald Binſen 34
Mangoldt 267
Meiſter 93
-- *gûlden* 644
Neſſel 606
Sternblume 281
Storchenſchnabel 440
Stroh 96
Viehgraſs 62
Weiderich 132
Winde 144
Wallwurz 122
Warzenkraut,
-- *Feig* 357
Waſſer Aloe 347
Andorn 24
Doſten 521
Dreyblatt 128
Eppich 202
Gauchheil 10
Grindwurz 238
Hahnenfuſs 360
Linſen 583
Münze 374
Paſtinak 191
Pfeffer 256
Roſen 342

Waſſer

Waſſer No.
Schierling 194
Schmielen 52
Strinbrech 192
Steinblumen 537
Viehgraſs 58
Viole 129, 247
Wegerich 243
Weiderich 131
Wau 304
Weedwinde 135
Wege Blatt 99
Diſtel 513
Dorn 152
Graſs 258
Kerze 147
Wegerich 99
-- *kleiner* 100
-- *ſchmaler* 101
-- *See* 102
-- *Waſſer* 243
Wege Ruhrkraut 530
Senf 426
Tritt 258
wart 508
Weiden, Aemts 627
-- *Bruch* 624
-- *Elb* 617, 620
Korb 627
-- *Palm* 626
-- *rothe Sprok* 622
Schwamm 804
Weiden, No.
-- *Silber* 629
-- *Sprok* 621
-- *weiſſe* 629
-- *Zæh* 619, 629
Weiderich,
-- *brauner* 302
-- *gelber* 130
Röſslein 246
-- *Wald* 132
-- *Waſſer* 131
Weitzen, Quæk 86
Wermuth 525
-- *Feld* 523
-- *See* 524
Weyer Blætter 109
Wie 461
Wiede 304
Wiederthon,
-- *güldener* 665
Tod 665
Wieſen Blume 369
Dunngraſs 36
Fœnich 41
Fuchs Schwanz 42
Hafer 77
Klee 477
Knœpfe 104
Kreſſe 420
Krœtengraſs 233
Kümmel 200
Raute 353

Wieſen, No.
Schwingel 70
Storchen Schnabel 441
Zittergraſs 64
Wirbeldoſt 389
Wikken 467
-- Zaun 468
Winde, Acker 135
-- kleine 135
-- Wald 144
-- Weed 135
-- Zaun 136
Wintergrûn 160
Kreſſe 427
Woker Blume 547
Wolfs Beer 260
Klauen 674
Milch 305, 306
Wurz 358
Wolgemuth 390
Woll Graſs 36
Kraut 146
Wollverley 544
Wriefkruut 456
Wuhlkraut 171
Wundkraut 457

Z. No.
Zâhnwurz 402, 419
Zæhweiden 619, 629
Zaun Glocken 136
Reiſs 98, 123
Rûbe 616
Wicken 468
Winde 136
Zeeſenbraan 374
Ziegenfuſs 203
Zittergraſs,
-- Wieſen 64
Zunge, blaue
Ochſen 125
-- Hunds 120
-- Nattern 660
-- Ochſen 119
-- rotheOchſen 119
-- Schlangen 660
-- Vogel 259
-- wilde
Ochſen 125
Zwey Blatt 576
Zahn 519
Zwiebel, Acker 218
-- klein Acker 219

III. INDEX.

NOMINUM PHARMACEUTICORUM

	No.		No.
A.		Apium	202
		Aquilegia	346
Abies	615	Ariſtolochia fabacea	451
Abſinthium vulgare	525	Armoracia	416
Acacia noſtras	311	Arnica	544
Acetoſa noſtras	239	Artemiſia rubra, alba	526
Acetoſella	290	Aſparagus	220
Acorus paluſtris	29	Atriplex ſylveſtris	166
Adianthum aureum	679	Auricula Iudæ	766
Agrimonia	303	muris	497
Alchemilla	106		
Alliaria	428		
Anethum	827	B.	
Angelica ſativa	189		
ſylveſtris	190	Barba Hirci	488
Anſerina	328	Bardana	509

Becca-

No.

Beccabunga 9
Bellis minor 545
pratenſis 546
Berberis 234
Betonica 383
Betula 603
Bonus Henricus 164
Bryonia 616
Bugloſſa 119
Burſa paſtoris 414

C.

Calamus vulgaris 225
Cannabis 633
Cardiaca 388
Caryophyllata 333
Carvi 200
Centaurium minus 177
Centumnodia 258
Ceraſa rubra 309
nigra 310
Chamæmorus 830
Chamomilla noſtras 550
Chelidonium majus 337
minus 357
Cichoreum 508
Cicuta 184, 194
Cicutaria 197
Cochlearia 415
Conſolida major 122
media 370
regalis 344
Corylus 613
Crepitus lupi 818
Cuſcuta 107
Cyanus 556
Cynogloſſa 120

D.

Daucus ſylveſtris 183
Dulcamara 150

E.

Ebulus 205
Enula

	No.		No.
Enula	539	Gramen	86
Epithymum	107	Gratiola	19
Eryſimum	426		
Eupatorium	521	**H.**	
Euphraſia	396		
		Hedera arborea	160
F.		terreſtris	376
		Hepatica alba	208
Fagus	611	nobilis	348
Farfara	533	Herniaria	163
Filix	669	Hirundinaria	162
Fragaria	327	Hyoſcyamus	149
Frangula	153	Hypericum	485
Fraxinus	653		
Fumaria	452	**I.**	
Fungus ſambucinus	766	Iuniperus	641
G.		**L.**	
Galium luteum	96	Lamium album	377
Geniſta	455	Lapathum acutum	237
Gentiana alba	187	Lens	831
Geranium robertianum	442	Lilium convallium	221
Gnaphalium	528		

Linaria

	No.
Linaria	406
Linum catharticum	210
Lithoſpermum	117
Lupulus	634
Lycopodium	674

M.

Malva vulgaris	448
Marrubium album	387
Matricaria	548
Matriſylva	93
Melilotus	474
Mercurialis	639
Millefolium	555
Morſus Diaboli	88
Muſcus arboreus	757
— caninus	748
— cumatilis	747
— clavatus	674
— erectus	675
— pyxidatus	749
Myrtillus	250

N.

	No.
Naſturtium aquaticum	421
Nepeta	373
Nummularia	133
Nymphaea alba	342

O.

Ononis	456
Origanum vulgare	390

P.

Parietaria	645
Paſtinaca	199
Pedicularis aquatica	403
Pentaphyllum	331
Perſicaria	256
Petaſites	534
Pimpinella noſtras	201
— Italica	104

Pinus

	No.
Pinus	614
Plantago latifolia	99
Polypodium	667
Populus	637
Primula veris	126
Prunella	394
Ptarmica	554
Pulmonaria maculoſa	121
arborea	739
Pulſatilla	349
Pyrola	267

Q.

Quercus	610

R.

Ranunculus albus	350
Rhoeas	349
Ribia	155
nigra	157
Roſa ſylveſtris	321
Roſmarinus ſylveſtris	264

	No.
Ros ſolis	212
Rubus idæus	323
Ruta muraria	666

S.

Sal Alcali	1
Sambucus	206
Sanicula	181
Saponaria	274
Saxifraga alba	270
rubra	318
Scabioſa	89
Scrophularia	407
Scordium	372
Sedum minus	289
Sempervivum majus	307
Serpyllum	391
Sigillum Salomonis	222
Sinapi	435
Solanum	151
Sophia	424
Sorbus aucuparia	314

	No.
Soda	1
Spina Cervina	152
Stoechas citrina	527

T.

Tanacetum	522
Taraxacum	494
Telephium	288
Thlaſpi	412
Tilia	343
Tormentilla	332
Trifolium album	476
aquaticum	128
Tuſſilago	533

U.

Ulmaria	319
Ulmus	175

	No.
Urtica major	666
Uva Urſi	266

V.

Valeriana	27
Verbaſcum (Folia)	146
(Radix. Flores)	147
Verbena	23
Veronica	7
Viola	564
Violaria	564
Virga aurea	538
Viſcum	631
Vitis idaea	829
Vulvaria	171

X.

Xanthium	607

SAMVELIS GVSTAVI
WILCKE

PHIL. DOCT. S. S. THEOL. BACCAL.

V. D. M. HORTI GRYPH. PRAEF. PAST.

ALTENKIRCH. VOCAT.

FLORA GRYPHICA.

EXHIBENS

PLANTAS

CIRCA GRYPHIAM INTRA MILLIARE

SPONTE NASCENTES

VNA CVM

NOMINIBVS ET LOCIS NATALIBVS.

GRYPHIAE

IMPENSIS ACADEMICIS LITTERIS RÖSIANIS.

A. MDCCLXV.

PRO-RECTORI
MAGNIFICO
ET
SENATVI ACADEMICO
SACRVM.

PRAEFATIO.

Quum ante biennium GRYPHIAM venirem, et BOTANICAM abiectam iacere perſpicerem, et hortum botanicum deſiderari viderem, et cultores rei herbariae deeſſe intelligerem, et regionem plantis rarioribus ſcatere, et neminem vnquam plantas circa GRYPHIAM ſponte naſcentes collegiſſe et deſcripſiſſe comperirem, tanto ſtatim maiori ſtudio in BOTANICAM incumbere decreui, quanto largiorem haec omnia meſſem promittebant. Itaque primum in regiones propinquas ſolus excurrere, omnia transſpicere, et, quae obuia veniebant, legere; mox adſcitis ſociis, collectisque auditoribus, prata, ſyluas, et littora perquirere et plantas demonſtrare; tan-

dem collecta omnia in ordinem redigere, ſuisque nominibus conſignare coepi.

Initium hoc huius libelli erat; aliud vero tunc propoſitum in eius compoſitione et editione. Nondum enim properandum cenſebam, perſuaſus, vno alteroue anno hac in re nihil perfecti a me praeſtari poſſe, variis negotiis admodum diſtracto. Neque enim omnia loca adire et perſcrutari, aut quae viſitaueram, ſat ſtudioſe perluſtrare, aut, quas reperieram, plantas, ex voto obſeruare mihi licuerat. At mutauit ſententiam mei ſtatus mutatio. Praeſtabat nunc aliquid, quam nihil, actum relinquere, praeſtabat incompletam GRYPHIAE FLORAM edere, quam, quae expiſcatus eram, tacere, et quae detexeram, obliuioni dare, quoniam nihil hac in re antea erat ſcriptum. Omne autem principium graue, nec graue ſolum, ſed etiam imperfectum eſt. Quare hoc TENTAMEN imperfectum licet, facile approbationem inueniet.

Namque

Namque defectus, quos habet, tanti non ſunt, quin ſperare liceat, fore ut ciuibus accepta ſit; quam in eo conſcribendo operam poſui. Deficiunt ſynonyma; ſed quid opus eſt ſynonymis; quando definitiones ſatis clarae et certae adſunt? Sunt autem, quas adtuli, Linneanae, reliquis omnibus longe praeſtantiores. Et qui vel SPECIES PLANTARVM, vel FLORAM ſaltem SVECICAM EQVITIS DE LINNE' euoluit, reperta ibi definitione, aut NOMINE TRIVIALI, ſynonyma citationesque ſufficientes deprehendit. Deficiunt etiam deſcriptiones; verum neque has multum deſiderabit, BIBLIOTHECA BOTANICA ornatus. Adeat LINNEVM, adeat HALLERVM, aliosue ſyſtematicos, qui deſcriptione plantam certo cognoſcere cupit. Deſunt vſus, tam arctis enim limitibus nihil perfecti narrari, et tam anguſto tempore vix aliquid noui obſeruari poteſt. Equidem quarundam plantarum vſum oeconomum, ruſticum, medicumque addere valuiſſem, ſi adferre licuiſſet, quae ſubinde ab agricolis,

 ruſticis

ruſticis et aliis audiui, quibus ſi vel fidem habuiſſem, tamen copioſe deſcribere eorum narrationes inſtituti ratio prohibebat. Deſunt variae plantae, quae GRYPHIAE ſponte proueniunt: at incertae hae, nec certis adeo miſcendae.

Quandoquidem igitur hi defectus, huius enumerationis ſtirpium gryphicarum vſum non tollunt, proſpere ei accidet, ſi BOTANICIS eodem pretio habeatur, quo aliae toties laudatae FLORAE. Fateor parum in ea noui contineri; at non perſpicio, qui hoc eius vtilitati officere poſſit. Quanti enim ſit, loci cuiusuis plantas ſcire, vel ex eo patet, quod ſummi viri patriam ſuam maximo ſemper ſtudio perquiſiuerint, eorumque opera magnis laudibus celebrata, et a magnatibus proceribusque excitata et remunerata ſit. Atque hoc fuit initium perficiendae et abſolvendae rei herbariae. Nam iis regionibus haec ſcientia optime viget, quibus cuiusuis vrbis regni vegetabilis ciues cognoſcuntur

et

et ſtudio deſcripti leguntur; id quod SVECIAE exemplo probari poteſt.

Ad diuulgandam cognitionem plantarum vtiliſſimam multum procul dubio confert loci determinati FLORA. Sunt enim, qui eam negligunt, propterea quod innumeram plantarum copiam vbique reperiri credunt. Et quis eſt, qui artem tam difficilem et longam diſcere velit? Hoc praeiudicium optime obigit FLORA, GRYPHIAE GRYPHICA.

Eandem ob cauſſam NOMINA GERMANICA adſcripſi, quotquot certa et bona conquirere potui. Facilius enim a plerisque memoriae mandantur, quae germano idiomate, quam quae romano traduntur. Quo ipſo tamen vagae verborum ſignificationi, cui ſtudui, omnino mederi non potui, errorum magnae ſcaturigini. MEDICINAE autem STVDIOSIS gratum futurum eſſe putaui, NOMINA PHARMACEVTICA vna cum illis legere, quo de nominum ſyſtematicorum praeſtantia melius perſuadeantur, magisque

poſthac MATERIAM MEDICAM principiis ſanis addiſcere allaborent.

LOCA NATALIA, quantum fieri potuit, certiſſima indicaui, quoniam ingens commodum inde pronaſcitur. Iis enim cognitis plantae variae facilius inueniri, quin cognoſci poſſunt, et ante portas quaſi colligi, quae nunc ab exteris regionibus haud paruo pretio adſciſci debent.

Reputata autem apud me plantarum gryphicarum copia, hanc concluſionem facio, operae pretium eſſe, GRYPHIAE BOTANICAE operam nauare. Namque hic praecipuae tanta ſoli variatio eſt, quanta vix alio loco. En vero miram naturae inuitationem ad hanc ſcientiam, tam vtilem, quam iucundam: prata, arua, campi, loca depreſſa et inundata, ſtagna, paludes, riuuli, maria, littora, ericeta, deſerta, ſepes, arbuſta, ſyluae, luci, colles, reliqua. Quis varietate iſta non excitetur ad perquirenda haec loca, innumeris, vt videtur, plantarum generibus adeo conferta, vt ſedulo na-

turae

turae ſcrutatori ſemper aliquid noui ſperandum ſit? Igitur ſpero aliquando, exſtituros eſſe, qui FLORAE GRYPHICAE exaugendae et perficiendae ſtudeant, et quos defectus ego admittere coactus fui, ſuppleant, quaeque GRYPHIAE ſeruatur rerum naturalium vbertas in ſui atque ACADEMIAE GRYPHICAE, a me exoptatam, laudem atque honorem deſcribant, et cum orbe eruditorum communicent. Id vt breui fiat opto et voueo. Dabam Gryphiae e Muſaeo botanico. Die XX. Decembris MDCCLXIV.

ORDO

ORDO GENERVM.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

1. Monogynia.

1 Hippuris 1

2. Digynia.

2 Callitriche 2

CLASSIS II.

DIANDRIA.

1. Monogynia.

3 Liguſtrum 4
4 Circaea 5
5 Veronica 6
6 Pinguicula 15
7 Vtricularia 16
8 Verbena 17
9 Lycopus 18

2. Digynia.

10 Anthoxanthum 19

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

1. Monogynia.

11 Valeriana 20
12 Iris 23

Gramina.

13 Scirpus 24
14 Eriophorum 29

Digynia.

15 Phalaris 31
16 Panicum 32
17 Phleum 33
18 Alopecurus 34
19 Milium 37
20 Agroſtis 38
21 Aira 42
22 Melica 45
23 Poa 46
24 Briza 52
25 Dactylis 53
26 Cynoſurus 54
27 Feſtuca 55
28 Bromus 60
29 Avena 63
30 Arundo 65
31 Lolium 67
32 Elymus 69
33 Hordeum 70
34 Triticum 71

Trigynia.

35 Holoſteum 72

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

1. Monogynia.

36 Scabioſa 73
37 Sherardia 76
38 Aſperula 77
39 Galium 78
40 Plantago 83
41 Sanguiſorba 87
42 Cornus 88
43 Alchemilla 89

2. Digynia.

44 Cuſcuta 90

3. Tetragynia.

45 Ilex 91
46 Potamogeton 92
47 Sagina 96

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

1. Monogynia.

48 Myoſotis 97
49 Lithoſpermum 98
50 Anchuſa 100
51 Cynogloſſum 101
52 Pulmonaria 102
53 Symphytum 103
54 Lycopſis 104
55 Echium 105
56 Primula 106
57 Menyanthes 107
58 Hottonia 108
59 Lyſimachia 109
60 Anagallis 112
61 Conuoluulus 113
62 Campanula 115
63 Lonicera 118
64 Verbaſcum 119
65 Datura 121
66 Hyoſcyamus 122
67 Solanum 123
68 Rhamnus 125
69 Euonymus 127
70 Ribes 128
71 Hedera 130
72 Glaux 131

2. Digynia.

73 Aſclepias 132
74 Herniaria 133
75 Chenopodium 134
76 Salſola 141
77 Vlmus 142
78 Gentiana 143

Vmbellatae.

79 Eryngium 146
80 Hydrocotyle 147
81 Sanicula 148

82 Tordylium 149
83 Daucus 150
84 Conium 151
85 Selinum 152
86 Laſerpitium 153
87 Heracleum 154
88 Angelica 155
89 Sium 156
90 Oenanthe 157
91 Phellandrium 158
92 Cicuta 159
93 Aethuſa 160
94 Chaerophyllum 161
95 Paſtinaca 163
96 Carum 164
97 Pimpinella 165
98 Aegopodium 166

3. Trigynia.

99 Viburnum 167
100 Sambucus 168
101 Alſine 170

4. Tetragyuia.

102 Parnaſſia 171

5. Pentagynia.

103 Statice 172
104 Linum 173
105 Droſera 174

6. Polygynia.

106 Myoſurus 176

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

1. Monogynia.

107 Allium 177
108 Ornithogalum 178
109 Aſparagus 180
110 Conuallaria 181
111 Acorus 185
112 Iuncus 186
113 Rumex 193
114 Triglochin 189
115 Aliſma 200

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

116 Trientalis 202

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Monogynia.

117 Epilobium 203
118 Vaccinium 205
119 Erica 208

Trigynia.

Trigynia.

120 Polygonum 210

Tetragynia.

121 Paris 215
122 Adoxa 216

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Hexagynia.

123 Butomus 217

CLASSIS X.

DECANDRIA.

Monogynia.

124 Monotropa 218
125 Ledum 219
126 Andromeda 220
127 Arbutus 221
128 Pyrola 222

Digynia.

129 Chryſoſplenium 224
130 Saxifraga 225
131 Scleranthus 227
132 Dianthus 229

Trigynia.

133 Cucubalus 231
134 Stellaria 232
135 Arenaria 234
136 Sedum 238
137 Oxalis 240
138 Agroſtema 241
139 Lychnis 242
140 Ceraſtium 244
141 Spergula 247

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Monogynia.

142 Lythrum 249

Digynia.

143 Agrimonia 250

Trigynia.

144 Euphorbia 251

Dodecagynia.

145 Semperuiuum 253

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

Monogynia.

146 Prunus 254

Digynia.

147 Crataegus 258

Trigynia.

148 Sorbus 259

Pen-

Pentagynia.

149 Meſpilus 260
150 Pyrus 261
151 Spiraea 263

Polygynia.

152 Roſa 264
153 Rubus 266
154 Fragaria 270
155 Potentilla 271
156 Tormentilla 275
157 Geum 276
158 Comarum 278

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

Monogynia.

159 Chelidonium 279
160 Papauer 280
161 Nymphaea 283
162 Tilia 285

Trigynia.

163 Delphinium 286
164 Aconitum 287

Hexagynia.

165 Stratiotes 288

Polygynia.

166 Anemone 289
167 Thalictrum 292
168 Ranunculus 293
169 Caltha 307

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnoſpermia.

170 Aiuga 308
171 Nepeta 310
172 Betonica 311
173 Mentha 312
174 Glechoma 314
175 Lamium 315
176 Galeopſis 318
177 Stachys 321
178 Ballote 323
179 Marrubium 324
180 Leonurus 325
181 Clinopodium 326
182 Origanum 327
183 Thymus 328
184 Scutellaria 330
185 Prunella 331

Angioſpermia.

186 Rhinanthus 332
187 Euphraſia 333
188 Melampyrum 335
189 Lathraea 338
190 Pedicularis 339
191 Antirrhinum 341
192 Scrophularia 342

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Siliculoſa.

193 Myagrum 343
194 Draba 344
195 Lepidium 345
196 Thlaſpi 346
197 Iberis 348
198 Alyſſum 349

Siliquoſa.

199 Cardamine 350
200 Siſymbrium 351
201 Eryſimum 355
202 Heſperis 358
203 Arabis 359
204 Turritis 360
205 Braſſica 362
206 Sinapis 363
207 Raphanus 365
208 Bunias 366

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Decandria.

209 Geranium 367

Polyandria.

210 Malua 373

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Hexandria.

211 Fumaria 376

Octandria.

212 Polygala 378

Decandria.

213 Spartium 379
214 Geniſta 380
215 Ononis 381
216 Anthyllis 382
217 Lathyrus 383
218 Vicia 386
219 Eruum 389
220 Ornithopus 392
221 Aſtragalus 393
222 Trifolium 394
223 Lotus 400
224 Medicago 401

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Polyandria.

225 Hypericum 402

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Polygamia aequalis ſemifloſculoſi.

226 Tragopogon 404
227 Picris 405
228 Sonchus 406
229 Lactuca 408

230 Prenanthes 409
231 Leontodon 410
232 Hieracium 413
233 Crepis 419
234 Hyoſeris 420
235 Lapſana 421
236 Cichorium 422

Capitati.

237 Arctium 423
238 Serratula 424
239 Carduus 426
240 Cnicus 431
241 Carlina 432
242 Bidens 433
243 Eupatorium 435

Polygamia ſuperflua.

244 Tanacetum 436
245 Artemiſia 437
246 Gnaphalium 441
247 Erigeron 445
248 Tuſſilago 446
249 Senecio 448
250 Aſter 450
251 Solidago 451
252 Inula 452
253 Arnica 455
254 Bellis 456
255 Chryſanthemum 457
256 Matricaria 459
257 Anthemis 461
258 Achillea 463

Polygamia fruſtranea.

259 Centaurea 465

Polygamia Neceſſaria.

260 Filago 468

Monogamia.

261 Iaſione 471
262 Viola 472
263 Impatiens 476

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Diandria.

264 Orchis 477
265 Ophrys 481
266 Serapias 483

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

Diandria.

267 Lemna 484

Triandria.

268 Typha 487
269 Sparganium 488
270 Carex 489

Te.

Tetrandria.

271 Betula 497
272 Vrtica 499

Pentandria.

273 Xanthium 501

Polyandria.

274 Myriophyllum 502
275 Sagittaria 503
276 Quercus 504
277 Fagus 505
278 Carpinus 506
279 Corylus 507

Monadelphia.

280 Pinus 508

Syngeneſia.

281 Bryonia 510

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

Diandria.

282 Salix 511

Tetrandria.

283 Viſcum 521

Pentandria.

284 Cannabis 532
285 Humulus 523

Octandria.

286 Populus 524

Enneandria.

287 Mercurialis 527
288 Hydrocharis 529

Monadelphia.

289 Iuniperus 530

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monoecia.

290 Holcus 531
191 Valantia 532
292 Parietaria 533
293 Atriplex 534
294 Acer 538

Dioecia.

295 Fraxinus 539

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Filices.

296 Equiſetum 540
297 Osmunda 545
298 Acroſtichum 547
299 Aſplenium 548
300 Pteris 550
301 Polypodium 551

Muſci.

302 Lycopodium 555
303 Sphagnum 556
304 Polytrichum 557
305 Mnium 558
306 Bryum 562
307 Hypnum 570

Algae.

308 Iungermannia 582
309 Marchantia 583
310 Riccia 585
311 Lichen 586
312 Chara 612
313 Tremella 613
314 Fucus 617
315 Vlua 621
316 Conférua 624
317 Byſſus 626

Fungi.

318 Agaricus 632
319 Boletus 638
320 Phallus 642
321 Eluela 643
322 Pezica 644
323 Lycoperdon 647
324 Mucor 651

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 HIPPVRIS *vulgaris*.
Habitat paſſim in ſontibus, fluuiis, ſolo profundo, limoſo, fluente, vbi gelu radices non attingit.

DIGYNIA.

2 CALLITRICHE *verna* foliis ſuperioribus oualibus, floribus androgynis.
German. *Frühjahrs Sternbluhme.*
Habitat Gryphiae in foſſis aquoſis, v. g. prope *Hohenmühl*.

3 CALLITRICHE *autumnalis* foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis.
German. *Herbſt-Sternbluhme.*
Habitat paſſim in foſſis aquoſis.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

4 Ligvstrvm *vulgare.*
Germ. *Reinholz, Mundholz.*
Habitat in Pomerania. Sponte natum allatum vidi, ipſe non reperiui.

5 Circaea *lutetiana* caulo erecto, racemis pluribus.
Habitat Gryphiae in vmbroſis depreſſis, v. g. in foſſa prope viam qua per ſyluam itur *nach Grubenhagen*, inter *Eldena* et *Koetenhagen* et alibi.

6 Veronica *officinalis* ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente.
Germ. *Ehrenpreis.* Pharm. *Veronica.*
Habitat in ſylueſtribus ſterilibus; Gryphiae *auf dem Galgenkamp* et ſupra *Hohenmühlen* copioſe. Floret Iunio.

7 Veronica *ſerpyllifolia* racemo terminali ſubſpicato, foliis ouatis glabris crenatis.
Habitat Gryphiae ad vias, agros, inque paſcuis. v. g. *neben dem Richtſteig nach Elmshagen.*

8 Veronica *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ouatis planis, caule repente.
German. *Bachbungen.* Pharm. *Beccabunga.*
Habitat ad ſcaturigines vix congelandas, in foſſis altis Gryphiae. Floret aeſtate.

9 Veronica *Anagallis aquatica* racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto.

Germ.

Germ. *Waſſergauchheil.*

Habitat Gryphiae ad foſſas et in inundatis. v. g. In foſſa *wenn man nach dem Galgenkamp gehet* et alibi ſat frequens.

10 Veronica *ſcutellata* racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis.

German.

Habitat in inundatis paſſim, Gryphiae in foſſa ſyluatica, quae circumducitur ſylua Hinrichshagenſis verſus *Hohenmühlen*. Floret Iunio et Iulio.

11 Veronica *Chamaedrys* racemis lateralibus, foliis ouatis ſeſſilibus rugoſis dentatis, caule debili.

Germ. *Gundermann.*

Habitat in pratis, ſiccis, apricis. Gryphiae copioſe in vallo vrbis.

12 Veronica *aruenſis* floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus.

Germ.

Habitat Gryphiae in aruis, *auf den Brachfeldern* et prope viam *nach Elmshagen;* in vallo vrbis verſus meridiem. Floret Maio.

13 Veronica *hederifolia* floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.

Germ.

Habitat vbique in cultis, ruderatis, primo vere floret in vallo meridiem verſus; denique tota aeſtate.

14 Veronica *verna* floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus.

 Germ.

Germ. *Händleinkraut.*

Habitat in apricis, iuxta agros, floret cum praecedente, ſed vere tantum.

15 Pingvicvla *vulgaris* nectario cylindraceo longitudine petali.

Germ. *Fettkraut.*

Habitat in vliginoſis Pomeraniae. Circa Gryphiam rarius. In hortum illata periit.

16 Vtricvlaria *vulgaris* nectario conico, ſcapo paucifloro.

Germ.

Habitat in paludibus ſyluae Grubenhagenſis.

17 Verbena *officinalis* tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario.

Germ. *Eiſenkraut*, *Eiſenhart*, *Taubenkraut.* Pharmac. *Verbena.*

Habitat in ruderatis; Gryphiae ad viam publicam prope *Eldena*, copioſiſſima ad vias pagi *Hanshagen.*

18 Lycopvs *europaeus* foliis ſinuato-ſerratis.

Germ. *Waſſer-Andorn.*

Habitat ad ripas, locisque vmbroſis vdis; Gryphiae *im wampener Buſch bey der Trift.* Foliis variat. Floret Auguſto.

DIGYNIA.

19 Anthoxanthvm *odoratum* ſpica ouato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus.

German. *Ruchgraſs.* Schreb.

Habitat vbique in pratis duriuſculis. Floret Iun.

CLASSIS

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

20 Valeriana *dioica* floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis.

Germ. *Kleinbaldrian.*

Habitat Gryphiae in vliginoſis *auf dem Galgenkamp hinten am Rick* et alibi haud frequens. Floret Iunio.

21 Valeriana *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.

Germ. *Baldrian, Gemein-Baldrian.* Pharm. *Valeriana minor.*

Hab. Gryphiae in nemoribus paludoſis copioſe. Variationes foliorum pro ſolo.

22 Valeriana *Locuſta* floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus.

Germ. *Rapünzel, Lämmer-Feld-Lattig, Nüſsgen-Salat.*

Habitat in hortis, àruis, ripis maritimis elatis. Gryphiae *gegen Elmshagen um das Mittags-Zeichen, am hohen Ufer zu Ludwigsburg hinter die Reduten.* Floret Iunio. Variationes certo coniectatas obſeruare nondum licuit.

23 Iris *Pſeudacorus* corollis imberbibus petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus.

Germ. *Schwertel, gelber Schwertel.* Pharmac. *Acorus paluſtris.*

Habitat ad ripas paludum, foſſarum vbique. Floret Iunio.

GRAMINA.

24 Scirpvs *paluſtris* culmo tereti nudo, ſpica ſubouata terminali.
Germ. *Sumpfbinſen.* Schr.
Hab. Gryphiae in foſſis et inundatis frequens. Floret Iunio.

25 Scirpvs *caeſpitoſus* culmo ſtriato nudo, ſpica biualui terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis.
Germ. *Raaſenbinſen.*
Habitat in paludibus caeſpitoſis ſyluaticis.

26 Scirpvs *lacuſtris* culmo tereti nudo, ſpicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus.
Germ. *Teichbinſen.* S.
Habitat in Ricco et ſtagnis paſſim profundioribus.

27 Scirpvs *maritimus* culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata.
Germ. *Seebinſen.* S.
Hab. ad littora maris v. g. in foſſis *hinter den Gradierhäuſern.*

28 Scirpvs *ſyluaticus* culmo triquetro folioſo, vmbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis.
Germ. *Waldbinſen.* S.
Habitat in ſyluis humentibus, v. g. *zu Hohenmühl* et *Ungnad.*

29 Eriophorvm *vaginatum* culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa.
Germ. *Sumpfdungraſs.* S.
Habitat in ſterilibus ſubudis et turfoſis. Floret Maio et Iunio.

30 Eriophorvm *polyſtachion* culmis teretibus, ſoliis planis, ſpicis pedunculatis.
Germ. *Wollgraſs, Wieſendungraſs.* S.
Habitat cum praecedente, floretque.

DIGYNIA.

31 Phalaris *phleoides* panicula cylindrica ſpiciformi.
Germ. *Foenichartiger Glanz.* Schreb.
Hab. in verſuris rarior.

32 Panicvm *crus galli* ſpicis alternis, coniugatisque, ſpiculis ſubdiuiſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari.
Germ. *Grannichtes Hirſegraſs.*
Habitat in hortis, cultis.

33 Phlevm *pratenſe* ſpica cylindrica longiſſima culmo recto.
Germ. *Wieſen-Fönich.* S.
Habitat in verſuris et pratis ſiccis.

34 Alopecvrvs *pratenſis* culmo ſpicato erecto glumis villoſis.
Germ. *Fuchsſchwanz, Wieſen-Fuchsſchwanz.* S.
Habitat in pratis et in vallo vrbis haud vbique.

35 Alopecvrvs *geniculatus* culmo ſpicato infracto.
Germ. *Knoten-Fuchsſchwanz.* S.

Habitat in vliginoſis, *am Stadtgraben* et foſſis aeſtate exſiccandis vbique. Floret Iunio.

36 Alopecvrvs *paniceus* panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis.

Germ.

Habitat in hortis, cultis infrequens.

37 Milivm *effuſum* floribus paniculatis diſperſis muticis.

Germ. *Strauſſichtes Fladdergraſs.* S.

Hab. in nemoribus vmbroſis v. g. in luco Hohenmühlenſi.

38 Agrostis *Spica venti* petalo exteriori exſerente ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam.

Germ. *Acker-Strauſsgraſs.* S.

Habitat inter ſegetes copioſiſſima.

39 Agrostis *rubra* calycibus coloratis, petalorum ariſta dorſali recurua, culmis proſtratis ſubramoſis.

Germ. *Rothes* Strauſsgraſs. S.

Habitat locis humidiuſculis. v. g. *aufm Galgenkamp.*

40 Agrostis *canina* paniculae ramulis diuaricatis muticis, culmo ramoſo repente, calycibus aequalibus.

Germ. *Braunes Strauſsgraſs.* S.

Habitat in campis, in apricis *aufm Galgenkamp.*

41 Agrostis *capillaris* panicula capillari patente, calycibus ſubulatis aequalibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis.

Germ. *Haarſtrauſsgraſs.* S.
Habitat in vmbroſis ſolo fertili, *zu Hohenmühlen.*

42 Aira *caerulea* foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis, conuoluto-ſubulatis.
Germ. *Blaue Schmielen.*
Habitat in paſcuis aquoſis, et vmbroſis.

43 Aira *caeſpitoſa,* foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta breui.
Germ. *Raaſen-Schmielen.*
Habitat in pratis cultis et fertilibus haud frequens.

44 Aira *caneſcens* foliis ſetaceis: ſummo ſpathaceo paniculam inferne obuoluente.
Germ. *Graue Schmielen.* S.
Habitat *zu Hanshagen* in duris arenoſis, ſiccis *bey dem Kirchenholz.*

45 Melica *nutans* petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici.
Germ. *Hangendes Schoengraſs.* S.
Habitat in collibus apricis, v. g. *auf dem Galgenkamp,* circa *Hinrichshagen,* rarius. Floret Iunio.

46 Poa *aquatica* panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus.
Germ. *Waſſer-Viehgraſs.* S.
Habitat in foſſis, v. g. *im äuſſern Stadtgraben beym Fettenthor, am Steg worüber man nach den Galgenkamp geht.*

47 Poa *triuialis* panicula ſubdiffuſa, ſpicis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti.
Germ. *Dreybläthigtes Viehgraſs.* S.
Habitat in paſcuis frequens, et iuxta vias.

48 Poa *pratenſis* panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti.
Germ. *Fünfbläthigtes Viehgraſs.* S.
Habitat in pratis, v. g. *bey Eldena.*

49 Poa *annua* panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo.
Germ. *Sommer-Viehgraſs.*
Habitat vbique in cultis, hortis, ad vias.

50 Poa *compreſſa* panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo.
Germ. *Berg-Viehgraſs.* S.
Habitat in ſiccis, muris, tectis, v. g. *auf und an der Stadtmauer.*

51 Poa *nemoralis* panicula attenuata, ſpiculis ſubbifloris mucronatis ſcabris, culmo incuruo.
Germ. *Wald-Viehgraſs.* S.
Habitat in ſyluis denſiſſimis, v. g. *vorne im Eldenaer Holz neben dem Wege nach Koetenhagen.*

52 Briza *media* ſpiculis ouatis, calyce floſculis breuiore.
Germ. *Wieſen-Zittergraſs.* S.
Habitat in campis ſiccis, locisque elatis, v. g. *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio et Iulio.

53 Dactylis *glomerata* panicula ſecunda glomerata.
Germ. *Knaulgraſs.* S.

Habitat

Habitat vbique in cultis ruderatis, ad vias ante vrbem inter hortos paſſim copioſa.

54 CYNOSVRVS *criſtatus* bracteis pinnatifidis.
Germ. *Gefiedertes Kammgraſs.* S.
Habitat in pratis et iuxta vias.

55 FESTVCA *ouina* panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tetragono nudiuſculo foliis ſetaceis.
Germ. *Schaaf-Schwingel.* S.
Habitat collibus apricis, pratis elatis, v. g. *auf dem Fuchsberg; zu Ludwigsburg* et alibi rarius.

56 FESTVCA *rubra* panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ſexfloris ariſtatis: floſculo vltimo mutico, culmo ſemitereti.
Germ. *Rother Schwingel.* S.
Habitat in *Galgenkamp.*

57 FESTVCA *decumbens* panicula erecta, ſpiculis ſubouatis muticis, calyce floſculis maiore, culmo decumbente.
Germ. *Kriechender Schwingel.*
Habitat in paſcuis paſſim, ad vias publicas rarior, v. g. *an der Landſtraſſe nach Hinrichshagen.*

58 FESTVCA *elatior* panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis exterioribus teretibus.
Germ. *Wieſen-Schwingel.* S.
Habitat in pratis fertilibus vbique.

59 FESTVCA *fluitans* panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis.

Germ.

Germ. *Manna, Mannaſchwingel.* S. *Schwadengrütze.*
Habitat in foſſis et paludibus ſubinde copioſiſſima.

60 Bromvs *ſecalinus* panicula patente, ſpiculis ouatis, ariſtis rectis.
Germ. *Treſp, Rockentreſp.* S.
Habitat in agris ſecalinis arenoſis vbique.

61 Bromvs *aruenſis* panicula nutante, ſpiculis ouato-oblongis.
Germ. *Ackertreſp.* S.
Habitat locis ruderatis, fertilibus, ſiccis ad vias, copioſiſſima in vallo vrbis.

62 Bromvs *giganteus* panicula nutante, ſpiculis quadrifloris: ariſtis breuioribus.
Germ. *Hoher Treſp.*
Habitat in ſyluis, Gryphiae rarior. In Rugia paſſim copioſus.

63 Avena *fatua* paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis ariſtis totis laevibus.
Germ. *Wildhafer.* S.
Habitat in agris inter ſegetes.

64 Avena *pratenſis* ſpicata, calycibus quinquefloris.
Germ. *Wieſenhafer.* S.
Habitat in apricis, paſcuis ſiccis, v. g. *auf dem Galgenkamp.*

65 Arvndo *phragmites* calycibus quinquefloris, panicula laxa.

Germ.

Germ. *Rohrſchilf.* S.
Habitat in Ricco foſſis, piſcinis, lacubus.

66 Arvndo *Epigeios* calycibus vnifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris.
Germ. *Bergſchilf.* S.
Habitat in collibus aridis paſſim in agris circa *Subſow.*

67 Lolivm *perenne* ſpica mutica: ſpicis compreſſis muticis.
Germ. *Perennirender Lülch.* S.
Habitat paſſim ad agros, in paſcuis.

68 Lolivm *temulentum* ſpica ariſtata: ſpiculis compreſſis ariſtatis.
Germ. *Taumel-Lülch.* S.
Habitat paſſim in agris inter Hordeum et in vallo rarius.

69 Elymvs *arenarius* ſpica erecta arcta, calycibus tomentoſis floſculo longioribus.
Germ. *Flugſandgraſs.* S.
Habitat ad litora marina, v. g. *bey Wampen und auf dem Streng.*

70 Hordevm *murinum* floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, inuolucris intermediis ciliatis.
Germ. *Mauſegerſte.* S.
Habitat locis ruderatis vbique, in plateis et areis vrbis quietis.

71 Triticvm *repens* calycibus ſubulatis quadrifloris acuminatis.

Germ. *Quaekgraſs, Quacken, Queckweizen.* S. Pharmac. *Gramen.*

Habitat in cultis, hortis, vix exſtirpanda.

TRIGYNIA.

72 Holosteum *umbellatum* floribus vmbellatis.

Germ.

Habitat in vallo vrbis meridiem verſus *beym Fleiſcherthor*, copioſiſſime; alibi rarius. Floret Aprili.

CLASSIS

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

73 Scabiosa *Succiſa* corollulis quadrifidis aequalibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis integerrimis.

Germ. *Abbiſs, Teufelsabbiſs.* Pharm. *Morſus diaboli.*

Habitat in paſcuis humidiuſculis paſſim, in collibus *zu Kleinzaſtrow* et alibi. Floret Iulio.

74 Scabiosa *aruenſis* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis pinnatifidis: lobis diſtantibus.

Germ. *Apoſtemkraut*, *Scabioſen.* Pharmac. *Scabioſa.*

Habitat iuxta interque ſegetes, et in pratis haud infrequens. Floret Iunio.

75 Scabiosa *Columbaria* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis.

Germ.

Habitat in colli et ſiccis ante ponticulum iuxta viam qua itur ad *Kleinzaſtrow.* Floret Iulio et Auguſto.

76 Scherardia *aruenſis* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.

Germ. *Scherards-Kraut.*

Habitat circa *Kleinzaſtrow* in aruis rariſſima. Semel in excurſione eam legi, poſtmodum non reperii.

77 ASPERVLA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis.

Germ. *Waldmeiſter*, *Sternleberkraut.* Pharm. *Matriſylua.*

Habitat in ſyluis, vmbroſis, *im Eldenaer Holze zur rechten des Weges nach Koetenhagen* copioſiſſime.

78 GALIVM *paluſtre* foliis quaternis obouatis inaequalibus, caulibus diffuſis.

Germ.

Habitat inter *Hohenmühlen* et *Elmshagen* in riuulo limoſo, inque paludibus. Floret Iunio.

79. GALIVM *uliginoſum* foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus.

Germ.

Habitat vbique copioſe in paludibus graminoſis, paſcuis aquoſis, et pratis aqua irrigatis. Floret Iunio.

80 GALIVM *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis breuibus.

Germ. *Meyenkraut, Labkraut, unſer Frauenbettſtroh, Waldſtroh.* Pharmac. *Galium luteum.*

Habitat in graminoſis, iuxta ſepes et inter arbuſta paſſim. Floret Iulio.

81 GALIVM *boreale* foliis quaternis lanceolatis trineruiis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis.

Germ. *Weismeyerkraut.*

Habitat

Habitat in pratis ſterilibus vulgatiſſimum. Floret aeſtate.

82 Galivm *Aparine* foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido.

Germ. *Klebkraut, Zaunreiſs, Klebrich.*

Habitat in cultis, ad ſepes vbique. Floret ineunte aeſtate.

83 Plantago *maior* foliis ouatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis.

Germ. *Wegerig, Wegbladt.* Pharmac. *Plantago latifolia.*

Habitat cum varietatibus in viis, pratis et hortis vbique.

84 Plantago *media* foliis ouato-lanceolatis, pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti.

Germ. *Kleiner Wegerich.*

Habitat in pratis apricis argilloſis rarior.

85 Plantago *lanceolata* foliis lanceolatis, ſpica ſubouata nuda, ſcapo angulato.

Germ. *Schmaler Wegerich.*

Habitat iuxta vias et agros vbique obuia. Floret Maio et Iunio.

86 Plantago *maritima* foliis ſemicylindraceis integerrimis: baſi lanatis, ſcapo tereti.

Germ. *Seewegerich.*

Habitat in litoribus maris ſabuloſis apricis ſterilibus v. g. pone *Wampen.* Floret Iulio.

87 Sangvisorba *officinalis* ſpicis ouatis.

Germ. *Blutkraut*, *Wieſenknöpfe*, *Biebernell.* Pharmac. *Pimpinella italica.*

Habitat in pratis ſiccioribus. Ex agro gryphico in hortum intuli, locum vbi ſumta ſuit determinate docere nequeo.

88 CORNVS *ſanguinea* arborea cymis nudis.
Germ.
Habitat in arbuſtis et dumetis ex relatione fide dignorum, mihi legere nondum contigit.

89 ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis.
Germ. *Sinau, Loewenfuſs.* Pharmac. *Alchemilla.*
Habitat paſſim in paſcuis vmbroſis, *zu Ludwigsburg oben im Elmshägner Holze nach Hohenmühlen hin.* Floret Maio et ſerius.

DIGYNIA.

90 CVSCVTA *europaea* floribus ſeſſilibus.
Germ. *Frauenhaar, Flachsſeide.* Pharmac. *α) Cuſcuta. β) Epithymum.*
Habitat in plantis variis paraſitica, *auf dem Galgenkamp* in vepretis ad foſſam quae eſt inter agrum et arbuſta.

TETRAGYNIA.

91 ILEX *aquifolium* foliis ouatis acutis ſpinoſis.
Germ. *Stechpalmen.*
Habitat in ſylua Eldenaenſi; in Rugia et *auf dem Darſs* frequentior.

92 POTAMOGETON *natans* foliis oblongo-ouatis petiolatis natantibus.
Germ. *Saamkraut, Flieſſend Saamkraut.*
Habitat in Ricco et piſcinis.

93 POTAMOGETON *lucens* foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus.

Germ.

Germ. *Klar Saamkraut.*

Habitat in Piſcina *zu Hohenmühlen.*

94 POTAMOGETON *criſpum* foliis lanceolatis alternis vndulatis.

Germ. *Kraus Saamkraut.*

Habitat in foſſis et riuulis rarius.

95 POTAMOGETON *puſillum* foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti.

Germ. *Klein Saamkraut.*

Habitat in paludibus paſſim et in inundatis Ricco adiacentibus.

96 SAGINA *procumbens* ramis procumbentibus, petalis breuiſſimis.

Germ.

Habitat in paſcuis ſterilibus, vliginoſis aridis v. g. iuxta agrum et prope pratum inundatum *bey Hohenmühlen.*

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

97 Myosotis *ſcorpioides* ſeminibus nudis: ſoliorum apicibus calloſis.

α. *aruenſis*, foliis hirſutis.

Habitat vbique campis aridis. Floret Aprili et ſerius.

β. *paluſtris*, foliis glabris.

Germ. *Vergiſs mein nicht.*

Habitat in aquoſis, ſcaturiginoſis, paluſtribus frequens.

98 Lithospermvm *officinale* ſeminibus laevibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis.

Germ. *Steinſaame, Steinhirſe.* Pharmac. *Lithoſpermum.*

Habitat *an der Stadtmauer* et in vallo.

99 Lithospermvm *aruenſe* ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus.

Germ. *Ackerſteinſaame.*

Habitat in agris et aruis; In vallo verſus meridiem vere copioſiſſimum. Floret Aprili.

100 Anchvsa *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis.

Germ. *Ochſenzunge, rothe Ochſenzunge.* Pharmac. *Bugloſſum.*

Habitat paſſim in ruderatis, ad vias et agros v. g. *zu Hanshagen*, et *auf dem Kirchhofe zu Neuenkirchen.*

101 CYNOGLOSSVM *officinale* ſtaminibus corolla breuioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus.
Germ. *Hundszunge.* Pharmac. *Cynogloſſa.*
Habitat in ruderatis et ad vias vbique.

102 PVLMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ouato-cordatis ſcabris. V. folio non maculoſo.
Germ. *Lungenkraut.* Pharm. *Pulmonaria maculoſa.*
Habitat in nemoribus v. g. *zu Hohenmühlen,* et ſylua Grubenhagenſi locis ſubhumidis. Maculoſa rarior. Floret Maio.

103 SYMPHYTVM *officinale* foliis ouato-lanceolatis decurrentibus.
Germ. *Schwarzwurz, Wallwurz, Beinwelle.* Pharmac. *Conſolida maior.*
Habitat in vmbroſis, humidis, aquoſis, foſſis vbique, variat flore albo, cereuleo et rubro. Floret Maio et ſerius.

104 LYCOPSIS *aruenſis* foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis.
Germ. *Schminkwurz.* Pharm. *Aſperugo procumbens.*
Habitat in aruis et agris, nec non inter ſegetes aeſtiuas vbique. Floret Maio.

105 ECHIVM *vulgare* caule tuberculato-hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus.
Germ. *Wilde Ochſenzunge, blaue Ochſenzunge.*
Habitat ad vias et agros rarius, v. g. *zu Griebnow vorm Schloſſe,* ad viam publicam Gry-

 phiam

phiam inter et Sundiam. Floret Iulio.

106 PRIMVLA *veris officinalis* foliis dentatis rugoſis limbo corollarum concauo.

Germ. *Schlüſſelbluhmen.* Pharm. *Primula veris.*

Habitat in pratis, locisque ſylueſtribus elatis rarior, v. g. *an den Gräben im Eldenaiſchen Holze nahe bey dem Wege nach Koetenhagen.*

107 MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis.

Germ. *Bieberklee, Sumpfklee.* Pharmac. *Trifolium aquaticum.*

Habitat in paludibus fere vbique, v. g. *zwiſchen dem Fleiſcher- und Fettenthor;* copioſiſſima *hinter der letzten Mühle,* et alibi. Floret Iunio.

108 HOTTONIA *paluſtris* pedunculo verticillato-multifloro.

Germ. *Waſſerviole.*

Habitat cum praecedente. Floret Iunio.

109 LYSIMACHIA *vulgaris* paniculata, racemis terminalibus.

Germ. *Gelber Weiderich.*

Habitat ad ripas et paſcuis depreſſis, v. g. *auf dem Galgenkamp.* Foliis binatis ternatisque variat. Floret Iulio.

110 LYSIMACHIA *thyrſiflora* racemis lateralibus pedunculatis.

Germ. *Waſſerweiderich.*

Habitat *am Stadtgraben hinter dem Collegio.*

111 LYSIMACHIA *Nummularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente.
Germ. *Egelkraut*, *Pfennigkraut.* Pharmac. *Nummularia.*
Habitat in vmbroſis, ſyluaticis, iuxta ſcrobes *im Eldenaer Holz nicht weit vom Hofe.* Floret Iulio.

112 ANAGALLIS *aruenſis* foliis indiuiſis, caule procumbente.
Germ. *Gauchheil, Grundheil.*
Habitat in arvis, iuxta viam publicam *bey* Eldena.

113 CONVOLVVLVS *aruenſis* foliis ſagittatis vtrinque acutis.
Germ. *Ackerwinde, Kleine Winde.*
Habitat in agris, inter ſegetes vbique.

114 CONVOLVVLVS *ſepium* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis vnifloris.
Germ. *Zaunwinde, Zaunklocken.*
Habitat in ſepibus vbique, v. g. *zwiſchen den Gärten.* Floret Auguſto.

115 CAMPANVLA *rotundifolia* ſoliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus.
Germ. *Gloecklein.*
Habitat vbique in pratis et ad margines agrorum. Floret Iulio et Auguſto.

116 CAMPANVLA *Trachelium* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis ciliatis.
Habitat in nemoribus et vmbroſis frequens.

117 CAMPANVLA *glomerata* caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo *terminali.* Germ.

Habitat in pratis duris es ſyluaticis paſſim. *Im Helmshägner Holz nach dem Pottkrug hin.*

118 LONICERA *Periclymenum* capitulis ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. Germ. *Waldwinde.*

Habitat in ſyluis, dumetis, collibus fruticibus conſitis frequens, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.

119 VERBASCVM *Thapſus* foliis decurrentibus vtrinque tomentoſis.

Germ. *Wollkraut, Königskerze, Fackelkraut.* Pharmac. *Verbaſcum.*

Habitat in glareoſis ſterilibus rarius. Ex agro in hortum illatum eſt. Floret Iulio et Auguſto.

120 VERBASCVM *nigrum* foliis oblongo-cordatis petiolatis.

Germ. *Wegkerze, Braunwurz.* Pharm. *Verbaſcum.* (radix).

Habitat ad pagos, vias, v. g. *zu Derſchow.* Floret Iulio.

121 DATVRA *Stramonium* pericarpiis ſpinoſis erectis ouatis, foliis ouatis glabris.

Germ. *Stechapfel, Dornapfel.*

Habitat in ruderatis ante portas.

122 HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus.

Germ.

Germ. *Dollkraut, Bilſenkraut.* Noſtratibus *Dullbillerkrut.* Pharm. *Hyoſcyamus.*

Habitat in ruderatis pinguibus vbique. Ante portam *Fleiſcherthor* tam copioſe creſcit vt dum floret, odore, ſuo tetro aerem quaſi inficiat, menſe Iulio et Auguſto.

123 SOLANVM *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis.

Germ. *Je länger je lieber, Hindſchkraut.* Pharmac. *Dulcamara.*

Habitat in foſſis, locisque humentibus, v. g. *am Stadtgraben.*

124 SOLANVM *nigrum vulgatum* caule inermi herbaceo, foliis ouatis dentato-angulatis, vmbellis nutantibus.

Germ. *Nachtſchatten, Saukraut.* Pharm. *Solanum.*

Habitat locis cultis, in hortis frequentiſſimum. Floret aeſtate.

125 RHAMNVS *catharcticus* ſpinis terminalibus floribus quadrifidis dioicis, foliis ouatis.

Germ. *Creuzbeer, Wegdorn.* Pharmac. *Spina ceruina.*

Habitat in ſepibus *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio.

126 RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis.

Germ. *Faulbaum, Pinnholz.* Pharm. *Frangula.*

Habitat cum praecedente, floretque.

127 EVONYMVS *Europaeus* floribus pleriſque quadrifidis, *α*) tenuifolius.
Germ. *Spillbaum, Spindelbaum.*
Habitat in ſepibus paſſim; *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio.

128 RIBES *nigrum* inerme, racemis piloſis, floribus oblongis.
Germ. *Gichtbeerbaum, Gichtbaum.* Pharmac. *Ribia nigra.*
Habitat in foſſa ſyluatica Hindrichshagenſi, *auf dem Galgenkamp* et alibi. Floret Aprili et Maio.

129 RIBES *Vua criſpa* ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla.
Germ. *Stickelbeeren, Stachelbeeren.*
Habitat paſſim in ſepibus, ſorte ex hortis auſuga. Floret Martio rarius, Aprili vbique.

130 HEDERA *helix* foliis ouatis lobatisqne.
Germ. *Epheu.* Noſtratibus *Wintergryn.* Pharm. *Hedera arborea.*
Habitat cum variationibus in ſyluis vmbroſis Grubenhagenſi et Eldenaenſi.

131 GLAVX *maritima.*
Germ. *Milchkraut.*
Habitat in maritimis, ſalſis, *auf dem Roſenthal* et alibi copioſe. Floret Iunio et Iulio.

DIGYNIA.

132 ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ouatis baſi barbatis, caule erecto, vmbellis proliferis.
Germ. *Schwalbenwurz.* Pharmac. *Hirundinaria.*

Habi-

Habitat *auf dem Streng*, inter *Wampen* continentem et inſulam *Kooſ*. Floret Auguſto.

133 Herniaria *glabra* glabra herbacea.
Germ. *Bruchkraut*. Pharm. *Herniaria*.
Habitat in apricis, glareoſis, ſiccis, v. g. *zu Ludwigsburg auf der Strandweide*. Floret Maio.

134 Chenopodivm *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis.
Germ. *Stolzer Heinrich, Guter Heinrich, Schmirgel*. Pharm. *Bonus Henricus*.
Habitat in ruderatis, plateis, ad ſepes vbique. Floret Maio.

135 Chenopodivm *rubrum* foliis cordato- triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis folioſis caule breuioribus.
Germ. *Rothe Melthe*. Pharmac. *Atriplex ſylveſtris*.

136 Chenopodivm *album* foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racemis erectis.
Germ. vid. Rupp. Ien. *Weiſſe Melthe*.
Habitat paſſim in agris, cultis.

137 Chenopodivm *viride* foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis.
Germ. *Grüne Melte*.
Habitat in cultis, oleraceis, locisque fertilibus nimium abundans. Floret cum affinibus aeſtate.

138 CHENOPODIVM *glaucum* foliis ouato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis.
Germ. *Gelbe Melte, Kleiner Schmirgel.*
Habitat ad fimeta, in plateis ſuburbium.

139 CHENOPODIVM *Vuluaria* foliis integerrimis rhombeo-ouatis, floribus glomeratis axillaribus.
Germ. *Wuhlkraut, Bockskraut, Stinkende Melte* etc. Pharmac. *Vuluaria.*
Habitat iu cultis oleraceis, hortis pone murum et ante portas.

140 CHENOPODIVM *polyſpermum* foliis integerrimis ouatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus.
Germ. *Stauderich.*
Habitat in cultis. Forte an plures ſpecies dantur.

141 SALSOLA *Kali* herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis, calycibus marginatis axillaribus.
Germ. *Salzkraut.*
Habitat ad litora maris, *zu Wampen hinter der Koppel.* Floret Iulio.

142 VLMVS *campeſtris* foliis duplicato-ſerratis: baſi inaequalibus.
Germ. *Ulmbaum.* Pharm. *Vlmus.*
Habitat ad Pagos et in ſyluis.

143 GENTIANA *Pneumonanthe* corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis; foliis linearibus.
Germ. *Herbſtenzian.*
Habitat apud Sundiam.

144 GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo.
Germ. *Tauſendgüldenkraut.* Pharmac. *Centaurium minus.*
Habitat inter *Helmshagen und Pottkrug, zu Hanshagen* locis apricis et depreſſis.
Centaurium minus pumilum ramoſiſſimum.
Hab. in pratis ſalſis *zu Wampen.* Floret Iulio et Auguſto.

145 GENTIANA *campeſtris* corollis quadrifidis ſauce barbatis.
Germ. *Feldenzian.*
Habitat in pratis ſiccis, v. g. in *Hindrichshagen* et *auf dem Galgenkamp.* Floret Auguſto.

VMBELLATAE.

146 ERYNGIVM *maritimum* foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis.
Germ. *Manſtreu, Gemein Manſtreu.*
Habitat ad littora maris arenoſa, v. g. *zu Ludwigsburg* et *auf dem Streng.* Floret exeunte aeſtate.

147 HYDROCOTYLE *vulgaris* foliis peltatis, vmbellis quinquefloris.
Germ.
Habitat in foſſis et aquis ſtagnantibus.

148 SANICVLA *europaea* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus.
Germ. *Sannikel.* Pharm. *Sanicula.*
Habitat in ſyluis vmbroſiſſimis, *zu Ludwigsburg.* Floret Iunio.

149 Tordylivm *Anthriſcus* vmbellis conſertis, ſoliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis.
Germ.
Habitat prope vias inter hortos et in ruderatis ante portas frequens. Floret Iulio.

150 Davcvs *Carota* ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus neruoſis *ſylueſtris*.
Germ. *Vogelneſt*. Pharm. *Daucus ſylueſtris*.
Habitat ad verſuras agrorum, ad vias, et ſepes locis aridis paſſim, v. g. ad foſſam *bey der Drift am Buſch zu Wampen* copioſe. Floret Iulio et Auguſto.

151 Conivm *maculatum* ſeminibus ſtriatis.
Germ. *Schierling*. Pharm. *Cicuta*.
Habitat iu ruderatis vbique. Floret Iulio.

152 Selinvm *paluſtre* ſublacteſcens, radice vnica.
Germ.
Habitat in foſſis aquoſis et paludibus vmbroſis, v. g. *bey Hohenmühl.* Floret Auguſto.

153 Laserpitivm *latifolium* ſoliolis cordatis inciſo-ſerratis.
Germ. *Weis Hirtzwurz*. Pharm. *Gentiana alba*.
Habitat in vmbroſis et ſyluis denſis ſolo ſubhumido, v. g. *auf dem Galgenkamp*.

154 Heraclevm *Sphondylium* foliis pinnatifidis.
Germ. *Teutſch Baehrenklau*.
Habitat in pratis, ſyluaticis, ſubhumidis cum praecedente.

155 Angelica *ſylueſtris* foliolis aequalibus ouato-lanceolatis ſerratis.

Germ.

Germ. *Wilde Angelik.* Pharmac. *Angelica ſylueſtris.*

Habitat ad paludes et locis ſyluaticis humidis, v. g. *bey der letzten Windmühle vorm Fettenthor.* Floret Auguſto.

156 Sivm *latifolium* foliis pinnatis, vmbellis terminalibus.

Germ.

Habitat in riuulis et ad ripas paludoſas frequens. Floret Auguſto.

157 Oenanthe *fiſtuloſa* ſtolonifera, caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis.

Germ. *Waſſer Steinbrech.*

Habitat in foſſis et inundatis v. g. *beym Steg worüber man nach dem Galgenkamp gehet.* Floret Iulio.

158 Phellandrivm *aquaticum* foliorum ramificationibus diuaricatis.

Germ. *Unächter Schierling.*

Habitat in foſſis limoſis, v. g. *am Stadtgraben.*

159 Cicvta *viroſa* vmbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis.

Germ. *Waſſer Schierling, aechter Schierling.* Pharm. *Cicuta.*

Habitat cum praecedente.

160 Aethvsa *Cynapium.*

Germ. noſtr. *Wilde Peterſilie.*

Habitat in hortis.

161 Chaerophyllvm *ſylueſtre* caule ſtriato geniculis tumidiuſculis.

Germ. noſtr. *Kalwerkropp.* Pharm. *Cicutaria.*
Habitat in cultis et ruderatis vbique. Floret Iunio.

162 Chaerophyllvm *temulentum* caule ſcabro, geniculis tumidis.
Germ. *Klein Kalwerkropp.*
Habitat ad aruos, vias, ſepes *zwiſchen den Gärten vorm Fleiſcherthor.*

163 Pastinaca *ſatiua* foliis ſimpliciter pinnatis.
Germ. *Wilde Paſternaken.* Pharm. *Paſtinaca.*
Habitat in paſcuis paſſim, *auf dem Wall beym Fleiſcherthor.*

164 Carvm *Carui.*
Germ. *Wilder Körwel.* Pharm. *Carui.*
Habitat in pratis ſiccis, duris *auf dem Galgenkamp* et alibi.

165 Pimpinella *ſaxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus.
Germ. *Bokspeterlein.* Pharm. *Pimpenella noſtras.*
Habitat in paſcuis ſiccis vulgatiſſima, *auf dem Galgenkamp.* Variationes maiores paſſim in ſyluis et vmbroſis. *Im Helmshager Holz nach den Pottkrug hin.* Floret Auguſto.

166 Aegopodivm *Podagraria* foliis caulinis ſummis ternatis.
Germ.
Habitat ad ſepes, et in cultis, oleraceis, pomariis frequens. Floret Iunio et ſerius cum congeneribus fere omnibus.

TRIGYNIA.

167 VIBVRNVM *Opulus* ſoliis lobatis, petiolis glanduloſis.
Germ. *Hirſchholder.* Noſtr. *Goosfleder?*
Habitat in dumetis et ſepibus paſſim *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio.

168 SAMBVCVS *Ebulus* cymis trifidis, ſtipulis ſoliaceis, caule herbaceo.
Germ. *Attich.* Pharmac. *Ebulus.*
Habitat paſſim in ſyluis et ſepibus.

169 SAMBVCVS *nigra* cymis quadripartitis, caule arboreo.
Germ. *Fliederbaum*, *Hollunder.* Pharmac. *Sambucus.*
Habitat vbique ad pagos, ſepes.

170 ALSINE *media* petalis bipartitis, ſoliis ouato-cordatis.
Germ. *Hühnerdarm, Hühnerbiſs.*
Habitat vbique in cultis. Floret toto ſere anno.

TETRAGYNIA.

171 PARNASSIA *paluſtris.*
Germ. *Parnaſsgraſs.* Pharm. *Hepatica alba.*
Habitat in vliginoſis, *hinter Hinrichshagen.*

PENTAGYNIA.

172 STATICE *Armeria* ſcapo ſimplici capitato, ſoliis linearibus.
Germ.
Habitat in campis aridis, elatis vbique.

173 LINVM *Radiola* ſoliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis.
Germ.

 Habitat

Habitat locis ſabuloſis inundatis, *bey Weidenhagen in der Moorkoppel nach dem Pottkrug hin.*

174 Drosera *rotundifolia* ſcapis radicatis, ſoliis orbiculatis.

Germ. *Sonnenthau.* Pharmac. *Ros ſolis.*

Habitat locis turfoſis, depreſſis rarior. *Im Moor beym Pottkrug.*

175 Drosera *longifolia* ſcapis radicatis, foliis oblongis.

Germ. *Sonnenthau.* Pharmac. *Ros ſolis.*

Habitat cum praecedente ſed vbique frequentior.

POLYGYNIA.

176 Myosvrvs *minimus.*

Germ. *Mausſchwanz.*

Habitat in hortis, agris et collibus apricis. Floret Maio.

CLASSIS

CLASSIS VI.
HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

177 Allivm *arenarium* caule planiſolio bulbiſe-ro, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtaminibus tricuſpidatis.

Germ. *Sandlauch.*

Habitat campis arenoſis rarior.

178 Ornithogalvm *luteum* ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis vmbellatis ſimplicibus.

Germ. *Ackerzwiebel.*

Habitat in cultis, oleraceis, *auf dem Wall hinterm Collegio.* Floret Aprili.

179 Ornithogalvm *minimum* ſcapo angulato diphyllo, pedunculis vmbellatis ramoſis.

Germ. *Klein Ackerzwiebel.*

Habitat in cultis rarior in ſyluis paſſim copioſe v. g. *im Helmshägner Holz beym Richtſteig nach Grubenhagen.* Floret Aprili.

180 Asparagvs *officinalis* caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis duabus interioribus vna erectiore.

Germ. *Spargel, Aſpars.* Pharm. *Aſparagus.*

Habitat in apricis paſſim, *auf dem Wall gegen Süden und auf dem Galgenkamp* &c.

181 Convallaria *maialis* ſcapo nudo.

Germ. *Mayblumen, Lilienconvallien.* Pharm. *Lilium conuallium.*

Habitat in ſyluis caeduis Gryphiae rarior.

182 CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris.

Germ. *Weiſswurz.* Pharmac. *Sigillum Salomonis.*

Habitat in ſyluis, vmbroſis frequens, *auf dem Galgenkamp.* Floret medio Maii.

183 CONVALLARIA *multiflora* foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris.

Germ. *Klein VVeiſswurz.*

Habitat paſſim in vmbroſis, nemoribus *auf dem Galgenkamp, bey Hohenmühlen.* Floret Maio.

184 CONVALLARIA *bifolia.*

Germ. *Einbladt.*

Habitat in pratis depreſſis, aſperis et vmbroſis, *auf dem Galgenkamp nach VVacherow.* Floret Iunio.

185 ACORVS *vulgaris.*

Germ. *Kalmus, Ackerwurz.* Pharm. *Calamus vulgaris.*

Habitat in foſſis paludoſis vbique. *Im Stadtgraben.*

186 IVNCVS *conglomeratus* culmo nudo ſtricto, capitulo laterali.

Germ. *Knopfkroetengraſs.* Schreb.

Habitat in vliginoſis frequens.

187 IVNCVS *effuſus* culmo nudo ſtricto, panicula laterali.

Germ. *Buſchkroetengraſs.* Sch.

Habitat

Habitat in vliginoſis, vmbroſis humidis *im Ladebower Holz.*

188 IVNCVS *ſquarroſus* culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis.

Habitat in vliginoſis, ceſpitoſis, *zu Helmshagen.*

189 IVNCVS *articulatus* foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis.

Germ. *Gliederkroetengraſs.*

Habitat in campis aquoſis, turfoſis. *Im Moor beym Pottkrug auf der VVieſe gegen VVackerow hin.* Floret Iulio dantur variationes.

190 IVNCVS *bufonius* caule dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus.

Germ. *Kriechendes Kroetengraſs.*

Habitat in inundatis.

191 IVNCVS *piloſus* foliis planis piloſis, corymbo ramoſo.

Germ, *Haarieges Kroetengraſs.* S.

Habitat in ſyluis, *zu Elmshagen.* Floret Aprili.

192 IVNCVS *campeſtris* foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque.

Germ. *VViesſenkroetengraſs.*

Habitat in paſcuis cum variationibus inter carices ſat frequens. Floret Maio.

193 RVMEX *criſpus* floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis vndulatis acutis.

Germ. *Krauſs Grindwurz.*

Habitat ad pagos agrosque paſſim.

194 Rvmex *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenatis.

Germ. *Grindwurz, wilde Rhabarber.* Pharm. *Lapathum acutum.*

Habitat in vmbroſis, ſucculentis, *zu Hanshagen,*

195 Rvmex *aquaticus* floribus hermaphroditis: valuulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis.

Germ. *VVaſſergrindwurz.*

Habitat ad ripas fluuiorum et paludum paſſim.

196 Rvmex *Acetoſa* floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis.

Germ. *VVild Saurampfer.*

Habitat cum variationibus in paſcuis vbique. Floret Iunio.

197 Rvmex *Acetoſella* floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis.

Germ. *Kleiner Saurampfer.*

Habitat in paſcuis et aruis arenoſis, locisque elatis duris frequens. Floret Maio.

198 Triglochin *paluſtre* capſulis trilocularibus ſublinearibus.

Germ. noſtr. *Fettgraſs.*

Habitat in pratis humidis rarior, v. g. *auf der VVieſe zwiſchen der Landſtraſſe und Hohenmühlen.* Floret Iunio.

199 Triglochin *maritimum* capſulis ſexlocularibus ouatis.

Germ.

Germ.

Habitat in pratis depreſſis maritimis copioſiſſima, et cum praecedente.

200 Alisma *Plantago aquatica* ſoliis ouatis acutis fructibus obtuſe trigonis.

Germ. *VVaſſerwegerich, Froſchlöffelkraut.*

Habitat vbique in aquoſis et ad ripas fluuiorum, paludum.

201 Alisma *Ranunculoides* foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo ſquarroſis.

Germ.

Habitat locis aquoſis rarior. In ſylua Helmshagenſi ipſe legi, locis minus vmbroſis.

CLASSIS

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

202 Trientalis *Europaea* foliis lanceolatis integerrimis.
Germ.
Habitat in ſyluis in iuniperetis fere vbique. Floret Iunio, rarius Maio.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

203 Epilobivm *paluſtre* foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto.
Germ.
Habitat locis depreſſis, humidis et irrigatis. Statura et foliis variat. Floret Iulio.

204 Epilobivm *hirſutum* foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti amplexicaulibus.
Germ. *VVaſſerviolen.*
Habitat ad foſſas, paludes et in vepretis ſolo humido, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio et Auguſto.

205 Vaccinivm *vliginoſum* pedunculis vnifloris, foliis integerrimis oualibus baſi ciliatis.

Germ.

Germ. noſtr. *Puttegnaden, Bullgraſwen.*
Habitat in vliginoſis, turſoſis. *Im Moor hinter dem Pottkrug.* Matureſcit Iulio.

206 VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis vnifloris, foliis ſerratis ouatis deciduis, caule angulato.
Germ. noſtr. *Bixbeeren.* Germ. *Heidelberen* Pharmac. *Myrtillus.*
Habitat in ſyluis vmbroſis. Copioſe *im Kirchenholz zu Hanshagen.* Floret vere, matureſcit aeſtate.

207 VACCINIVM *Oxycoccos* foliis integerrimis reuolutis ouatis, caulibus repentibus filiformibus nudis.
Germ. *Moosbeeren, Sumpfbeeren.*
Habitat cum V. vliginoſo, *zu Ludwigsburg in der Moorkoppel.* Floret Iunio.

208 ERICA *vulgaris* antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis.
Germ. *Heidenkraut.*
Habitat locis campeſtribus ſteriliſſimis frequentiſſima.

209 ERICA *Tetralix* antheris bicornibus incluſis, corollis ſubgloboſis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus.
Germ. *Heidenkraut.*
Habitat locis depreſſis ceſpitoſis et in ericetis rarior Gryphiae; alibi vulgaris.

TRIGYNIA.

210 POLYGONVM *amphibium* floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corolla longioribus.

terre-

α. *terreſtris.* Germ.
Habitat in pratis argilloſis, iuxta vias et agros frequens.

β. *paluſtris.* Habitat in foſſis et paludibus paſſim copioſe fluitans.

211 Polygonvm *Hydropiper* floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis.
Germ. *Bitterling*, *Waſſerpfeffer*, *Flöhkraut*. Pharm. *Perſicaria.*
Habitat locis ſubhumidis vbique.

212 Polygonvm *Perſicaria* floribus hexandris digynis, ſpicis ouato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis.
Germ. *Pferſingkraut*, *Flöhkraut.*
Habitat cum variationibus in cultis.

213 Polygonvm *auiculare* floribus octandris trigynis axillaribus, caule procumbente herbaceo.
Germ. *Wegetritt*, *Wegegraſs*. Pharm. *Centumnodia.*
Habitat in viis, agris, cultis vbique tantum non ſolo ſterili arenoſo.

214 Polygonvm *Conuoluulus* foliis cordatis, caule volubili, floribus planiuſculis.
Germ. *Vogelzung*, *Wildheidenkorn.*
Habitat in agris, inter Cannabim paſſim copioſiſſime. Floret Iulio.

TETRAGYNIA.

215 Paris *quadrifolia.*
Germ. *Einbeer*, *Wolfsbeer.*

Habitat nemoribus rarior. *Im Hohenmühler Holz* locis depreſſis. Floret Maio.

216 Adoxa *Moſchatellina.*

Germ.

Habitat in nemoribus, *auf dem Galgenkamp* inter arbuſta. Floret Aprili.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

217 Bvtomvs *vmbellatus.*

Germ. *Bluhmenbinſen.*

Habitat in ſoſſis vbique. Floret Iulio.

CLASSIS

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

218 MONOTROPA *Hypopithys* floribus lateralibus octandris, terminali decandro.

Germ.

Habitat in ſyluis rarior Paraſitica radicum. *Im Kirchenholz zu Hanshagen.*

219 LEDVM *paluſtre.*

Germ. *Pors. Poſt.* Pharmac. *Rosmarinus ſylueſtris.*

Habitat in paludibus vliginoſis turſoſis *im Helmshäger Torfmoor.*

220 ANDROMEEDA *Polifolia* pedunculis aggregatis, corollis ouatis, foliis alternis lanceolatis reuolutis.

Germ.

Habitat cum praecedente, *zu Ludwigsburg in der Moorkoppel.* Floret Iunio.

221 ARBVTVS *uua urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.

Germ. *Baerentraube.* Pharm. *Vua vrſi.*

Habitat rariſſime in ſyluis. *Im Grubenhager Holz.* Semel copioſe natam reperiui, poſtea fruſtra quaeſiui.

222 PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus aſcendentibus piſtillo declinato.

Germ. *Waldmangoldt.* Pharmac. *Pyrola.*

Habitat in ſyluis rarior. *Im Eldenaer, Hanshäger Holz.* Floret Iulio.

223 PYROLA *ſecunda* racemo vnilaterali.
Germ.
Habitat in ſyluis caeduis rarior, cum praecedente *im Hanshäger Kirchenholz.*

DIGYNIA.

224 CHRYSOSPLENIVM *alternifolium.*
Germ. *Güldenmilzkraut.*
Habitat in opacis humentibus. Copioſe *im Helmshäger Holz beym Moor.* Floret Maio et Iunio.

225 SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata.
Germ. *Weiſſer Steinbrech.* Pharmac. *Saxifraga alba.*
Habitat in apricis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Maio.

226 SAXIFRAGA *tridactylites* foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo.
Germ.
Hab. in aruis, *zu Ludwigsburg.* Floret Maio.

227 SCLERANTHVS *annuus* calycibus fructus patulis.
Germ.
Habitat in aruis, campeſtribus arenoſis vbique.

228 SCLERANTHVS *perennis* calycibus fructus clauſis.
Germ. *Johannis-Kraut.*
Habitat in campis apricis arenoſis.

229 DIANTHVS *prolifer* floribus aggregatis capitatis: ſquamis calycinis ouatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus.
Germ.
Habitat in collibus et paſcuis ſterilibus rarior, *zu Hanshagen.*

230 DIANTHVS *deltoides* floribus ſolitariis: ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis.
Germ. *Heidenelken.*
Habitat in pratis duris et paſcuis ſterilibus paſſim, *hinter Hohenmühlen.* Floret Iunio et Iulio.

TRIGYNIA.

231 CVCVBALVS *Behen* calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis.
Germ.
Habitat in pratis ſiccis, *am Wege nach Koetenhagen unter den Büſchen.* Floret Iulio.

232 STELLARIA *nemorum* foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis.
Germ. *Waldſternbluhme.*
Habitat in nemoribus, *zu Hohenmühlen.* Floret Maio.

233 STELLARIA *graminea* foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis.
Germ. *Sternbluhme.*
α. Maior foliis latioribus. Habitat in ſiccis, iuniperetis, *auf dem Wall am Stadtgraben hinter dem Collegio.*

Minor

β. *Minor* anguſtifolia. Habitat in pratis humidis copioſe, *bey Hohenmühlen*, huius variationes aliquot reperi. Floret Maio.

234 Arenaria *peploides* foliis ouatis acutis carnoſis.

Germ.

Habitat ad litora maris, *bey Wampen in dem Seedank.*

235 Arenaria *trineruia* foliis ouatis acutis petiolatis neruoſis.

Germ.

Habitat in ſyluis locisque vmbroſis vbique, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iunio.

236 Arenaria *ſerpyllifolia* foliis ſubouatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce breuioribus.

Habitat in arenoſis, glareoſis, aridis paſſim. Floret Maio.

237 Arenaria *rubra* foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus.

Germ. *Sandbluhme.*

α. *campeſtris.* Habitat in collibus nudis glareoſis. Floret Iunio.

β. *marina.* Habitat in litoribus marinis vbique *auf dem Roſenthal.* Floret vere et ſerius.

238 Sedvm *Telephium* foliis planiusculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto.

Germ. *Fette Henne.* Pharm. *Telephium.*

Habitat in agris arenoſis ſiccis rariſſimum, inter *Helmshagen* et *Grubenhagen* reperi.

239 Sedvm *acre* foliis ſubouatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida.

Germ. *Mauerpfeffer.* Pharmac. *Sedum minus.*
Habitat in campis et apricis ſicciſſimis inque tectis frequens.

240 Oxalis *Acetoſella* ſcapo vnifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſo-articulata.
Germ. *Sauerklee.* Pharm. *Acetoſella.*
Habitat in ſyluis, locis ſubhumidis et ad radices arborum, Floret Iunio.

241 Agrostemma *Githago* hirſuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis.
Germ. noſtr. *Radel.*
Habitat inter Segetes nimia.

242 Lychnis *Flos Cuculi* petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo.
Germ. *Kukuksbluhnie.*
Habitat in pratis humidiusculis vbique. Floret Iunio.

243 Lychnis *dioica* floribus dioicis.
α. rubra. Habitat in vmbroſis ſucculentis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Maio.
β. alba. Habitat locis ſiccis, apricis vbique, *auf dem Wall.* Floret aeſtate.

244 Cerastivm *vulgatum* foliis ouatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffuſis.
Habitat in pratis, areis frequens.

245 Cerastivm *viſcoſum* erectum viſcoſum.
Germ.
Habitat in pratis macilentis, *auf dem Wall.*

246 Cerastivm *ſemidecandrum* floribus pentandris, petalis emarginatis.
Habitat in apricis, *auf dem Wall.* Floret April.

Huic

Huic accedit Cerastivm, quod hybrida proles, mihique *dubium.* hort. gryph. Primo vere planta vncialis aut biuncialis, in hortum illata et culta excreuit, formamque mutauit, ſemper dichotoma, diffuſa, mire cum reliquis conueniens ſimulque ab iisdem differens. Habitat in vallo et alibi in apricis; cultis rarior.

247 Spergvla *aruenſis* foliis verticillatis, floribus decandris.

Germ. *Knoeterich* Noſtr. *Nägenkne.*

Habitat vbique in agris et inter ſegetes. Floret Junio.

248 Spergvla *nodoſa* foliis oppoſitis ſubulatis laeuibus, caulibus ſimplicibus.

Germ.

Habitat in campis ſubhumidis rarior; verſus *Derſchau.*

CLASSIS XI.
DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

249 Lythrum *Salicaria* foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris.

Germ. *Brauner Weiderich.*

Habitat ad ripas foſſarum et paludum et in inundatis, vbique. Floret exeunte aeſtate.

DIGYNIA.

250 Agrimonia *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis.

Germ. *Aggermennig, Odermennig* Pharmac. *Agrimonia.*

Habitat vbique in pratis apricis argillaceis. *Auf dem Galgenkamp* inter vepretes. Floret Julio.

TRIGYNIA.

251 Evphorbia *Peplis* vmbella trifida: dichotoma, inuolucellis ouatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis.

Germ. *Wolfſmilch.*

Hab in cultis oleraceis vbique. Flor. tota aeſtate.

252 Evphorbia *Helioſcopia* vmbella quinquefida: trifida: dichotoma, inuolucellis obouatis, foliis cuneiformibus ſerratis.

Germ. *Wolfſmilch. Milchkraut.*

Habitat in cultis rarior.

DODECAGYNIA.

253 Sempervivvm *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus.

Germ. *Hauslauch.* Pharm. *Semperuiuum maius.*

Hab. in tectis paſſim. *Zu Hanshagen.* Flor. Jul.

CLASSIS

CLASSIS XII.

ISOSANDRIA.

MONOGYNIA.

254 PRVNVS *Padus* floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis.
Germ. *Vogelkirſchen.*
Habitat in ſepibus, *auf dem Galgenkamp.* Floret Maio.

255 PRVNVS *Ceraſus* vmbellis ſubſeſſilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis glabris.
Germ. *Kirſchen.*
Habitat in ſyluis rarior, *auf dem Galgenkamp.* Forte ex hortis allata.

256 PRVNVS *auium* vmbellis ſeſſilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis ſubtus pubescentibus.
Germ. *Vogelkirſchen.*
Habitat in ſyluis, ſepibus, *auf dem Galgenkamp.*

257 PRVNVS *ſpinoſa* pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis.
Germ. *Schleendorn. Schleen* Pharmac. *Acacia noſtras.*
Habitat in ſepibus, ſyluis *auf dem Galgenkamp.* Floret Aprili.

DIGYNIA.

258 CRATAEGVS *Oxyacantha* foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis.
Germ.
Habitat in pratis apricis duris, ſepibus vbique, *auf dem Galgenkamp.*

TRIGYNIA.

259 Sorbvs *aucuparia* foliis pinnatis vtrinque glabris.
Germ. *Sperberbaum, Vogelbeeren.* Pharmac. *Sorbus aucuparia.*
Habitat in ſyluis.

PENTAGYNIA.

260 mespilvs *Cotoneaſter* inermis, foliis ouatis integerrimis.
Germ.
Habitat in collibus apricis, duris. Floret Vere.

261 Pyrvs *communis* foliis ſerratis, pedunculis corymboſis.
Germ. *wilder Birnbaum.*
Habitat in ſyluis paſſim, *zu Ludwigsburg.*

262 Pyrvs *Malus* foliis ſerratis, vmbellis ſeſſilibus.
Germ. *wilder Aepfelbaum.*
Habitat in ſyluis cum praecedente.

263 Spiraea *Vlmaria* foliis pinnatis: impari maiore lobato, floribus cymoſis.
Germ. *Geiſsbahrt.* Pharmac. *Vlmaria.*
Habitat in pratis vliginoſis, vmbroſis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Julio.

POLYGYNIA.

264 Rosa *canina* germinibus ouatis, pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.
Germ. *wilde Roſen.* Pharmac. *Roſa ſylueſtris.*
Habitat in ſepibus, ad margines viarum paſſim.

265 Rosa *ſpinoſiſſima* germinibus ouatis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatiſſimis.

Ger-

Germanis noſtr. *Luusbeeren.*
Habitat ad aquorum margines eorumque acervos paſſim.

266 Rvbvs *idaeus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.
Germ. *Hindbeeren, Hohlbeeren.* Pharm. *Rubus idaeus.*
Habitat in ſyluis paſſim. *Im Buſch zu Wampen beym alten Wege.*

267 Rvbvs *caeſius* foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule tereti aculeato.
Germ.
Habitat in ſyluis et dumetis frequens.

268 Rvbvs *fruticoſus* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.
Germ. *Brombeerſtrauch, Kratzbeer.*
Habitat ad vias et in dumetis vbique.

269 Rvbvs *ſaxatilis* foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus.
Germ.
Habitat in pratis, inter lapides, et ad litora maris elata abrupta paſſim.

270 Fragaria *veſca* flagellis reptans.
α *Syluestris.* Germ. *Erdbeerkraut.* Pharmac. *Fragaria.*
Habitat in campis ſylueſtribus apricis frequentiſſima. Floret Maio et Iunio.

271 Potentilla *Anſerina* foliis pinnatis ſerratis, caule repente.
Germ. *Gaenſerich.* Pharm. *Anſerina.*

Habitat in paſcuis *viridis*, in argilloſis *argentea* vbique. Floret Iunio.

272 POTENTILLA *argentea* foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto.

Germ. *Weiſs Fünffingerkraut.*

Habitat in ruderatis, apricis, *aufm Wall.*

273 POTENTILLA *verna* foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis: caulinis ternatis, caule declinato.

Germ. *Kleinfünffingerkraut.*

Habitat in paſcuis ſiccis, aridis, mari propinquis. Huic ſimillima an variatio? foliis radicalibus ſeptenis copioſe creſcit paſſim, v. g. *zu Ludvigsburg auf den Wieſen am Strande.* Floret vere.

274 POTENTILLA *reptans* foliis digitatis, caule repente, pedunculis vnifloris.

Germ. *Fünffingerkraut.* Pharmac. *Pentaphyllum.*

Habitat in apricis rarior, *auf dem Streng.* Floret Iulio.

275 TORMENTILLA *erecta* caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus.

Germ. *Tormentillwurzel.* Pharmac. *Tormentilla.*

Habitat in paſcuis ſiccis vbique. Floret Iunio et Iulio.

276 GEVM *vrbanum* floribus erectis, fructu globoſo

boſo villoſo: ariſtis vncinatis nudis, foliis lyratis.
Germ. *Garaffel.* Pharmac. *Caryophyllata.*
Habitat in vmbroſis ad ſepes, muros frequens. Floret Maio.

277 Gevm *riuale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis.
Germ.
Habitat in pratis ſubhumidis et ripis foſſarum. Floret Aprili.

278 Comarvm *paluſtre*,
Germ. *Gänſekraut, Siebenfingerkraut.*
Habitat in paludibus coenoſis, inundatis vliginoſisque frequens, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.

CLASSIS

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

279 Chelidonivm *maius* pedunculis vmbellatis.
Germ. *Schellkraut.* Pharm. *Chelidonium maius.*
Habitat vbique in locis ruderatis et ad muros.
Floret Maio et Iunio.

280 Papaver *Argemone* capſulis clauatis hiſpidis, caule folioſo multifloro.
Germ. *Ackermohn.*
Habitat in campis et agris, agrorumque marginibus. Floret Maio.

281 Papaver *Rhoeas* capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis.
Germ. *Klapperroſen.* Pharm. *Rhoeas.*
Habitat in aruis, agris cum praecedente.

282 Papaver *dubium* capſulis oblongis glabris, caule multifloro ſetis adſperſis, foliis pinnatifidis inciſis.
Germ. *wilder Mohn.*
Habitat inter ſegetes.

283 Nymphaea *lutea* foliis cordatis integerrimis calyce petalis maiore pentaphyllo.
Germ. *Seeblumen.* Noſtr. *Waatermümmelken, Geelmümmelken.*
Habitat in Ricco eiusque foſſis v. g. *Hinter den Mühlen vorm Fettenthor*, et alibi. Floret Iulio.

284 Nymphaea *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. Floret Auguſto.
Germ. *Waſſerroſen.* Pharm. *Nymphaea alba.*
Habitat in ricco ſolo profundiore.

285 Tilia *europaea* floribus nectario deſtitutis.
Germ. *Linde.* Pharmac. *Tilia.*
Habitat in ſyluis paſſim.

TRIGYNIA.

286 Delphinivm *Conſolida* nectariis monophyllis, caule ſubdiuiſo.
Germ. *Ritterſporn.* Pharm. *Conſolida regalis.*
Habitat in agris reſtibilibus et inter ſegetes. Floret aeſtate.

287 Aconitvm *Napellus* foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis.
Germ. *Eiſenhütlein.*
Habitat Grubenhagæ, forte non ſpontanea. Floret Iulio et Auguſto.

HEXAGYNIA.

288 Stratiotes *Aloides* foliis enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis.
Germ. *Waſſeraloë.*
Habitat in aquis cum nymphaea lutea. Floret Auguſto.

POLYGYNIA.

289 Anemone *Pulſatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis.
Germ. *Küchenſchellen.* Pharmac. *Pulſatilla.*
Habitat in collibus apricis exaridis rarior. v. g. *bey Grimm.* Floret vere.

290 Anemone *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule vnifloro.

Germ. noſtr. *Wittög ſchen.* Pharmac. *Ranunculus albus.*

Habitat in aſperis, duris nemoribus. Copioſiſſima *auf dem Galgenkamp.* Floret Aprili.

291 Anemone *Ranunculoides* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro.

Germ. noſtr. *Geelög ſchen.*

Habitat in pratis nemoroſis v. g. *neben dem Holz bey Hohenmühlen* et alibi. Floret Aprili.

292 Thalictrvm *flauum* caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta.

Germ. *Wieſenraute.*

Habitat in pratis ſubhumidis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.

293 Ranvncvlvs *Flammula* foliis ouato-lanceolatis petiolatis, caule declinato.

Germ.

Habitat in paſcuis vdis paſſim. Floret Iunio.

294 Ranvncvlvs *reptans* foliis linearibus caule repente.

Germ.

Habitat in paſcuis invndatis et depreſſis interque ericeta frequens.

295 Ranvncvlvs *Lingua* foliis lanceolatis, caule erecto. Floret Iunio, copioſius Iulio.

Germ.

Habitat in foſſis, aquis limoſis, pratis vdis *auf der Wieſe bey Eldena* et alibi.

296

296 Ranvncvlvs *Ficaria* ſoliis cordatis angulatis petiolatis.
Germ. *Feigwarzenkraut.* Pharmac. *Chelidonium minus.*
Habitat rarius in cultis, aruis, ruderatis. Floret Aprili et Maio.

297 Ranvncvlvs *Thora* ſoliis reniformibus ſubtrilobis crenatis: caulino ſeſſili, floralibus lanceolatis, caule ſubbifloro.
Germ. *Wolfswurz, Leopardenwurz.*
Habitat in hortis, cultis, oleraceis.

298 Ranvncvlvs *auricomus* ſoliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis: caulinis digitatis linearibus, caule multifloro.
Germ. *Goldblumen.*
Habitat in paſcuis humidiuſculis vmbroſis paſſim. v. g. *Im Elmshäger Holz.*

299 Ranvncvlvs *ſceleratus* ſoliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis.
Germ. *Waſſerhahnenfuſs.*
Habitat ad paludes et foſſas frequens. Floret Maio et Iunio.

300 Ranvncvlvs *bulboſus* calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, ſoliis compoſit.
Germ.
Habitat in pratis et paſcuis ſiccis vbique. Floret Maio et ſerius.

301 Ranvncvlvs *repens* calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſarmentis reptantibus, ſoliis compoſitis.
Germ. *Hahnenfuſs, Krähenfuſs.*

Hab.

Hab. in cultis paſſim. Floret cum praecedente.

302 Ranvncvlvs *polyanthemos* calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis.

Germ. *Butterblumen.*

Habitat in pratis et locis graminoſis.

303 Ranvncvlis *acris* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis linearibus.

Germ. *Butterblumen.*

Hab. cum praecedentibus in pratis frequens. Floret Maio et Iunio.

304 Ranvncvlvs *lanuginoſus* calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirtis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis.

Germ. *Seidenhanenfuſs.*

Hab. in ſyluis, vmbroſis graminoſis. *Im Grubenhäger, Elmshäger Holz.* Floret Maio.

305 Ranvncvlvs *aruenſis* ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus.

Germ. *Stachel.*

Hab. inter ſegetes aeſtiuas frequens. Flor. Iun.

306 Ranvncvlvs *aquatilis* foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis ſubpeltatis.

Germ. *Weiſſerhanenfuſs, Haarkraut.*

Hab. cum variationibus in aquis ſtagnantibus, foſſis, riuulis vbique. Rarior foliis omnibus capillaceis. Floret Iunio et Iulio.

307 Caltha *paluſtris.*

Germ. *Wieſenblume, Dotterblume.*

Hab. vbique in pratis invndatis copioſiſſime. Floret Aprili.

CLASSIS

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

308 AIVGA *pyramidalis* tetragono pyramidalis.
Germ. *Gyldengünſel.* Pharm. *Conſolida media.*
Habitat in pratis ſyluaticis, duris, montoſis ſiccis rarior. Inter *Eldena* et *Diedrichshagen.*

309 AIVGA *reptans* ſtolonibus reptantibus.
Germ. *Kriechender Gyldengynſel.*
Habitat in duris, montoſis, ſubvmbroſis, *bey Kleinzaſtrow am hohen Wege gleich wenn man über den Bach geht.*

310 NEPETA *Cataria* floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis.
Germ. *Katzenmünze.* Pharm. *Nepeta.*
Habitat in ruderatis, ſiccis paſſim. *Unten am Bollwerk bey den Salzkoten.* Floret Iulio.

311 BETONICA *officinalis* ſpica interrupta, corollarum lacinia intermedia labii inferioris emarginata.
Germ. *Betonic.* Pharm. *Betonica.*
Habitat.

312 MENTHA *aquatica* ſpicis capitatis, foliis ouatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus.
Germ. *Waſſermünze.*
Habitat ad ripas fluuiorum, foſſarum, locisque depreſſis vmbroſis frequens.

313 MENTHA *aruenſis* floribus verticillatis, foliis ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam aequantibus.

Germ. *Ackermünze.*

Habitat in aruis paſſim, in agris poſt meſſem, item pratis humidis, cultis, ruderatis ſat frequens. Floret aeſtate media.

314 GLECHOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis.

Germ. *Gundelreben.* Pharm. *Hedera terreſtris.*

Habitat vbique locis fertilibus, in vmbroſis, ad ſepes copioſe. Floret Aprili et ſerius.

315 LAMIVM *album* foliis cordatis acuminatis petiolatis, verticillis vigintifloris.

Germ. *weiſſe Taubneſſel.* Pharmac. *Lamium album.*

Habitat ad ſepes, in cultis et ruderatis vbique Floret Iunio.

316 LAMIVM *purpureum* foliis cordatis obtuſis petiolatis.

Germ. *Rothe Taubneſſel.*

Habitet in cultis vbique. Menſe Martio florere in apricis incipit, continuat tota aeſtate.

317 LAMIVM *amplexicaule* foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis.

Germ.

Habitat paſſim in agris, prope vias, in hortis rarior. *Vorm Fleiſcherthor.* Floret Iunio.

318 GALEOPSIS *(Ladanum)* internodiis caulinis aequalibus: verticillis omnibus remotis.

Germ. *Blaue Taubneſſel.*

Hab.

Habitat in aruis, agris requietis et demetitis. *Gegen Helmshagen zu.* Floret Auguſto.

319 GALEOPSIS *(Tetrahit)* Internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis.
Germ. *Bunte Taubneſſel, Taube-todte-Neſſel.*
Habitat in agris et inter ſegetes vulgatiſſima Variationes coloris vbique obuiae. Floret prima aeſtate.

320 GALEOPSIS *Galeobdolon* verticillis ſexfloris inuolucro tetraphyllo.
Germ. *Gelbe Taubneſſel, Goldneſſel.*
Habitat in nemoribus vmbroſis, locis ſubhumidis, ad radices truncorum, *im Holz zu Hohenmühlen,* ſat frequens. Floret Maio.

321 STACHYS *ſyluatica* verticillis ſex floris, foliis cordatis petiolatis.
Germ. *Taube Heckenneſſel.*
Habitat in nemoribus locisque vmbroſis frequens. Floret Iunio.

322 STACHYS *paluſtris* verticillis ſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemiamplexicaulibus.
Germ.
Habitat in agris et cultis humidioribus et ad ripas frequens agrorum vitium. Flor. Iulio.

323 BALLOTA *nigra* foliis cordatis indiuiſis ſerratis, calycibus acuminatis.
Germ. *Schwarzer Andorn.*
Habitat vbique in ruderatis.

324 MARRVBIVM *(vulgare)* dentibus calycinis ſetaceis vncinatis (decem).

 Germ.

Germ. *weiſſer Andorn.* Pharm. *Marrubium album.*

Habitat in ruderatis, ad vias in ſuburbiis. Floret Iulio.

325 LEONVRVS *(Cardiaca)* foliis caulinis lanceolatis trilobis.

Germ. *Herzgeſpann.* Pharm. *Cardiaca.*

Habitat in ruderatis, ad domos et pagos. Floret Iulio et Auguſto.

326 CLINOPODIVM *vulgare* capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis.

Germ. *Wirbeldoſt.*

Habitat in dumetis collium, locis vmbroſis aridis, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.

327 ORIGANVM *(vulgare)* ſpicis ſubrotundis paniculatis glomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis.

Germ. *Organ.*

Habitat in apricis ſubumbroſis ſylueſtribus in glareoſis prope Danneberg. Floret Auguſto.

328 THYMVS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis.

Germ. *Quendel.* Pharm. *Serpyllum.*

Habitat vbique in campis eleuatis collibusque apricis exaridis, *auf dem Galgenkamp.* Dantur variationes. Floret Iulio.

329 THYMVS *(Acinos)* verticillis ſexfloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis.

Germ. *wild Baſilien.*

Habitat

Habitat in collibus glareoſis aridis rarior. *Bey Derſchow.* Floret Iulio et Auguſto.

330 Scvtellaria (*galericulata*) foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.

Germ. *Helmkraut.*

Habitat ad foſſas et ripas paſſim.

331 Prvnella *vulgaris* foliis omnibus ouato-oblongis petiolatis.

Germ. *Brunellen.* Pharm. *Prunella.*

Habitat in paſcuis et pratis ſterilibus humentibusque frequens, *auf dem Galgenkamp.* Variatio quæ maior eſt et caerulea in ſyluis rarior, *bey Elmshagen.*

ANGIOSPERMA.

332 Rhinanthvs *Criſta galli* corollarum labio ſuperiore compreſſo breuiore.

Germ. *Hahnenkamm.* Noſtr. *Doſradel.*

Habitat vbique in pratis ſiccioribus. Floret Iunio. Foeniſecium determinat.

333 Evphrasia *officinalis* foliis ouatis lineatis argute dentatis.

Germ. *Augentroſt.* Pharmac. *Euphraſia.*

Habitat in paſcuis aridis ſterilibus, vbique. Floret Iunio.

334 Evphrasia *odontites* foliis linearibus: omnibus ſerratis.

Germ. *Brauner Augentroſt.*

Habitat in agris, paſcuisque ſterilibus paſſim copioſe, *auf dem Galgenkamp.* Floret Iulio.

335 Melampyrvm *nemoroſum* floribus ſecundis latera-

lateralibus: bracteis dentatis cordato-lanceolatis: ſummis coloratis.

Germ. *Johannisblume.*

Habitat in pratis et nemoribus vmbroſis locis ſucculentis frequens. Floret circa ſolſtitium aeſtiuum.

336 MELAMPYRVM *pratenſe* floribus ſecundis lateralibus: coniugationibus remotis, corollis clauſis.

Germ.

Habitat in pratis ſiccis et vmbroſis paſſim. Floret Iunio.

337 MELAMPYRVM *ſyluaticum* floribus ſecundis lateralibus: coniugationibus remotis, corollis hiantibus.

Germ.

Habitat in ſyluis ſat frequens, *bey Hohenmühlen.* Floret Iunio.

338 LATHRAEA *Squamaria* caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido.

Germ. *Zahnwurz.*

Habitat in ſyluis vmbroſis ſimis. *Im hohen Holz bey Eldena.* Floret Aprili et Maio.

339 PEDICVLARIS *paluſtris* caule ramoſo, calycibus calloſo punctatis, corollis labio obliquis.

Germ. *Läuskraut.* Pharm. *Pedicularis aquatica.*

Habitat in pratis et paſcuis aquoſis nec non locis paludoſis frequens. *Bey Wackerow.*

340 PEDICVLARIS *ſyluatica* caule ramoſo, calycibus

cibus oblongis angulatis laeuibus, corollis labio cordato.

Germ. *Läuskraut.*

Habitat in pratis ſyluaticis, nemoribus paludoſis paſſim, *zwiſchen Wampen und Ladebow.*

341 ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis.

Germ. *Leinkraut, Harnkraut.* Pharmac. *Linaria.*

Habitat in ruderatis, ad margines et foſſas agrorum paſſim, *auf dem Gulgenkamp.* Floret Iulio et Auguſto.

342 SCROPHVLARIA *nodoſa* foliis cordatis trineruatis, caule acutangulo.

Germ. *Braunwurz.* Pharmac. *Scrophularia foetida.*

Habitat locis vmbroſis, humidis ſucculentis vbique. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden.*

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

343 MYAGRVM *ſatiuum* ſiliculis obouatis pedunculatis polyſpermis.
Germ. *Leindotter.*
Habitat in agris inter Linum. Floret Iulio et Auguſto.

344 DRABA *verna* ſcapis nudis, foliis lanceolatis ſubinciſis.
Germ. *Hungerblühmchen.*
Habitat in aruis, agris, aridis frequens. Floret primo vere, Aprili et Maio.

345 LEPIDIVM *ruderale* floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis.
Germ. *Stink-Kreſſe.*
Habitat in ruderatis et ad vias publicas haud procul ab vrbe. *Vorm Fleiſcherthor.* Floret Iulio.

346 THLASPI *aruenſe* ſiliquis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris.
Germ. Pharm. *Thlaſpi.*
Habitat in agris frequens. Floret aeſtate.

347 THLASPI *Burſa paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis.
Germ. *Taeſchelkraut.* Pharm. *Burſa Paſtoris.*
Hab. vbique in ruderatis cultis, apricis aridis et ad vias. Floret primo totoque vere. Habitu folio-

foliorum et ſtatura pro ſoli differentia admodum differt.

349 IBERIS *nudicaulis* herbacea, foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici.
Germ.
Habitat in arenoſis, ſyluaticis, nudis, ſterilisſimis, *auf dem Fuchsberg bey Hohenmühl* et alibi. Floret Maio et Iunio.

349 ALYSSVM *incanum* caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis.
Germ.
Habitat in apricis, arenoſis, ſiccis rarior. Floret aeſtate.

351 CARDAMINE *pratenſis* foliis pinnatis foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis.
Germ. *Wieſenkreſſe.*
Habitat in paſcuis aquoſis, ad foſſas frequens. Floret Maio.

352 SISYMBRIVM *Naſturtium aquaticum* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis.
Germ. *Bornkreſſe*, *Brunnenkreſſe.* Pharmac. *Naſt.* ▽..
Habitat ad fontes, ripas riuulorum paſſim *bey Hohenmühlen.* Floret aeſtate.

352 SISYMBRIVM *amphibium* ſiliquis declinatis oblongo-ouatis, foliis pinnatifidis ſerratis.
Germ.
α. *Paluſtre* in paluſtribus, foſſis exſiccandis.
β. *Aquaticum* in aquis profundioribus, paludibus.

γ. *Terreſtre* in aquoſis, irrigatis, ſiccis creſcit Pro ſolo natali folia et corollae color variant. Floret ineunte aeſtate.

353 SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis.

Germ. *Sophienkraut.* Pharm. *Sophia.*

Habitat in ruderatis, maceriis, muris, tectis frequens. Floret Iulio.

354 SISYMBRIVM *Irio* foliis runcinatis dentatis nudis, caule laeui, ſiliquis erectis.

Germ.

Habitat in cultis, ruderatis, hortis. Floret Iunio et Iulio.

355 ERYSIMVM *officinale* ſiliquis ſpicae appreſſis foliis runcinatis.

Germ. *Wegſenf.* Pharmac. *Eryſimum.*

Habitat iuxta muros, in plateis et ruderatis vbique.

356 ERYSIMVM (*Barbarea*) foliis lyratis extimo ſubrotundo.

Germ.

Habitat locis ſucculentis paſſim.

357 ERYSIMVM (*Alliaria*) foliis cordatis.

Germ. *Knoblochskraut.* Pharm. *Alliaria.*

Habitat in ruderatis, ſucculentis, et ad ſepes frequens. Floret Maio.

358 HESPERIS *inodora*, caule ſimplici erecto, foliis ſubhaſtatis dentatis, petalis obtuſis.

Habitat in monticulo Galgenkamp in dumetis frequens colore variat. Floret cum *H. matronali.*

359 Arabis *thaliana* foliis petiolatis lanceolatis integerrimis.
Germ.
Habitat in aruis et ſabuloſis aridis ſupra *Helmſhagen.*

360 Tvrritis (*glabra*) foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.
Germ. *Thurmkraut, Glattthurmkraut.*
Habitat in paſcuis ſiccis apricis, *auf dem Wall.*

361 Tvrritis *hirſuta* foliis omnibus hiſpidis, caulinis amplexicaulibus.
Germ. *Rauhthurmkraut.*
Habitat in pratis ſyluaticis praecedenti rarior.

362 Brassica (*campeſtris*) radice cauleque tenui, foliis caulinis vniformibus cordatis ſeſſilibus.
Germ. noſtr. *Knütgen?*
Habitat in agris, non argilloſis, inter ſegetes.

363 Sinapis *aruenſis* ſiliquis multangulis, toroſo-turgidis roſtro longioribus.
Germ. *Ackerſenf.* Noſtr. *Küdick.*
Habitat in agris, nimis frequens inter Hordeum. Floret aeſtate.

364 Sinapis *nigra* ſiliquis glabris apice tetragonis.
Germ. *wilder Senf.* Noſtr. *Küdick.* Pharmac. *Sinapi.*

Hab.

Habitat in agris cum praecedente, locisque cultis, hortis vbique. Floret aeſtate.

365 Raphanus *Raphaniſtrum* ſiliquis teretibus articulatis laeuibus vnilocularibus.
Germ. *Hederich.*
Habitat in agris et inter ſegetes, colore variat.

366 Bunias *Kakile* ſiliquis ouatis laevibus ancipitibus.
Germ. *Seekohl.*
Habitat ad litora maris, *bey Wampen.* Floret Iulio.

CLASSIS

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

367 Geranivm (*cicutarium*) pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis.

Germ. *Gemeinſtorchenſchnabel.*

Habitat in locis cultis, ſterilibus, agris plateis frequens. In vallo vrbis floret inde ab Aprili tota aeſtate.

368 Geranivm (*ſyluaticum*) pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis.

Germ. *Waldſtorchenſchnabel.*

Habitat in ſyluis vmbroſis ſolo humidiuſculo; *bey Kleinzaſtrow.*

369 Geranivm *pratenſe* pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis multipartitis pinnatolaciniatis rugoſis acutis, petalis integris.

Germ. *Wieſenſtorchenſchnabel.*

Habitat in pratis ſubvmbroſis paſſim.

370 Geranivm *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis.

Germ. Pharm. *Geranium robertianum.*

Habitat in ſaxoſis, ruderatis vmbroſis et ad muros frequens, *an der Stadtmauer gegen Norden.*

371 Geranivm *molle* pedunculis bifloris foliisque floralibus alternis, caule ramoſo erectiuſculo, calycibus muticis arillis laeuibus.

Germ. *Weicherſtorchenſchnabel.*
Habitat in cultis et ad pagos paſſim.

372 GERANIVM *rotundifolium* pedunculis bifloris, petalis integris obtuſiſſimis longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis.
Germ. *Runderſtorchenſchnabel.*
Habitat in cultis.

POLYANDRIA.

373 MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis.
Germ. *Gaenſepappeln.* Noſt. *Kattenkees.* Pharm. *Malua vulgaris.*
Habitat in ruderatis, viis, plateis vbique. Floret Iulio.

374 MALVA *ſylueſtris* caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis.
Germ. *Roſspappeln.* Noſtr. *Haaspöppeln.*
Habitat in vmbroſis, ſiccis, ſepibus et plateis frequens. Floret toto autumno.

375 MALVA *Alcea* caule erecto, foliis multipartitis ſcabriuſculis.
Germ. *Roſenpappeln.*
Habitat in collibus apricis, dumetis, vmbroſis paſſim, *auf dem Galgenkamp.* Floret exeunte aeſtate.

CLASSIS

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

376 Fvmaria *(bulboſa)* caule ſimplici, bracteis longitudine florum.

α. Caua, radice bulboſa caua maior.

Germ. *Hohlwurz.*

Habitat locis cultis, hortis. In horto academico ſpontanea flore et albo et purpureo. Pharm. *Ariſtolochia fabacea.*

β. Media radice bulboſa non caua minor. In vmbroſis rarior v. g. ad foſſas in ſylua Eldenaenſi cum Farſara. Floret Aprili.

377 Fvmaria *(officinalis)* pericarpiis polyſpermis racemoſis, caule diffuſo.

Germ. *Erdrauch.* Pharmac. *Fumaria.*

Habitat in agris, cultis, hortis frequens. Floret vere et ſerius.

OCTANDRIA.

378 Polygala *vulgaris* floribus criſtatis racemoſis; caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis.

Germ: *Creuzblume.*

Habitat in pratis et paſcuis ſiccis. Colore rubro, purpureo, caeruleo et albo variat Floret.

DECANDRIA.

379 Spartivm *(ſcoparium)* foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis.

Germ. *Haaſengeil.*

Hab.

Habitat in ſyluis locis aridis apricis, collibus ſiccis, ſepibus paſſim copioſe, *bey Hohenmühlen.* Floret aeſtate.

380 GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis.

Germ. *Färberpfriemen.* Noſtr. *Glöſen.* Pharm. *Geniſta.*

Habitat in campis, ericetis, collibus paſſim, *bey Kleinzaſtrow.* Floret Iulio.

381 ONONIS *ſpinoſa* floribus racemoſis geminis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubuillosis.

α. Spinoſa, caule ſpinoſo.

Germ. *Hauhechel.* Pharm. *Ononis.*

Habitat in campis ſiccis, pratis, et ad litora maris frequens.

β. Mitis, caule inermi. In pratis maritimis rarior. Florent Iulio et Auguſto.

382 ANTHYLLIS *(Vulneraria)* herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato.

Germ. *Wundkraut.*

Habitat in campis et collibus ſiccioribus rarior. *Bey Grimm.*

383 LATHYRVS *(pratenſis)* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliis lanceolatis.

Germ. *Wie.*

Habitat in pratis, dumetis, ſepibus frequens.

384 LATHYRVS *(ſylueſtris)* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliis enſiformibus, internodiis membranaceis.

Germ.

Germ.

Habitat in nemoribus, dumetis, ſepibus paſſim.

385 Lathyrus *latifolius* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis.

386 Vicia *(Cracca)*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris.

Germ.

Habitat in agris inter ſegetes vbique.

387 Vicia *ſepium* leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ouatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus.

Germ. *Zaunwicken.*

Habitat in ſepibus et vmbroſis haud infrequens. Floret Iunio.

388 Vicia *(ſatiua)* leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliis retuſis, ſtipulis notatis.

Germ.

Habitat paſſim inter ſegetes.

β. Nigra, ſemine rotundo nigro habitat cum priori.

389 Ervum (*Lens*) pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis conuexis.

Germ. *Linſen.*

Habitat nonnunquam inter ſegetes forte non ſpontanea.

390 Ervum *(tetraſpermum)* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis.

Germ.

Habitat in agris et oleraceis cultis.

391 Ervvm *(hirſutum)* pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis.
Germ.
Habitat in agris et hortis.

392 Ornithopvs *(perpuſillus)* foliis pinnatis, leguminibus ſubarcuatis.
Germ. *Vogelfuſs.*
Habitat in campis arenoſis, ſylueſtribus ſiccis et ſterilibus v. g. *bey Helmshagen, am Waldgraben bey Hindrichshagen.*

393 Astragalvs *(glycyphyllos)* cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, foliis ouatis pedunculo longioribus.
Germ. *Wildſüsholz.*
Habitat in collibus nemoroſis rarior, *auf dem höchſten waldigſten Hügel bey Kleinzaſtrow.* Floret Iulio.

394 Trifolivm *(hybridum)* capitulis vmbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente.
Habitat in cultis et ad vias agrorum paſſim rarior. Floret Auguſto.

395 Trifolivm *(repens)* capitulis vmbellaribus leguminibus tetraſpermis, caule repente.
Germ. *weiſſer Klewer.* Pharmac. *Trifolium album.*
Habitat vbique in campis et paſcuis. Floret Iulio.

396 Trifolivm *pratenſe* ſpicis ſubuilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis.

Germ.

Germ. *rother Klewer*, *Wieſenklee.*
Habitat in paſcuis et pratis graminoſis frequens.

397 Trifolium *aruenſe* ſpicis villoſis oualibus, dentibus calycinis ſetaceis aequalibus.
Germ. *Haaſenpoten.*
Habitat in paſcuis ſterilibus, montoſis frequens.

398 Trifolium *montanum* capitulis terminalibus, corollarum vexillis ſubulatis, foliolis lanceolatis ſerratis.
Germ. *Bergklewer.*
Habitat in pratis et collibus ſiccioribus paſſim, *bey Kleinzaſtrow diſſeit des Bachs.*

399 Trifolium *procumbens* ſpicis oualibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus.
Germ. *gelber Klewer.*
Habitat paſſim in aruis et inter ſegetes, *bey Derſchow an der Landſtraſſe, bey Gribnow.* Floret Iunio et Iulio.

400 Lotus *corniculata* capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus.
Germ.
Habitat in pratis vulgatiſſima.

401 Medicago *lupulina* ſpicis oualibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caule procumbente.
Germ. *Hopfenklee.*
Habitat in pratis, aruis, cultis et fere vbique. Floret tota aeſtate.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

402 HYPERICVM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, ſoliis obtuſis pellucido punctatis.
Germ. *Johanniskraut.* Pharm. *Hypericum.*
Habitat in collibus, ſepibus, dumetis frequens.

403 HYPERICVM *quadrangulum*, floribus trigynis caule quadrato herbaceo.
Germ.
Habitat in pratis et ad vias rarior, *an der Stadtmauer gegen Norden.*

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS

Semifloſculoſi.

404 TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollae radium aequantibus, ſoliis integris ſtrictis.
Germ. *Bockbart.* Pharmac. *Barba Hirci.*
Habitat in pratis apricis rarius, *bey Hohenmühlein.*

405 PICRIS *Hieracioides* perianthiis laxis, ſoliis integris.
Germ.
Habitat in agris eorumque verſuris.

406 SONCHVS *arvenſis* pedunculis calycibusque hiſpidis, ſoliis runcinatis, baſi cordatis.
Germ.

Germ. *Ackerdiſtel.*
Habitat inter ſegetes, in agris argilloſis et requietis frequens.

407 SONCHVS *oleraceus* pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. α) *laeuis.* β) *aſper.*
Germ. *Haſenkohl, Milchdiſtel.*
Habitat ſolo laetiori culto ruderato frequens, foliorum laciniis et aſperitie varians.

408 LACTVCA *viroſa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis.
Germ.
Habitat in aggeribus, ſepibus raro, *bey der Wallmühle.* Floret Iulio.

409 PRENANTHES *muralis* floſculis quinis, foliis runcinatis.
Germ.
Habitat in nemoribus et vmbroſis, *an der Stadtmauer gegen Norden.* Floret Iulio.

410 LEONTODON *(Taraxacum)* calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laeuibus.
Germ. *Pfaffenröhrlein, Dotterbluhme.* Noſtr. *Butterbluhme.* Pharm. *Taraxacum.*
Habitat in paſcuis locisque cultis et ruderatis vbique. Floret tota vere; in vallo Martio incipit.

411 LEONTODON *(autumnale)* caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.
Germ.
Habitat in pratis et paſcuis, autumno.

412 LEONTODON (*hiſpidum*) calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis: pilis furcatis.

Germ.

Habitat in pratis vmbroſis, ſepibus, *auf dem Galgenkamp.* Floret Auguſto.

413 HIERACIVM *Piloſella* foliis integerrimis ouatis, ſubtus tomentoſis, caule repente, ſcapo vnifloro.

Germ. *Mausohr.*

Habitat in paſcuis aridis, collibus, aggeribus vbique. Floret Iunio et Iulio.

414 HIERACIVM *dubium* foliis integris ouato-oblongis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro.

Germ.

Habitat in aggeribus, marginibusque agrorum rarior, *bey Hohenmühlen nach Hindrichshagen hin.* Floret cum praecedente.

415 HIERACIVM *murorum* caule ramoſo, foliis radicalibus ouatis dentatis, caulino minore.

Germ.

α. Syluaticum folio glabro. Habitat in ſyluis et vmbroſis durioribus paſſim.

β. Myophorum. Habitat in pinetis et fagetis rarior, *zu Hanshagen im Kirchenholz.* Floret aeſtate.

416 HIERACIVM *paludoſum* caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hiſpidis.

Germ.

Hab.

Habitat in nemoribus paludoſis et vmbroſis. Floret aeſtate.

417 Hieracivm *ſabaudum* caule erecto multifloro, foliis ouato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus.

Germ. *Habichtkraut.*

Habitat in vmbroſis, *bey Hohenmühl und Wampen.* Floret aeſtate.

418 Hieracivm *vmbellatum* foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubvmbellatis.

Germ.

Habitat in paſcuis apricis ſiccis rarior, *bey Kleinzaſtrow:* in Rugia paſſim copioſe. Floret auguſto.

419 Crepis *tectorum* foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus laeuibus: inferioribus dentatis, caule glabro.

Germ.

Habitat in apricis, aridis. Floret aeſtate.

420 Hyoseris *minima* caule diuiſo nudo, pedunculis incraſſatis.

Germ.

Habitat in aruis, ad agros et agrorum aggeres. Copioſe *bey Kleinzaſtrow;* rarior inter *Ladebow* et *Wampen.* Floret Iulio.

421 Lapsana *communis* calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſis ſimis.

Germ. *Rainkohl.*

Habitat in cultis, oleraceis, ruderatis frequens.

422 Cichorivm *Intybus* floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis.

Germ. *Wegwart, Hindläufte.* Pharm. *Cichoreum.*

Habitat ad margines agrorum viarumque, *vor dem Fleiſcherthor.*

Capitati.

423 Arctivm *(Lappa)* foliis cordatis inermibus petiolatis. *α.* capitulis tomentoſis. *β)* non tomentoſis.

Germ. *Klettendiſtel.* Pharm. *Bardana.*

Habitat in cultis ruderatis vbique.

424 Serratvla *tinctoria* foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus.

Germ. *Schartenkraut.*

Habitat in pratis, interque dumeta paſſim, *bey Wampen neben der Trift.* Floret Auguſto.

425 Serratvla *arvenſis* foliis dentatis ſpinoſis.

Germ. *Saudiſtel, Ackerdiſtel.*

Habitat in cultis, agris, hortis vbique nimia.

426 Cardvvs *lanceolatus* foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis diuaricatis, calycibus ouatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo.

Germ. *Diſtel, groſſe Diſtel.*

Habitat in cultis ruderatis.

427 Cardvvs *acanthoides* foliis decurrentibus ſinuatis margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis.

Germ. *Diſtel, Wegdiſtel.*

Habitat in ruderatis, ad pagos et ſepes.

429 Cardvvs *criſpus* foliis decurrentibus ſinuatis,

tis, margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus inermibus.

Germ. *Diſtel, krauſe Diſtel.*

Habitat in agris, cultis et ruderatis.

429 Cardvvs *paluſtris* foliis decurrentibus: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus.

Germ. *Sumpfdiſtel.*

Habitat in pratis ſubpaludoſis et vmbroſis humidis frequens.

430 Cardvvs *(acaulis)* acaulis calyce glabro.

Germ. *Herbſtdiſtel.*

Habitat in paſcuis apricis depreſſis, *zwiſchen Hindrichshagen und Derſchow.* Floret Auguſto.

431 Cnicvs *oleraceus* foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis ſubcoloratis integris concauis.

Germ. *Kohldiſtel.*

Habitat ad foſſas vmbroſas et in pratis nemoroſis humidis frequens, *bey Hohenmühlen.* Floret Auguſto.

432 Carlina *vulgaris* caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis.

Germ. *Sooddiſtel, Gemein Eberwurz.*

Habitat in montoſis, aridis, ſabuloſis paſſim. Floret Auguſto.

433 Bidens *tripartita* foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis.

Germ. *Zweyzahn.*

Habitat in aquoſis, foſſis, vbi aquae pluuiales ſtagnant, frequens.

434 Bidens *cernua* ſeminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis.

Germ.

Habitat ad foſſas et fontes minus frequens.

435 Evpatorivm *(cannabinum)* foliis digitatis. Germ. *Waſſerdoſten.* Pharm. *Eupatorium.*

Habitat ad aquas inque foſſis, *bey Hohenmühlen* et alibi frequens. Floret Iulio.

POLYGAMIA SVPERFLVA.

436 Tanacetvm *vulgare* foliis bipinnatis inciſis ſerratis.

Germ. *Reinfahren.* Pharm. *Tanacetum.*

Habitat in ſiccis pratis, aggeribus et marginibus agrorum frequens.

436 Artemisia *vulgaris* foliis pinnatifidis planis inciſis: ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus, floribus ouatis: radio quinquefloro.

Germ. *Beyfuſs*, *Stabwurz.* Pharm. *Artemiſia rubra alba.*

Habitat in cultis, ruderatis vbique.

438 Artemisia *campeſtris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus.

Germ. *Feldwermuth.*

Habitat in campis apricis, arenoſis, aridis, *bey Hanshagen.*

439 Artemisia *maritima* foliis multipartitis tomentoſis, racemis cernuis, floſculis femineis ternis.

Germ.

Germ. *Seewermuth.*
Habitat ad litora maris.

440 Artemisia *Abſinthium* foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis, receptaculo papposo.
Germ. *Wermuth.* Pharm. *Abſinthium vulgare.*
Habitat in ruderatis et ad pagos vbique.

441 Gnaphalivm *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, caule ſimpliciſſimo, corymbo compoſito.
Germ. *Reinblumen.* Pharm. *Stoechas citrina.*
Habitat in campis apricis ſterilibus arenoſis *bey Neuenkirchen und Derſchow..* Floret Iulio et Auguſto.

442 Gnaphalivm *dioicum* ſarmentis procumbentibus caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminali, floribus dioicis.
α. *mas* flore rotundiore.
β. *femina* flore et folio longiore.
Germ. *Katzenpfötgen.* Noſtr. *Kattenpoten.* Pharm. *Gnaphalium.*
Habitat in apricis aridis ericetis frequens. Floret Maio.

443 Gnaphalivm *ſyluaticum* caule ſimpliciſſimo floribus ſparſis.
Germ.
Habitat in ſyluis arenoſis, *bey Koetenhagen.* Floret Iulio.

444 Gnaphalivm *vliginoſum* herbaceum, caule ramoſo diffuſo, floribus conſertis terminalibus.
Germ. *Wegruhrkraut.*

Hab.

Habitat vbi aquae hyemali tempore ſtagnarunt ſaepe in ipſis viis, frequens. Floret aeſtate.

445 Erigeron *acre* pedunculis alternis vnifloris. Germ.

Habitat in apricis montoſis ſterilibus arenoſis paſſim.

446 Tussilago *Farfara* ſcapo imbricato vnifloro, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis.

Germ. *Huflattich.* Pharm. *Farfara. Tuſſilago.*

Habitat ad agros argilloſos et foſſas glareae ſarinaecae paſſim, *bey Eldena.* Floret Martio et initio Aprilis.

447 Tussilago *Petaſites* thyrſo ouato, floſculis omnibus hermaphroditis.

Germ. *Peſtilenzwurz.* Pharm. *Petaſites.*

Habitat locis ruderatis. *Vor dem Fleiſcherthor am Stadtgraben.* Floret Aprili.

448 Senecio *vulgaris* foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus nudis ſparſis.

Germ. *Creuzwurz.*

Habitat in cultis, ruderatis, plateis vbique. Floret toto vere et aeſtate.

449 Senecio *Iacobaea*, corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto.

Germ. *Jacobskraut.*

Habitat paſcuis et pratis montoſis frequens, *auf dem Wall.* Floret Iulio.

450 Aster *Tripolium* foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inaequatis, floribus corymboſis.

Germ.

Germ. *Waſſerſternbluhme.*
Habitat in litoribus marinis, et foſſis ſalſis frequens, *auf dem Roſenthal, bey der Salzhütte.* Floret Auguſto, copioſius Septembri.

451 Solidago *Virgaurea* caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis.
Germ. *Goldruthe.* Pharm. *Virga aurea.*
Habitat in paſcuis ſiccis, aggeribus, muris frequens. Floret Auguſto.

452 Invla *Helenium* foliis amplexicaulibus ouatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ouatis.
Germ. *Alandwurz.* Pharm. *Enula.*
Habitat in pratis depreſſis et ad foſſas, *zu Friedrichshagen und Grubenhagen.*

453 Invla *(Britannica)* foliis amplexicaulibus lanceolatis diſtinctis ſerratis, ſubtus villoſis, caule rimoſo villoſo erecto.
Germ.
Habitat in campis et pratis ſubhumidis, nec non paſcuis ſalſis, *auf dem Galgenkamp und bey Wampen.*

454 Invla *Pulicaria* foliis amplexicaulibus vndulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis.
Germ. *Flohkraut.*
Habitat ad vias vbi aquae pluuiales ſtagnarunt frequens.

455 Arnica *montana* foliis ouatis integris, caulinis geminis oppoſitis.
Germ. *Wollverley, Mutterwurz, Johannisbluhme.* Pharm. *Arnica.*

Hab.

Habitat in collibus pratenſibus apricis *bey Grimm*, in ſyluis ſterilibus *bey Hanshagen.*

456 Bellis (*perennis*) ſcapo nudo vnifloro.

Germ. *Gänſeblümchen*, *Marienblumen*, *Marl-blühmchen.* Pharm. *Bellis minor.*

Habitat in campis apricis roridis vbique. Floret toto fere anno vix niue fuganda.

457 Chrysanthemvm *ſegetum* foliis amplexicaulibus ſuperne laciniatis inferne dentato-ſerratis.

Germ. Noſtr. *Wokerblume.* Pharm. *Bellis pratenſis.*

Habitat inter ſegetes aeſtiuas, præſertim hordeo frequens agrorum vitium. Floret Iulio et ſerius.

458 Chrysanthemvm *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis inferne dentatis.

Germ.

Habitat in pratis ſiccioribus, aggeribus paſſim, *bey Kleinzaſtrow.* Floret Iulio.

459 Matricaria *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ouatis inciſis, pedunculis ramoſis.

Germ. *Mutterkraut*, *Mater.* Pharmac. *Matricaria.*

Habitat in cultis, ruderatis circa vrbem. Floret aeſtate.

460 Matricaria *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſeminibus nudis, ſquamis calycinis margine aequalibus.

Germ

Germ. *Chamillen*, noſtr. *Kamellen*. Pharmac. *Chamomilla noſtras.*
Habitat in cultis, ruderatis, agris ſecalinis frequens.

461 ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis.
Germ. *Krätendill*. Noſtr. *Hundsblume*. Pharm. *Cotula foetida.*
Habitat ad vias, plateas, in ruderatis et agris vbique. Floret aeſtate.

462 ANTHEMIS *aruenſis*, receptaculis conicis, lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis.
Germ. Noſtr. *wilde Kamellen.*
Habitat in aruis et agris requietis frequens.

463 ACHILLAEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis.
Germ. *wilder Bertram*. Pharm. *Ptarmica.*
Habitat in pratis humectis et ad ſepes, *auf dem Galgenkamp, bey Wampen*. Floret Auguſto.

464 ACHILLAEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis laciniis linearibus dentatis, caulibus ſulcatis.
Germ. *Schafgarbe*. Noſtr. *Reinfahren*. Pharm. *Millefolium.*
Habitat in paſcuis et pratis ſiccioribus vbique. Variat purpureo et albo colore.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

465 CENTAVREA *ſcabioſa* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis.
Germ. *Hartkopf*. Noſtr. *Hartkopf?*
Habitat in pratis ſterilibus, marginibus agrorum,

rum, et ripis praeruptis maritimis frequens. Floret Auguſto.

466 Centavrea *Iacea* calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis.

Germ.

Habitat in pratis campisque apricibus duris, *auf dem Galgenkamp.* Floret Auguſto.

467 Centavrea *Cyanus* calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis.

Germ. *Kornbluhme.* Noſtr. *Trempſen.* Pharm. *Cyanus.*

Habitat in agris ſecalinis et triticeis ſaepe nimis abundans. Variat corolla albida. Floret Iulio.

POLYGAMIA NECESSARIA.

468 Filago *pyramidata* caule dichotomo erecto, capitulis globoſis axillaribus terminalibusque.

Germ. *Ruhrkraut.*

Habitat in agris, campis et ſecus vias paſſim.

469 Filago *montana* caule erecto diuiſo, floribus pyramidatis lateralibus exillaribusque.

Germ. *Bergruhrkraut.*

Habitat in ſabuloſis, montoſis, aridis, *bey Ungnade.*

470 Filago *aruenſis* floribus conicis lateralibus, caule paniculato.

Germ. *Ackerruhrkrant.*

Habitat in campis ſabuloſis paſſim. Filagines florent exeunte aeſtate.

MONO-

MONOGAMIA.

471 IASIONE *montana.*
Germ.
Habitat in aruis et collibus aridis arenoſis paſſim. *Zwiſchen Helmshagen und Hohenmühlen.*

472 VIOLA *odorata*, acaulis, ſoliis cordatis, ſtolonibus reptantibus.
Germ. *Märzviolen.* Noſtrat. *Blauögſchen.* Pharm. *Viola*, *Violaria.*
Habitat in graminoſis apricis vmbroſis collibus paſſim. Floret Aprili, rarius Martio.

473 VIOLA *canina* caule adultiore aſcendente, ſoliis oblongo-cordatis.
Germ. *Hundsviolen.*
Habitat in vmbroſis vbique. Floret Aprili, *odorata* ſerius.

474 VIOLA *paluſtris*, acaulis ſoliis reniformibus.
Germ. *Sumpviolen.*
Habitat in pratis humidis, ericetis locisque ſubudis. *Zwiſchen Hindrichshagen und Subſow.* Floret Maio.

475 VIOLA *tricolor* ſoliis oblongo inciſis, ſtipulis dentatis, caule triquetro diffuſo.
Germ. *Freiſamkraut*, *Stiefmütterchen.*
α. bicolor flore candido et luteo, habitat vbique in ſterilibus aruis, hortis, tectis.

β. *bicolor* flore caeruleo et candido, habitat cum praecedente rarior. Floret Aprili et ſerius. *Tricolor* viſa nondum fuit ſpontanea, tametſi in hortis naſcatur.

476 Impatiens *noli tangere* pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus.

Germ. *Springkraut.*

Habitat in foſſis nemoroſis vmbroſis humidis paſſim copioſe v. g. *im Graben am Wege wenn man von Eldena nach Kaetenhagen geht.* Floret Iulio.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

477 Orchis (*Morio*) bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo, petalis omnibus conniuentibus.

Germ. *Knabenkraut.*

Habitat in pratis et ſyluis ſubhumidis paſſim, *bey Hohenmühlen.*

478 Orchis (*conopſea*) bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio crenato.

Germ.

Habitat in pratis nemoroſis paſſim, *bey Hohenmühlen und Hindrichshagen.*

479 Orchis *maculata* bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breuiore: labio plano, petalis dorſalibus patulis.

Germ. *gefleckte Knabenkraut.*

Habitat in pratis depreſſis, frequens.

480 Orchis *latifolia* bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus.

Germ. *Breitblättrichtes Knabenkraut.*

Habitat in pratis humidioribus et vmbroſis frequens. Floret Iunio, rarius Maio, cum affinibus.

481 Ophrys *ouata* bulbo fibroſo, caule biſolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido.

Germ. *Zweyblatt.*

Habitat in pratis humidioribus ſylueſtribus. Copioſe *bey Hohenmühlen.*

482 OPHRYS *Nidus auis* bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido.

Germ. *Vogelneſt.*

Habitat in ſylua Eldenaenſi locis vmbroſiſſimis; aliquoties a me lecta inter Kaetenhagen et Friedrichshagen.

483 SERAPIAS *Helleborine* bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo petalis breuiore.

Germ.

Habitat in ſylua Grubenhagenſi. Figura foliorum variat. Floret Iulio et Auguſto.

CLASSIS XXI.
MONOECIA.

DIANDRIA.

484 LEMNA (*polyrrhiza*) foliis ſeſſilibus, radicibus confertis.
Germ.
Habitat in paludibus et foſſis.

485 LEMNA (*minor*) foliis ſeſſilibus vtrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis.
Germ. *Waſſerlinſen.*
Habitat in aquis ſtagnantibus et quietis.

486 LEMNA *triſulcalia* foliis petiolatis lanceolatis.
Habitat in riuulis lente fluentibus, foſſis et aquis altioribus paſſim.

TRIANDRIA.

487 TYPHA (*anguſtifolia*) foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula feminineaque remotis.
Germ.
Habitat ad ripas piſcinarum et paludum paſſim. *Im Rickfluſs.*

488 SPARGANIVM (*erectum*) foliis erectis triangularibus.
Germ.
Habitat in foſſis et piſcinis frequens.

489 CAREX *pulicaris* ſpica ſimplici androgyna.
Germ. *Kleinriedgraſs.*
Habitat in paludibus limo repletis aeſtate vix ſiccandis acceſſu difficilioribus. *Im Grubenhäger Torfmoor.*

490 CAREX *vulpina* ſpica ſupra decompoſita in-

 ferne

ſerne laxiore, ſpiculis androgynis ouatis ſeſſilibus glomeratis ſuperne maſculis.
Germ. *Fuchsriedgraſs.*
Habitat in Vepretis et iuxta aquas paſſim.

491 CAREX *filiformis* ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis: inferiore ſoliolo propiore breuiore.
Germ. *dünnes Riedgraſs.*
Habitat in nemoribus, *bey Hohenmühl.*

492 CAREX *limoſa* ſpicis ouatis pendulis: maſculina longiore erectiore, radice repente.
Germ. *Sumpfriedgraſs.*
Hab. in paludibus limoſis profundis ſyluaticis.

493 CAREX *ceſpitoſa* ſpicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro.
Germ. *Raaſenriedgraſs.*
Habitat in paludibus ceſpites virides conſtituens.

494 CAREX *veſicaria* ſpicis maſculis pluribus femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis.
Germ. *blaſigtes Riedgraſs.*
Habitat ad foſſas frequens.

495 CAREX *acuta* ſpiculis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis.
Germ. *ſpitziges Riedgraſs.* Sch.
Habitat α) *maior* ad foſſas et ripas riuulorum paſſim, β) *minor* in pratis frequens humentibus.

496 CAREX *hirta* ſpiculis maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis.
Germ. *rauhes Riedgraſs.*

Hab.

Habitat in ſiccis glareoſis paſſim. Carices pleraeque vere florent.

TETRANDRIA.

497 Betvla (*alba*) foliis ouatis acuminatis ſerratis.
Germ. *Birke.* Pharmac. *Betula.*
Habitat in ſyluis haud frequens.

498 Betvla (*Alnus*) pedunculis ramoſis.
Germ. *Aerle, Eller.*
Habitat in ſyluis locis humidis et ad riuulos.

499 Vrtica (*vrens*) foliis oppoſitis oualibus.
Germ. *Eiterneſſel.*
Habitat in maceriis, ſepibus, cultis vbique. Floret Iunio.

500 Vrtica (*dioica*) foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis.
Germ. *Brenneſſel, Waldneſſel.* Pharm. *Vrtica maior.*
Habitat vbique ad domos, ſepes, et in locis cultis et ruderatis. Floret Iunio et ſerius.

PENTANDRIA.

501 Xanthivm (*ſtrumarium*) caule inermi, foliis cordatis trineruatis.
Germ. *Bettlerläus.* Pharm. *Xanthium.*
Habitat in ruderatis et ſterquiliniis frequens.

POLYANDRIA.

502 Myriophyllvm *ſpicatum* floribus maſculis interrupte ſpicatis.
Germ.
Habitat in paludibus et foſſis. Floret Iulio.

503 Sagittaria *ſagittifolia* foliis ſagittatis acutis.
Germ. *Pfeilkraut.*
Habitat ad ripas fluuii Ricci.

504 Qvercvs *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus: angulis obtuſis.
Germ. *Eiche.* Pharmac. *Quercus.*
Habitat in ſyluis.

505 Fagvs *ſyluatica* foliis ouatis obſolete ſerratis.
Germ. *Büche, Buchbaum.* Pharm. *Fagus.*
Habitat in ſyluis, ſyluas vaſtas conſtituens.

506 Carpinvs *betulus* ſquamis ſtrobilorum planis.
Germ. *Hagbüche.*
Habitat in ſylvis et nemoribus locis depreſſis humidis.

507 Corylvs *Auellana* ſtipulis ouatis obtuſis.
Germ. *Haſſelſtaude.* Pharm. *Corylus.*
Habitat in ſyluis et ſepibus. Floret Ianuario et Februario.

MONADELPHIA.

508 Pinvs *ſylueſtris* foliis geminis primordialibus glabris.
Germ. *Fichte*, *Fichtenbaum.* Pharm. *Pinus.*
Habitat in ſyluis locis eleuatis ſiccis, paſſim. Syluas ipſa conſtituit v. g. *Hanshagen.*

509 Pinus *Abies* foliis ſubulatis mucronatis laeuibus biſariam verſis.
Germ. *Tanne.* Pharmac. *Abies.*
Habitat in ſyluis cum praecedente.

SYNGENESIA.

510 Bryonia (*alba*) foliis palmatis vtrinque calloſo-ſcabris.
Germ. *Zaunrübe.* Pharmac. *Bryonia.*
Habitat in ſepibus, ad pagos et domus haud infrequens. *Zwiſchen den Gärten.* Floret Iulio.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

511 Salix *vitellina* foliis ſerratis ouatis acutis glabris: ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis.
Germ. *Zähweiden.*
Habitat ad pagos et domus, ſorte allata.

512 Salix *amygdalina* foliis ſerratis glabris, foliis pentandris.
Germ. *Rothe Sprockweiden.*
Habitat ad foſſas et in paludibus paſſim.

513 Salix *fragilis* foliis ſerratis glabris, ouato-lanceolatis, petiolis dentato glanduloſis.
Germ. *Sprockweiden.*
Habitat ad domos et pagos, nec non in ſyluis rarior.

514 Salix *purpurea* foliis ſerratis glabris lanceolatis: inferioribus oppoſitis.
Germ. *Rheinweiden, gelbe Zähweiden.*
Habitat ad foſſas et pagos plantata.

515 Salix *arenaria* foliis integris ouatis acutis, ſupra ſubuilloſis, ſubtus tomentoſis.
Germ.
Habitat in paſcuis vdis et ad paludes.

516 Salix *incubacea* foliis integerrimis lanceolatis: ſubtus villoſis nitidis, ſtipulis ouatis acutis.
Germ. *Bruchweiden.*
Habitat in paſcuis duriuſculis, vliginoſis.

517 Salix *caprea* foliis ouatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, vndatis ſuperne denticulatis.
Germ. *Palmweiden.*
Habitat in nemoroſis, ſiccis.

518 Salix *viminalis* foliis ſubintegerrimis lanceolato linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis.
Germ. *Korbweiden, Aehmtsweiden.*
Habitat in ſyluis et ad pagos.

519 Salix *cinerea* foliis ſubſerratis oblongo-ouatis: ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato cordatis.
Germ.
Habitat in paludoſis ſubhumidis.

520 Salix *alba* foliis lanceolatis acuminatis ſerratis vtrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis.
Germ. *weiſſe Weiden, Silberweiden, Zähweiden.*
Habitat ad pagos et domus.

Incerta adhuc eſt Salicum familia ob varietates, pro ſolo obuias. Hinc certas aliquot ſpecies tantum adtuli, quum plures omnino ſponte circa Gryphiam creſcant. Id quod nominum germanorum copia teſtatur. Addo *Salicem polyandram* Staminibus octo ad decem, quae frutex eſt et in humidis *auf dem Galgenkamp* creſcit.

TETRANDRIA.

521 Viscum *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus.
Germ. *Miſpel.* Pharmac. *Viſcum.*

Hab.

Habitat in ſyluis paraſitica in truncis arborum rarior. In ſylua Eldenaenſi.

PENTANDRIA.

522 CANNABIS *ſatiua*.
Germ. *Hanf.* Pharm. *Cannabis.*
Habitat in ruderatis prope vrbem copioſe, et alibi ad pagos et ſepes.

523 HVMVLVS *Lupulus.*
Germ. *Wilder Hopfen.* Pharm. *Lupulus.*
Habitat in ſepibus paſſim; *hinter der Stadtmauer.* Ex hortis aufuga.

OCTANDRIA.

524 POPVLVS *alba* foliis ſubrotundis dentato angulatis ſubtus tomentoſis.
Germ. *weiſſe Pappeln.* Noſtr. *Abelen.*
Habitat in ſyluis et ad domos paſſim.

525 POPVLVS *tremula* foliis ſubrotundis dentato-angulatis vtrinque glabris.
Germ. *Aeſpen.* Noſtr. *Fauläſchen.*
Habitat in ſyluis paſſim.

526 POPVLVS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis ſerratis.
Germ. *ſchwarze Pappeln.* Pharm. *Populus.*
Habitat ad pagos et in ſepibus rarior.

ENNEANDRIA.

528 MERCVRIALIS *perennis* caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris.

Germ.

Germ.

Habitat in ſyluis, vmbroſis rarior, *bey Eldena.*

529 Mercvrialis *annua* caule brachiato, ſoliis glabris, floribus ſpicatis.

Germ. *Bingelkraut.* Pharm. *Mercurialis.*

Habitat in cultis, oleraceis, hortis paſſim copioſe.

530 Hydrocharis *(morſus ranae).*

Germ. *Froſchbiſs.*

Habitat in foſſis limoſis vbique.

MONADELPHIA.

531 Ivnipervs *communis* ſoliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus.

Germ. *Wacholderſtrauch.* Noſtrat. *Knirk.* Pharmac. *Iuniperus.*

Habitat in apricis, duris, ericetis vbique. Semper frutex humilis, arbor nondum viſa.

CLASSIS

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

531 Holcvs *lanatus* glumis bifloris villoſis: hermaphrodito mutico, maſculo ariſta recurua.
Germ. *Wollichtes Darrgraſs.* Schr.
Habitat in paſcuis, vt plurimum arenoſis.

532 Valantia *Cruciata* floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis.
Germ. *Gülden Waldmeiſter, Creuzkraut, gelb Creuzkraut, rauch Meyerkraut.*
Habitat in dumetis rarior, *bey Kleinzaſtrow.*

533 Parietaria *officinalis* foliis lanceolatis ouatis alternis.
Germ. *Glaſskraut.* Pharmac. *Parietaria.*
Habitat in ruderatis, vmbroſis. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden* copioſe. Floret Auguſto.

534 Atriplex *laciniata* caule herbaceo foliis deltoidibus dentatis, ſubtus argenteis.
Germ.
Habitat in littoribus maritimis.

535 Atriplex *haſtata* caule herbaceo, valuulis ſemineis magnis deltoidibus ſinuatis.
Germ.
Habitat paſſim in cultis, ruderatis.

536 Atriplex *patula* caule herbaceo patulo, foliis ſubdeltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis.

Germ.

Germ. *Wilde Melden.*
Habitat in ruderatis, cultis, agris.

537 Atriplex *litoralis* caule herbaceo erecto, ſoliis omnibus linearibus integerrimis.
Germ.
Hab. in littoribus maris, *bey Wampen.* Floret Iulio.

538 Acer *Platanoides*, ſoliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymboſis.
Germanis *Lönn.*
Habitat in ſyluis paſſim.

DIOECIA.

539 Fraxinvs *excelſior* ſoliolis ſerratis, floribus apetalis.
Germ. *Aeſche.* Pharmac. *Fraxinus.*
Habitat in ſyluis et ad pagos et domus.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

540 EQVISETVM *(ſyluaticum)* caule ſpicato, frondibus compoſitis.

Germ.

Habitat in ſyluis deſertis eorumque pratis.

541 EQVISETVM *(aruenſe)* ſcapo fruticante nudo, ſterili frondoſo.

Germ. (ſcapus fructificans) *Duwock* (ſterilis frondoſus.)

Habitat in pratis, aruis, ſaepe et in agris calamitoſa.

542 EQVISETVM *(paluſtre)* caule angulato, frondibus ſimplicibus.

Germ.

Habitat locis paludoſis, foſſis limoſis et aquoſis.

543 EQVISETVM *(fluuiatile)* caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus.

Germ.

Habitat ad ripas riuulorum.

544 EQVISETVM *(hyemale)* caule nudo ſcabro, baſi ſubramoſo.

Germ. *Schaffruſs.*

Habitat in ſyluis vliginoſis aſperis paſſim.

545 OSMVNDA (*Lunaria*) ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria.

Germ.

Habitat in pratis et paſcuis apricis ſiccioribus

rariſſime. *Am Wege bey Kleinzaſtrow gleich wenn man über den Bach geht.*

546 OSMVNDA *regalis* frondibus bipinnatis apice racemiferis.
Germ.
Habitat *in Hanshagen* et alibi locis longius ab vrbe remotis.

547 ACROSTICHVM *(ſeptentrionale)* fronde nuda lineari laciniata.
Germ.
Habitat in rimis murorum locis ruderatis vmbroſis rariſſimum.

548 ASPLENIVM *(Trichomanes)* frondibus pinnatis, pinnis ſubrotundis crenatis.
Germ.
Habitat cum praecedente rariſſimum.

549 ASPLENIVM (*Ruta muraria*) frondibus alternatim decompoſitis, foliolis cuneiformibus crenulatis.
Germ. *Mauerraute.*
Habitat cum praecedente ſed frequentior.

550 PTERIS *(aquilina)* fronde ſupra decompoſita foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus.
Germ.
Habitat in ſyluis praeuſtis exaridis frequens.

551 POLYPODIVM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata.

Germ. *Engelſüs.* Pharm. *Polypodium.*
Habitat rariſſimum in ſyluis vmbroſiſſimis ad lapides, *bey Hanshagen.*

552 Polypodium (*Phegopteris*) fronde ſubbipinnata: foliolis infimis reflexis; paribus pinnula quadrangulari adunatis.
Habitat in Fagetis paſſim.

553 Polypodium (*Filix mas*) fronde bipinnata; pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo.
Germ.
Habitat paſſim in ſyluis.

554 Polypodium (*Filix femina*) fronde bipinnata: pinnis lanceolatis acutis pinnatifidis.
Germ.
Habitat in vmbroſis et apricis ſalicetis humidis.

MVSCI.

555 Lycopodium *clauatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis.
Germanis.
Habitat in ſyluis vmbroſis.

556 Sphagnum *paluſtre* ramis deflexis.
Habitat in paludibus turfoſis et ad aquas ſtagnantes frequens, ſtagna replens.

557 Polytrichum (*commune*) caule ſimplici, anthera parallelepipeda.
Dantur variationes α) *vulgatum* ſiue maius. β) *glaucum* ſiue medium γ) *piloſum* ſ. minus.

Hab.

Habitat α) in vliginoſis β) paſcuis et monto-ſis ſubhumidis γ) arenoſis, ſiccis, ſteriliſſimis.

558 Mnivm *(pellucidum)* caule ſimplici, foliis ouatis.

Habitat in paſcuis ſucculentis vmbroſis. *Am Stadtgraben unter den Weiden.*

559 Mnivm *(hygrometrum)* acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona.

Habitat in apricis, vmbroſis, ſterilibus, vel paullo fertilioribus. *Hinter der Stadtmauer beym Rickfluſs.*

560 Mnivm *(ſerpyllifolium)* pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis.

α. *proliferum* pedunculis aggregatis, foliis roſaceo congeſtis lanceolatis acutis.

β. *vndulatum*, foliis oblongis vndulatis.

Habitat in muſcoſis frequens; et cum praecedente.

561 Mnivm *(Iungermannia)* foliis diſtichis, pinnis ſubtus auriculatis.

Habitat in ſubhumidis. *Am Rick.*

562 Bryvm *(apocarpum)* antheris ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima.

β. *hirſutum.*

Habitat in arboribus et ad earum radices, haud vmbroſas.

563 Bryvm *(ſtriatum)* antheris ſubſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis, ſurſumue piloſis.

α. maius. Habitat in arboribus, truncis.

β. minus. Habitat in muris, ſaxis, arboribus.

γ. piloſum. Habitat in vmbroſis, ſyluis.

564 Bryvm (*pyriforme*) antheris erectis obouatis, calyptra ſubulata, ſurculis acaulibus, foliis ouatis muticis.
Habitat in pratis paſſim rarius.

565 Bryvm (*pomiforme*) antheris erectis ſphaericis.
Habitat ad aggeres ſyluarum truncosve locis ſucculentis. *Im Eldnaer Holz.*

566 Bryvm (*rurale*) antheris erectiuſculis, foliis piliferis recuruis.
Habitat in muris, tectis ſtramineis, arborumque truncis frequens.

567 Bryvm (*murale*) antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus ceſpitoſis.
Habitat in muris, tectis, tegulis vbique.

568 Bryvm (*puluinatum*) antheris ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis.
Habitat in muribus.

569 Bryvm (*Hypnoides*) antheris erectis, caule erectiuſculo, ramis lateralibus breuibus fertilibus.
Habitat in ſyluis, ſaxis, ſabuloſis rarius. *Bey Hanshagen im Kirchenholz.*

570 Hypnvm (*complanatum*) fronde pinnata ramoſa:

moſa: ſoliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis.

Habitat ad truncos arborum. *Hinter der Stadtmauer gegen Norden.*

571 Hypnvm *(rutabulum)* ramis vagis ſubrepentibus, foliis ouatis mucronatis imbricatis.

Habitat in ſepibus, vmbroſis, ad arborum truncos antiquos.

572 Hypnvm *proliferum,* ſurculis proliferis plano pinnatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis, ſyluis. *Bey Hindrichshagen am Waldgraben.*

573 Hypnvm *parietinum* ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis.

Habitat in pratis et ſyluis ſiccis.

574 Hypnvm *(ſquarroſum)*, ramis vagis, foliis ouatis apice ſubulatis vndique reflexis.

Habitat in vmbroſis, ſubhumidis. *Hinter der Mauer.*

575 Hypnvm *(cupreſſiforme)* ſurculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recuruis apice ſubulatis.

Habitat ad truncos et radices arborum locis ſucculentis. *Hinter der Mauer.*

576 Hypnvm *(curtipendulum)* ſurculis vagis teretibus, foliis ouatis acutis patulis, antheris pendulis.

Habitat cum praecedente.

577 Hypnvm *(purum)* ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ouatis obtuſis conniuentibus.

Habitat in paſcuis et ſyluis rarius. Inter Hortos ad ſepes.

578 Hypnvm *(illecebrum)* ſurculis ramisque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis.
Habitat in paſcuis locisque ſubvmbroſis.

579 Hypnvm *(ſericeum)* ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis.
Habitat ad truncos, muros frequens.

580 Hypnvm *(ſerpens)* ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis.
Habitat ad caudices, ligna, ſaxa vbique.

ALGAE.

581 Ivngermannia *(aſplenioides)* frondibus ſimpliciter pinnatis: foliolis ouatis ſubciliatis.
Habitat ad radices ſalicum locis vmbroſis.

582 Ivngermannia *(dilatata)* ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus.
Habitat in truncis arborum copioſe, lichen imbricatum mentiens.

583 Marchantia *(polymorpha)* calyce communi decemfido.
Habitat iuxta aquas, ad ripas riuuulorum vmbroſas et ad fontes.

584 Marchantia *(hemiſphaerica)* calyce communi quinquefido hemiſphaerico, perichaetio nullo.

Hab.

Habitat in paſcuis humidis rarius. *Bey Kaetenhagen* haud procul a ſcaturigine, it. *im Torfmoor beym Pottkruge* Menſe Iulio.

585 Riccia (*minima*) frondibus glabris bipartitis acutis

Habitat in paſcuis arenoſis, vbi per hyemen aquae ſtagnarunt.

586 Lichen (*ſcriptus*) leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis, characteriformibus.

Habitat in corticibus arborum laeuioribus.

587 Lichen (*rugoſus*) leproſus albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis.

Habitat in truncis arborum, in ſyluis frequens.

588 Lichen (*ſanguinarius*) leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris.

Habitat in arboribus frequens, in ſepibus paſſim.

589 Lichen (*fuſco-äter*) leproſus fuſcus, tuberculis atris.

Habitat in muris, lapidibus, petris.

590 Lichen (*fagineus*) leproſus albus, tuberculis albis farinaceis.

Habitat in truncis Fagorum.

591 Lichen (*carpineus*) leproſus cinereus, tuberculis albidis rugoſis.

Habitat in truncis Carpini.

592 Lichen (*ericetorum*) leproſus candidus, tuberculis incarnatis.

Habitat in ſyluis paludoſis ſphagno paluſtri innaſcens. *Im Grubenhäger Moor.*

593 LICHEN *(candelarius)* cruſtaceus flauus, ſcutellis luteis.
Habitat in muris et parietibus antiquis frequens.

594 LICHEN *(palleſcens)* cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis.
Habitat in corticibus arborum.

595 LICHEN *(ciliaris)* foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis.
Habitat in arboribus frequentiſſimus.

596 LICHEN *(pulmonarius)* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus.
Pharm. *Pulmonaria arborea.*
Habitat ſuper arborum truncos in ſyluis antiquis v. g. *Im Eldenaer Holz.*

597 LICHEN *(furfuraceus)* foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis; ſubtus lacunoſis atris.
Habitat in arboribus et parietibus ligneis.

598 LICHEN *(farinaceus)* foliaceus erectus compreſſus ramoſus farinaceus: lateribus verrucoſis.
Habitat in antiquis arboribus et parietibus.

599 LICHEN *(calicaris)* foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus.
Habitat in antiquis arboribus folioſis.

600

600 LICHEN *(fraxineus)* foliaceus erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber, ſcutellis ſubpedunculatis.
Habitat in truncis Querci et Fraxini.

601 LICHEN *(prunaſtri)* foliaceus erectiuſculus lacunoſus ſubtus tomentoſus albus.
Habitat in Fraxinis et prunis ſpinoſis.

602 LICHEN *(iuniperinus)* foliaceus laciniatus criſpus fuluus, peltis liuidis.
Habitat in arboribus inprimis Iuniperis.

603 LICHEN *(aphthoſus)* foliaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali aſcendente.
Pharmac. *Muſcus cumatilis.*
Habitat in ſyluis ſterilibus muſcoſis ſub iuniperis.

604 LICHEN *(caninus)* foliaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali aſcendente.
Pharmac. *Muſcus caninus.*
Habitat in ſyluis ad lapides demerſos.

605 LICHEN *(cocciferus)* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis.
Pharmac. *Muſcus pyxidatus.*

606 LICHEN *(pyxidatus)* ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis.
Habitat vbique in ſterilibus. Variationes dantur, a me nondum ſatis obſeruatae.

I 5 607

607 Lichen (*gracilis*) ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis.
Habitat in ſterilibus, petroſis, muris antiquis.

608 Lichen (*deformis*) ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubuentricoſus, calycibus dentatis.
Habitat in ſyluis, muris antiquis vmbroſis.

609 Lichen (*ſubulatus*) fruticuloſus tubuloſus dichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis.

610 Lichen (*plicatus*) filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis.
Pharm. *Muſcus arboreus.* Vulgo Vsnea.
Habitat vbique in denſis ſyluis.

611 Lichen (*barbatus*) filamentoſus pendulus ſubarticulatus, ramis patentiſſimis.
Habitat in Fagis aliisque arboribus aceroſis antiquis.

612 Chara (*vulgaris*) caulibus laeuibus, frondibus interne dentatis.
Habitat in aquis pigris rarius. *Vor dem Fettenthor auf der Weide.*

613 Tremella (*iuniperina*) ſeſſilis membranacea auriformis fulua.
Habitat in iuniperis poſt pluuias. In ſylua prope *Hohenmühlen.*

614 Tremella (*Naſtoc*) plicata vndulata.
Habitat in pratis rarius.

615 Tremella (*Auricula*) ſeſſilis membranacea auriformis cinerea.

Pharm.

Pharmac. *Fungus ſambucinus Auricula Iudae.*
Habitat ad arbores putridas, in ſambuco prae-ſertim.

616 Tremella (*purpurea*) ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra.
Habitat in arboribus moribundis.

617 Fucus (*ſerratus*) fronde plana dichotoma ſerrata verſus apices tuberculata.
Habitat in mari balthico. In littoribus maris paſſim reiecta reperitur.

618 Fucus (*veſiculoſus*) fronde dichotomo integra, caule medium folium transcurrente, veſiculis verrucoſis terminalibus.
Germanis noſtr. *Dank.*
Habitat in mari balthico. In littoribus frequens.

619 Fucus (*faſtigiatus*) dichotomus ramoſiſſimus teres vniformis faſtigiatus.
Habitat cum praecedente.

620 Fucus (*Filum*) filiformis ſimplex fragilis opacus.
Habitat cum praecedente.

621 Vlva (*inteſtinalis*) tubuloſa ſimplex.
Habitat cum praecedente. Reiicitur ad littora Rarius in foſſis ſalſis.

622 Vlva (*compreſſa*) ſabuloſa ramoſa compreſſa.
Habitat cum praecedente.

623

623 VLVA (*granulata*) ſphaerica aggregata.
Habitat ad ripas paludum.

624 CONFERVA (*bulloſa*) filamentis aequalibus ramoſis bullas aëreas includens.
Habitat in aquis pigris et ſtagnantibus.

625 CONFERVA (*littoralis*) filamentis aequalibus ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis.
Habitat cum fucis.

626 BYSSVS (*ſaxatilis*) puluerulenta cinerea rupes operiens.
Habitat in ſaxis.

627 BYSSVS (*Flos aquae*) filamentis plumoſis natantibus.
Habitat in aquis, quae inde inter diu aeſtate vireſcunt.

628 BYSSVS (*velutina*) filamentoſa viridis.
Habitat in terra locis vmbroſis et abditis.

629 BYSSVS (*candelaris*) puluerulenta flaua lignis adnaſcens.
Habitat in corticibus arborum, parietibus tectis.

630 BYSSVS (*phosphorea*) lanuginoſa violacea lignis adnaſcens.
Habitat in lignis vetuſtis.

631 BYSSVS (*botryoides*) puluerulenta viridis.
Habitat in terra, vbi aquae ſtagnarunt, in ollis Hortulanorum et alibi frequens.

FVNGI.

632 Agaricvs *(piperatus)* cauleſcens, pileo planiuſculo lacteſcente margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis.
Germ. *Pfifferling.*
Habitat in ſyluis, inter Eldena et Diedrichshagen.

633 Agaricvs (*campeſtris*) ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis ruffis.
Germ. *Champignon.*
Habitat in pratis paſſim. *Auf der Straſſe in Neuenkirchen.* Reperitur Menſe Auguſto.

634 Agaricvs (*Chantarellus*) ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. Vulgo *Chanterelle.*
Habitat in pratis ſyluaticis. *Zu Hanshagen.*

635 Agaricvs (*delicioſus*) ſtipitatus, pileo teſtaceo, ſucco luteſcente.
Germ. *Reiſchen.*
Habitat in montoſis aſperibus ſyluaticis. Aliquoties tantum reperi Hanshagae ſcilicet et *zu Kleinzaſtrow.*

636 Agaricvs (*quercinus*) acaulis, lamellis labyrinthiformibus.
Germ. *Eichenſchwamm.*
Habitat in truncis aſſeribusque quercinis.

637 Agaricvs (*labyrinthicus*) acaulis coriaceus villoſus margine obtuſo, lamellis anaſtomoſantibus.

Germ.

Germ. *Baumſchwam.*
Habitat in truncis arborum, in primis Betulae.

638 Boletvs (*bouinus*) ſtipitatus, pileo glabro puluinato marginato, poris compoſitis acutis: porulis angulatis breuioribus.
Habitat in pratis et ſyluis menſe Auguſto.

639 Boletvs (*fomentarius*) acaulis puluinatus inaequalis obtuſus, poris teretibus aequalibus glaucis.
Germ. *Feuerſchwamm.*
Habitat in truncis et caudicibus Betulae.

640 Boletvs (*ſuberoſus*) acaulis puluinatus albus laeuis, poris acutis difformibus.
Habitat in truncis arborum rarior, in Betulis frequens.

641 Boletvs (*verſicolor*) acaulis, faſciis dicoloribus, poris albis.
Habitat ad truncos arborum antiquarum, nec non in aſſeribus et parietibus ligneis prope terram rarior.

642 Phallvs (*eſculentus*) pileo ouati, ſtipite nudo rugoſo.
Germ. *Murchel.*
Habitat in ſyluis antiquis. *Zu Grubenhagen.*

643 Elvela (*Mitra*) pileo deflexo adnato lobato difformi.
Germ. *Steinmurchel.*

Hab.

Habitat in truncis putridis, locisque ſucculentis vmbroſis ſyluarum.

644 Peziza (*lentifera*) campanulata lentifera.
Habitat in ſepibus et areis hortorum.

645 Peziza (*ſcutellata*) plana margine convexo piloſo.
Habitat in parietibus ligneis antiquis rariſſima. *Vor den Thoren zwiſchen den Gärten.*

646 Peziza (*punctata*) turbinata truncata, diſco punctato.
Habitat ſupra equorum ſtercoria. Vere tantum reperi.

647 Lycoperdon (*ſtellatum*) volua multiplici patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato.
Habitat in monticulo, *Fuchsberg* dicto.

648 Lycoperdon (*epiphyllum*) aggregatum paraſiticum, ore multifido lacero, puluere fuluo.
Habitat in dorſo foliorum Tuſſilaginis Farfarae rarius. *Im Eldnaer Holz.*

649 Lycoperdon (*epidendrum*) cortice farinaque purpurea.
Habitat in hortorum aſſeribus et parietibus antiquis.

650 Lycoperdon (*Bouiſta*) ſubrotundum lacero dehiſcens.

Germ.

Germ. *Boviſt.* Pharmac. *Crepitus Lupi.*
Habitat in collibus, campisque ſterilibus vbique.

651 MVCOR (*vnctuoſus*) vnctuoſus flauus.
Germanis.
Habitat in terra praegnante, et ad parietes frequens.

652 MVCOR (*Mucedo*) fugax ſtipitatus, capſula globoſa.
Germ. *Schimmel.*
Habitat in putridis.

653 MVCOR (*Eryſiphe*) albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus.
Germ. *Honigthau.*
Habitat in plantis variis.

I. INDEX.

I. INDEX GENERVM.

	No.
Acorus	185
Aconitum	287
Achillea	463
Acer	538
Acroſtichum	547
Adoxa	216
Aegopodium	166
Aethuſa	160
Agroſtis	38
Agroſtemma	241
Agrimonia	250
Agaricus	632
Aira	42
Aiuga	308
Alopecurus	34
Alchemilla	89
Alſine	170
Allium	177
Aliſma	200
Alyſſum	349
Anthoxanthum	19
Anchuſa	100
Anagallis	112
Angelica	155
Andromeda	220
Anemone	289
Antirrhinum	341
Anthyllis	382
Anthemis	461
Arundo	65
Arbutus	221
Arenaria	234
Arabis	359
Arctium	423
Artemiſia	437
Arnica	455
Aſperula	77
Aſclepias	132
Aſparagus	180
Aſtragalus	393
Aſter	450
Aſplenium	548
Atriplex	534
Auena	63

B

Ballota	323
Betonica	311
Bellis	456
Betula	497
Bidens	433
Boletus	638
Briza	52
Bromus	60
Braſſica	362
Bryonia	510

K Bryum

	No.
Bryum	562
Butomus	217
Bunias	366
Byſſus	626

C

Callitriche	2
Campanula	115
Carum	164
Caltha	307
Cardamine	350
Carduus	426
Carlina	432
Carex	489
Carpinus	506
Cannabis	522
Ceraſtium	244
Centaurea	465
Chenopodium	134
Chaerophyllum	161
Chryſoſplenium	224
Chelidonium	279
Chryſanthemum	457
Chara	612
Circaea	5
Cicuta	159
Cichorium	422
Clinopodium	326
Cnicus	431
Cornus	88

	No.
Conuoluulus	113
Conium	151
Conuallaria	181
Comarum	278
Corylus	507
Conſerua	624
Crataegus	258
Crepis	419
Cuſcuta	90
Cucubalus	231
Cynoſurus	54
Cynogloſſum	101

D.

Dactylis	53
Datura	121
Daucus	150
Delphinium	286
Dianthus	229
Draba	344
Droſera	174

E.

Echium	105
Elymus	69
Eluela	643
Epilobium	203
Equiſetum	540
Eriophorum	29
Eryngium	146

Erica

	No.		No.
Erica	208	Heſperis	358
Eryſimum	355	Hippuris	1
Eruum	389	Hieracium	413
Erigeron	445	Hordeum	70
Euphorbia	251	Holoſteum	72
Euphraſia	333	Hottonia	108
Eupatorium	435	Holcus	531
Euonymus	127	Humulus	523
F.		Hydrocotyle	147
Fagus	505	Hyoſcyamus	122
Feſtuca	55	Hyoſeris	420
Filago	468	Hypericum	402
Fragaria	270	Hydrocharis	529
Fraxinus	539	Hypnum	570
Fumaria	376	I.	
Fucus	617	Iaſione	471
G.		Iberis	342
Galium	78	Ilex	91
Galeopſis	318	Impatiens	476
Gentiana	143	Inula	452
Geum	276	Iris	23
Geranium	367	Iuniperus	530
Geniſta	380	Iungermannia	582
Glaux	131	Iuncus	186
Glechoma	314	L.	
Gnaphalium	441	Laſerpitium	153
H.		Lamium	315
Hedera	130	Lathraea	338
Herniaria	133	Lathyrus	383
Heracleum	154	Lactuca	408

	No.		No.
Lapſana	421	Medicago	401
Ledum	219	Mercurialis	527
Leonurus	325	Milium	37
Lepidium	345	Mnium	558
Leontodon	410	Monotropa	218
Lemna	484	Mucor	651
Liguſtrum	4	Myoſotis	97
Lithoſpermum	98	Myoſurus	176
Linum	173	Myagrum	343
Lichen	586	Myriophyllum	502
Lolium	67	N.	
Lonicera	118	Nepeta	310
Lotus	400	Nymphaea	283
Lycopſis	104	O.	
Lycopus	18	Oenanthe	157
Lyſimachia	109	Ononis	381
Lychnis	242	Ophrys	481
Lythrum	249	Origanum	327
Lycopodium	555	Ornithogalum	178
Lycoperdon	647	Ornithopus	392
M.		Orchis	477
Marrubium	324	Osmunda	545
Malua	373	Oxalis	240
Matricaria	459	P.	
Marchantia	583	Panicum	32
Melica	45	Paſtinaca	163
Menyanthes	107	Parnaſſia	171
Meſpilus	260	Paris	215
Mentha	312	Papauer	280
Melampyrum	335	Parietaria	533

Pedicularis

	No.
Pedicularis	339
Peziza	644
Phalaris	31
Phellandrium	158
Phleum	33
Phallus	642
Pinguicula	15
Pimpinella	165
Picris	405
Pinus	508
Plantago	83
Poa	46
Potamogeton	92
Polygonum	210
Potentilla	271
Polygala	378
Populus	524
Polypodium	551
Polytrichum	557
Primula	106
Prunus	254
Prunella	331
Prenanthes	409
Pteris	550
Pulmonaria	102
Pyrola	222
Pyrus	261
Q.	
Quercus	504

	No.
R.	
Ranunculus	293
Raphanus	365
Rhamnus	125
Rhinanthus	332
Ribes	128
Riccia	585
Roſa	264
Rubus	266
Rumex	193
S.	
Sanguiſorba	87
Sagina	96
Salſola	141
Sanicula	148
Sambucus	168
Saxiſraga	225
Sagittaria	503
Salix	511
Scirpus	24
Scabioſa	73
Sherardia	76
Scleranthus	227
Scutellaria	330
Scrophularia	348
Selinum	152
Sedum	238
Semperuiuum	253
Serratula	424
Senecio	448

	No.		No.
Serapias	483	Triglochin	198
Sium	156	Trientalis	202
Siſymbrium	351	Triſolium	394
Sinapis	363	Tragopogon	404
Solanum	123	Tremella	613
Sorbus	259	Turritis	360
Sonchus	406	Tuſſilago	446
Solidago	451	Typha	487
Spergula	247	U.	
Spiraea	263	Ulmus	142
Spartium	379	Ulua	621
Sparganium	488	Urtica	499
Sphagnum	556	Utricularia	16
Statice	172	V.	
Stellaria	232	Valeriana	20
Stratiotes	288	Vaccinium	205
Stachys	321	Valantia	532
Symphytum	133	Verbena	17
T.		Veronica	6
Tanacetum	436	Verbaſcum	119
Thalictrum	292	Viburnum	167
Thlaſpi	346	Vicia	386
Thymus	328	Viola	472
Tilia	285	Viſcum	521
Tordylium	149	X.	
Tormentilla	275	Xanthium.	501
Triticum	71		

II. INDEX
NOMINVM GERMANORVM.

	No.		No.
Abbiſs	73	*Bärentraube*	221
Abelen	524	*Beinholz*	4
Ackerzwiebeln	178	*Beinwelle*	103
- - *klein*	179	*Betonic*	311
- - *wurz*	185	*Beyfuſs*	427
- - *mohn*	280	*Bertram, wilder*	463
- - *ſempf*	363	*Bettlerläus*	501
- - *diſtel* 406.	425	*Biberklee*	107
Aggermennig	250	*Bilſenkraut*	122
Alandwurz	452	*Bixbeeren*	206
Angelick, wilde	155	*Bitterling*	211
Andorn, ſchwarz.	323	*Birnbaum, wilder*	261
- - *weiſſer*	324	*Birke*	497
Apoſtemkraut	74	*Bingelkraut*	588
Apfelbaum, wilder	262	*Blutkraut*	87
Aſpars	180	*Blumenbinſen*	217
Aeſchen-Faul	525	*Blauögſchen*	472
Aeſche	539	*Bockskraut*	139
Attich	168	- - *peterlein*	165
Augentroſt	333	*Bocksbart*	404
- - *brauner*	334	*Bornkreſſe*	351
B.		*Boſiſt*	650
Bachbungen	8	*Braunwurz* 120.	342
Baldrian, klein	20	*Bruchkraut*	133
- - *gemein*	21	*Brombeerſtrauch*	268
Baſilien, wild	329	*Brunellen*	331
Bährenklau, teutſch	154	*Brunnkreſſe*	351

	No.
Heinrich, ſtolzer	134
- - *guter*	134
Heidelbeeren	206
- - *Nelken*	230
- - *kraut*	208 209
Hederich	365
Herzgeſpann	325
Helmkraut	330
Hirſe, grasgrauicht.	32
Hindſchkraut	123
Hirzwurz	153
Hindläufte	422
Hirſchholder	167
Hinbeeren	266
Holunder	169
Hohlbeeren	266
- - *wurz*	376
Hopfen, wilder	523
Honigthau	653
Hundsblume	461
- - *Zunge*	101
- - *Violen*	473
Hungerblümchen	344
Huflattich	446
Hünerdarm	170
- - *biſs*	170
J.	
Jacobskraut	449
Je länger je lieber	123
Johanniskr.	228. 402
- - *blum*	335. 455

	No.
K.	
Kalwerkrop	161
- - *klein*	162
Kalmus	185
Kattenkäs	373
- - *pötgen*	442
Kamellen	460
- - *wilde*	462
Kirſchen	255
Klettendieſtel	423
Klebkraut	82
Kleberich	82
Klocken, wald	116
Klapperroſen	281
Klewer, weiſer	395
- - *rother*	396
- - *Wieſen*	396
- - *Berg*	398
- - *gelber*	399
- - *Hopfen*	401
Knoten Fuchsſchw.	35
Knoblauchskraut	357
Knütgen	362
Knabenkraut	477
- - *geflecktes*	479
- - *breitblätterich.*	480
Knirck	580
Kornblume	467
Königskerze	119
Körwell, wilder	164

Kratz-

	No.		No.
Kratzbeer	268	*M.*	
Krähenfuſs	301	*Mannstreu*	146
Krötengras, Knopf	186	- - *gemein*	146
- - *Buſch*	187	*Mausſchwanz*	167
- - *Glieder*	189	- - *Ohr*	413
- - *kriechendes*	190	*Mangold, Wald*	222
- - *ſtarriches*	191	*Mauerpfeffer*	239
- - *Wieſen*	192	- - *raute*	549
Krötendill	461	*Marienblum*	456
Kukuksblumen	242	*Marlblum*	456
Küchenſchellen	299	*Melte, weiſſe*	135
Kydick	363. 364	- - *grüne*	137
L.		- - *rothe*	136
Labkraut	80	- - *gelbe*	128
Lämmerlattig	22	- - *ſtinkende*	139
Läuskraut	340. 339	*Melden, wilde*	536
Lön	538	*Merzviolen*	472
Leopardenwurz	297	*Meyerkraut*	80
Leinkraut	341	- - *weiſs*	81
- - *dotter*	343	*Milchkraut*	131. 252
Lilienconvallien	181	- - *Dieſtel*	407
Linde	285	*Miſpel*	521
Linſen	389	*Milzkraut, gülden*	224
- - *Waſſer*	485	*Moosbeern*	207
Löwenfuſs	89	*Mohn, wilder*	282
Löffelkraut, Froſch	200	*Mundholz*	4
Lungenkraut	102	*Mutterwurz*	455
Luusbeeren	265	- - *kraut*	459
Lülch, perennirender	67	*Murchel*	632
- - *Taumel*	68	- - *Stein*	643

Münze-

	No.		No.
Münze, Katzen	310	*Pfeilkraut*	503
- - *Waſſer*	312	*Pfifferling*	632
- - *Acker*	313	*Pinnholz*	126
N.		*Pors*	219
Nachtſchatten	124	*Poſt*	219
Nägenknee	247	*Puttegnaden*	205
Neſſel, gold	320	*Q.*	
Nüſsgenſallat	22	*Quendel*	328
O.		*R.*	
Odermenning	250	*Rapünzel*	22
Ochſenzunge	100	*Raſenbinſen*	25
- - *wilde*	105	*Radel*	241
- - *blaue*	105	*Reinkohl*	421
Oegſchen, witt	290	- - *fahrn* 436.	464
- - *Geel*	291	- - *blumen*	441
Organ	327	*Reiſchen*	635
P.		*Rhabarber, wilde*	194
Paſternacken, wilde	163	*Ritterſporn*	286
Parnaſsgraſs	171	*Riedgraſs, klein*	489
Pappeln, Gänſe	373	- - *Fuchs*	490
- - *Roſs*	374	- - *dünnes*	491
- - *Haus*	374	- - *Sumpf*	492
- - *Roſen*	375	- - *Raſen*	493
- - *weiſſe*	524	- - *blaſigtes*	494
- - *ſchwarze*	526	- - *ſpitziges*	495
Peterſilie, wilde	160	- - *Rauhes*	496
Peſtilenzwurz	447	*Roſen, wilde*	264
Pfennigkraut 111.	346	*Ruchgraſs*	19
Pferſingkraut	212	*Ruhrkraut*	468
Pfaffenröhrlein	410	- - *Berg*	469

Ruhr-

	No.		No.
Ruhrkraut, Acker	470	*Schminkwurz*	104
S.	- -	*Schwalbenwurz*	132
Saamenkraut	92	*Schlüſſelblumen*	106
- - *flieſſend*	92	*Schmirgel*	134
- - *klar*	93	- - *kleiner*	138
- - *klein*	95	*Schierling*	151
Saukraut	124	- - *ächter*	159
- - *dieſtel*	425	- - *unächter*	158
Sauerklee	240	*Schleen*	257
Saurampfer, wilder	196	*Schleendorn*	257
- - *kleiner*	197	*Schellkraut*	279
Salzkraut	141	*Schartenkraut*	424
Sanickel	149	*Schaafsgarbe*	464
Sandlauch	177	*Schafruſs*	544
- - *blume*	237	*Schwamm-Eichen*	636
Schwertel, gelber	23	- - *Baum*	637
Schmielen, blaue	42	- - *Feuer*	639
- - *Raſen*	43	*Schimmel*	652
- - *graue*	44	*Seebinſen*	27
Schwingel, Schaaf	55	- - *blumen*	283
- - *rother*	56	- - *kohl*	366
- - *kriechender*	57	*Sinau*	89
- - *Wieſen*	58	*Siebenfingerkraut*	278
- - *Manna*	59	*Sonnenthau* 175.	174
Schwadengrütze	59	*Sophienkraut*	353
Schöngras, hangend,	45	*Spillbaum*	127
Schilfrohr	65	*Spindelbaum*	127
- - *Berg*	66	*Spargel*	180
Scherardtskraut	76	*Sperberbaum*	259
Schwarzwurz	103	*Springkraut*	476

No.
Stachelbeeren 129
Stauderich 140
Stachel 305
Stabwurz 427
Sternblum, Wald 232
233
- - *Frühjahrs* 2
- - *Herbſt* 3
- - *Waſſer* 450
Sternleberkraut 77
Stechpalmen 91
- - *Aepfel* 121
Steinſaame 98
- - *Hirſe* 98
- - *Saame, Acker* 99
Steinbrech, weiſſer 225
Stickelbeeren 129
Stinkkreſſe 345
Stiefmütterchen 475
Storchenſchn. gem. 367
- - *Wald* 368
- - *Wieſen* 369
- - *weicher* 371
- - *runder* 372
Strausgraſs, Acker 38
- - *rothes* 39
- - *braunes* 40
- - *Haar* 41
Strauſſigtes Fladder-graſs 37

No.
Sumpfbinſen 24
- - *Dünngraſs* 29
- - *klee* 107
- - *beern* 207
- - *violen* 474
Süſsholz, wild 393

T.

Tanne 509
Taubenkraut 17
Tauſendgüldenkr. 144
Taubneſſel, weiſſe 315
- - *rothe* 316
- - *blaue* 318
- - *bunte* 319
- - *gelbe* 320
Taub- todte Neſſel 319
- - *Heckenneſſel* 321
Teichbinſen 26
Teuffelsabbis 73
Teſchelkraut 347
Thurmkraut 360
- - *glatt* 360
- - *rauch* 361
Tormentillwurzel 275
Treſprocken 60
- - *acker* 61
- - *hoher* 62
Trempſen 467

U.

Ulmbaum 142

	No.		No.
V.		*Waſſerdoſten*	435
Vergiſs mein nicht	97	*Wallwurz*	103
Viehgraſswaſſer	46	*Wegerich*	83
- - *dreyblätterichtes*	47	- - *blad*	83
- - *fünfblättericht.*	48	- - *kleiner*	84
- - *Sommer*	49	- - *ſchmaler*	85
- - *Berg*	50	- - *See*	86
- - *Wald*	51	- - *Waſſer*	200
Vogelneſt	150. 482	*Weiderich, gelber*	109
- - *zung*	214	- - *Waſſer*	100
- - *kirſchen*	254. 256	- - *brauner*	249
- - *beern*	259	*Wegtritt*	213
- - *fuſs*	392	- - *graſs*	213
W.		*Wegkerze*	120
Waldbinſen	28	- - *dorn*	125
- - *meiſter*	77	- - *ſenf*	355
- - *ſtroh*	80	- - *wart*	432
- - *neſſel*	500	- - *ruhrkraut*	444
- - *meiſter, güld.*	532	*Weitzen, Queck*	71
Wacholderſtrauch	530	*Weiſswurz*	182
Waſſergauchheil	9	- - *klein*	183
- - *Andorn*	18	*Weiden, Zäh*	511
- - *viole*	108	- - *rothe Sprock*	512
- - *ſteinbrech*	157	- - *Sprock*	513
- - *ſchierling*	159	- - *Rhein*	514
Waſſerviolen	204	- - *gelbe Zäh*	514
- - *Pfeffer*	211	- - *Bruch*	516
- - *mümmelchen*	283	- - *Palm*	517
- - *roſen*	284	- - *Aems*	518
- - *Aloe*	283	- - *Korb*	518

	No.		No.
Weiden, weiſſe	520	*Wildheidenkorn*	214
- - *Silber*	520	*Wilder Senpf*	355
- - *Zäh*	520	*Wirbeldoſt*	326
Wermuth, Feld	432	*Wollkraut*	119
- - *See*	430. 439	*Wolfsbeer*	215
Wieſen Dünngraſs	30	- - *milch*	251. 252
- - *foenich*	33	- - *wurz*	297
- - *fuchsſchwanz*	34	*Wollwerley*	455
- - *knöpfe*	87	*Wokerblumen*	457
- - *rauthe*	292	*Wundkraut*	382
- - *kreſſe*	350	*Wüllkraut*	139
Winde, Zaun	114	*Z.*	
- - *Acker*	113	*Zahnwurz*	338
- - *kleine*	113	*Zaunreiſs*	82
- - *Wald*	118	- - *rübe*	510
Wintergrün	130	*Zaunklocken*	114
Wicken	383	*Zweyblatt*	481
- - *Zaun*	387	*Zweyzahn*	433

III. INDEX

NOMINVM PHARMACOPOEORVM

	No.
Abies	509
Abſinthium vulg.	440
Acorus paluſtris	23
Acetoſella	240
Acacia	257
Agrimonia	250
Alchemilla	89
Alliaria	357
Angelica ſylueſtris	155
Anſerina	271
Ariſtolochia, ſabacea	367
Artemiſia rubra	437
Arnica	455
Aſparagus	180
Atriplex ſylueſtris	135
Auricula Iudae	615
B.	
Barba hirci	404
Bardana	423
Beccabunga	8
Betonica	311
Bellis minor	456
Bellis pratenſis	457
Betula	497
Bonus Henricus	134
Bryonia	510
Bugloſſum	100
Burſa paſtoris	347
C.	
Carvi	164
Calamus vulgaris	185
Caryophyllata	267
Cardiaca	325
Cannabis	522
Centaurium minus	144
Chelidonium majus	279
- - minus	296
Chamomilla	460
Cicuta	159
Cichoreum	422
Cicutaria	161
Conſolida major	103
- - media	308
- - regalis	286
Cotula foetida	461
Corylus	507

	No.		No.
Serpyllum	328	**U.**	
Sigillum Salomonis	182	Ulmaria	263
Sinapi	364	Urtica maior	500
Solanum	124	Usnea	610
Sorbus aucuparia	259	Uua vrſi	221
Sophia	353	**V.**	
Spina ceruina	125		
Stoechas citrina	441	Valeriana minor	21
T.		Veronica	1
		Verbena	17
Taraxacum	410	Verbaſcum	119
Tanacetum	436	- - radix	120
Telephium	238	Virga aurea	451
Thlaſpi	346	Viola violaria	472
Tilia	285	Viſcum	521
Tormentilla	275	Vuluaria	139
Trifolium aquatic.	107	**X.**	
- - album	395		
Tuſſilago	446	Xanthium	501

T A N T V M.

CHRISTIANI LUDOV.
WILLICH,

MEDICI NORDHEIMENSIS,

ILLVSTRATIONES QVAEDAM BOTANICAE

CELEBERRIMO VIRO

NICOL. IOS. JACQVIN

DICATAE,

GOTTINGAE

SVMT. VIDVAE ABRAMI VANDENHOECK

cIↃ IↃ CCLXVI.

Haec Tibi in primis Jacquin Celeberrime dicaui, cum multa ex Tuis muneribus nata ſint, gratumque animum etiam publice profiteri fas ſit. Scripſi Nordheim M. Ianuario. a. 1766.

I.

Lycopodium clauatum LINN. ſpec. 2. p. 1564. n. 4. ſpicas non ſemper geminas ſed ſimplicem interdum habet, abunde diuerſum a *Lycopodio annotino* L. ſeu *Lycopodio caule erecto, ſpica glabra terminato* HALL. enum. helv. p. 93. n. 2. Hoc ipſum Lyc. annotinum folia frequenter habet quaterna, raro quina, ſuperiora longe plerumque verticillata, inferiora ſparſa.

II.

Taxus RVELL. De flore femina dixi in *Obſeruat.* a. 1762. editis n. III. Nunc de mare aliqua addo. Ex alis

foliorum prodeunt flores ſinguli ex ſingulis alis pedunculo lineari inſidentes. Calyx gemmae ſimilis ex ſquamis circiter ſeptem, quorum inferiores minores, duriores; ſuperiores maiores, teneriores. Hae ſquamae continent ſtilum firmum ſquamis paulo longiorem, in fine diuiſum in antheras circiter decem arcte congeſtas. Quaelibet anthera loculos continet plerumque quinque inferne aperiendos. Hinc ante excuſſionem ſpermatis anthera ex quinque circiter globulis compoſita quaſi videtur, ſed eo excuſſo loculi inferne adparent, ſuperficies autem ſuperior magis plana fit, & eam figuram quam TOVRNEFORTIVS *Inſtit. tab.* 362. pinxit, ſatis bene exprimit. Ceterum foliorum petiolus cauli arctiſſime per non breue ſpatium adglutinatur, foliaceus totus, a caule vero ſecedens anguſtatur, mox vero iterum lateſcit in folium.

III.

☞ Vidi olim Pini foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli GMEL. *ſibir.* I. p. 179. n. 30. nuces omnino magnas & ci-

nereas.

nereas, ſed dein ex ipſa Sibiria accepi nuces minores, rufas; vt ergo hoc diſcrimen arborem ſibiricam & helueticam ſeiungere non poſſit.

IV.

Salicem procumbentem foliis ouato-lanceolatis ſubtus ſericeis HALL. *h. gott.* p. 8. repetitam in *Emendat.* III. p. 33. n. 94. duce PRAECEPTORE in torfaceis Cellenſibus abunde legi, cum flore dein miſſam ab expertiſſimo in aula Hannouerana pharmacopoeo Dn. ANDREE. Dum vero plantam florentem cum icone *Salicis humilis repentis* LOB. *icon.* II. p. 138. *aduerſar.* p. 423. confero, tunc omnino vtraque differre videtur. *Lobelianae* enim julus florens ramos terminat, paucis capſulis inſtructus, quatuor & quinque. Cellenſis vero juli laterales ſunt, capſulis numeroſiſſimis 30 vel 40 inſtructi. LOBELIVS dicit, ſuam plantam in montibus Sabaudiae, Lugdunenſibus & Veganiis naſci, noſtra in planitie torfoſa prouenit. Et valde ſuſpicor plantam LOBELII eſſe Salicem foliis laeuibus ouatis integerrimis, julis paucifloris HALL.

emendat. III. p. 34. n. 97. quo etiam in *enumerat. helvet.* p. 154. n. 13. relatam eſſe video. Confirmor quando iconem CAMERARIANAM *Salicis puſillae Epit.* p. 108. cum LOBELIANA confero. Quod ſi vero dicas in neutra icone venas parallelas pictas eſſe, quales ſunt in ſerpillifolia ſiue ſalice foliis laeuibus &c. HALLERI, reſpondeo, nec ſemper in meis certe exemplis neruos parallelos in omnibus foliis incedere, etſi id frequentius obtineat. *Salicem* etiam *pumilam folio vtrinque glabro* I. B. I. part. 2. p. 217. cum LOBELIANA conjungendam eſſe ſuadent earum icones collatae, adparet enim facile Bauhinianam eſſe imitationem Lobelianae, ſed aliud inde dubium circa conjunctionem hujus cum ſerpillifolia oritur, cum Bauhinus ſuae plantae folia vnciam longa adſignet, folia vero vtrinque glabra, plantam Bauhinianam a LINNAEANA *fuſca* retinere videntur.

V.

Lapathum aruenſe ſubhirſutum, folio retuſo, caule longius brachiato, capſula ſeminis crenata TILL. *piſ.* de quo in

in *Obſeruat.* a. 1762. n. XVII. dixi, omnino idem eſt cum Lapatho foliis ſupra petiolum emarginatis HALL. *emendat.* p. 127. n. 20. *Enumerat. helv.* p. 172. n. 14 & cum *Rumice pulchro* LINN. *ſpec.* vt & plantis a Dn. de HALLER miſſis, cum hortenſibus a me cultis, collatis, manifeſte video. Ex eodem enim ſemine natae ſunt plantae foliis radicalibus ſupra petiolum emarginatis ſiue panduriformibus, & folia integra. Etiam plantae cui priori anno folia radicalia integra fuerant, ſequenti emarginata protulerunt. Icon I. Bauhini 2. 988. pro varietate emarginata quoad folia bona eſt, ſed peſſima ratione caulis, quem ſimplicem pro planta adulta pingit, & palmarem eſſe dicit, cum & in ſpontaneis exemplis inſigniter brachiatus ſit, & a ſeſquipede ad cubitum altus.

VI.

Atriplex littoralis LINNAEI, omnino differt ab Atriplice ſylv. anguſto oblongo folio C. B. Folia tamen non ſunt perpetuo integerrima, verum interdum rariter dentata, ſineque recuruo; colore ſemper glauco; caule ſulcato.

VII.

Salſola Kali LINN. *ſpec.* 2. p. 322. n. 1. videtur eſſe eadem cum *Salſola Trago ibid.* n. 2. ita quidem vt haec ſit planta junior, illa autem adulta, calyce tunc margine foliaceo albicante aucto, omnibusque plantae partibus durioribus factis. Fructus autem ſuperius planus eſt, balſamo ibi pauco luteolo tectus. Semen vnicum cochleae inſtar ſpirale, cis finem in duos ramos aeque longos diuiditur.

VIII.

Atriplex orientalis, fructus aculeatus, flore pulchro DILL. *h. elth.* p. 47. t. 40. f. 47. ſiue *Atraphaxis ſpinoſa* L. Annon haec planta aliquando ſine ſpinis occurrit. Certe in horto Gottingenſi video arbuſculam, picturae & deſcriptioni DILLENII per omnia ſimilem, ſed absque ſpinis. Dein quaero annon haec planta non ſpinoſa, ſiue ſit ſpecies ſiue varietas, genere ſeparari debeat ab *Atraphax. vndulata* LINN. diuerſa Calyce monophyllo ad baſin diuiſo in ſegmenta quatuor aequalia, defectu petalorum, ſtilo bifido. Et porro annon *Atra-*

Atraphaxis ſpinoſa L. cum *Lapatho daurico montano fruticante, ramis late ſparſis* Amm. *ruth.* n. 227. ſiue *Polygono fruticante* L. genere, a Polygono diuerſo, conjungi debeat. Omnes enim notae & in Polygono fruticante & in Lapatho daurico pleniſſime conſentiunt, ſi ſolum partium numerum & figuram ſeminis excipias. In vtraque enim planta calyx diphyllus exiguus, foliolis deflexis. Petala cordiformia calyce majora longitudinaliter deorſum vel extrorſum conuoluta, primum patentia, dein erecta magis, per margines ſinuata & criſpa. Filamentorum baſes latae in circulum quaſi conjunctae. reliqua pars capillaris longitudine calycis. Antherae ſubrotundae. Stilus nullus. Stigmata capitata. Pericarpium nullum; ſed corolla perſiſtens, erecta, ſemen includit, non calyx, qui tunc reflectitur. Habet vero Atraphaxis ſpinoſa duo tantum petala, ſtamina ſex, ſtigmata duo, fructum conpreſſum. Polygonum fruticans autem petala tria, ſtamina octo, ſtigmata tria, fructum triquetrum.

VIIII.

Fagopyrum ſcandens, altiſſimum dumetorum, ſeminibus tribus alis pellucidis cinctis RVPP. *jen.* pag. 99. quod circa Nordheim naſcitur, & quale ex Heluetia habeo, lobos baſeos foliorum raro rotundatos habet, ſed plerumque ſubacuminatos. Caulis vtique ſtriatus, ſtriis plerumque manifeſtis, raro obſcuris. In origine petiolorum eminentia obſcura eſt, quae foueam habet manifeſtam. An ergo *Polygonum dumetorum* & *ſcandens* L. ſatis diſtincta & recte determinata ſunt?

X.

Gramen loliaceum ſpica longiore ſeu Lolium Dioſcoridis C. B. *theatr.* p.121. Majora hujus graminis ſpecimina, praeter calycem exteriorem, omnibus dictum, & ſpiculis ſingulis fere aequalem aut paulo longiorem, in qualibet ſpicula ex inferioribus calycem etiam habet interiorem, latum, lineae longitudine, margine membranaceo inſtructum, inciſurae ſcapi arcte adpreſſum, ſpiculae mediae binos habent huiusmodi calyces interiores ſed anguſtiores; ſpiculis ſupremis

premis hic interior calyx omnino deeſt; & in minoribus hujus plantae ſpeciminibus vel plane nullus, vel admodum exiguus.

XI.

Milium paradoxum LINN. a Dn. de SCOPOLI miſſum, tripedale eſt. Panicula viridis, ſummitate glumarum calycinarum excepta, quae albent. Sed an re vera ſemen nudum, apice ariſtam emittens, annon haec de corollae valuula exteriore dicenda?

XII.

Gramen foliis junceis oblongis radice alba C. B. eſt forte ſpecimen adultum *Graminis foliolis junceis radice jubata* C. B. ſiue *Airae caneſcentis* LINN. & video Cl. HOFERVM cum planta LINNAEI conjungere in *Act. helv.* II. p. 149. n. 3.

XIII.

Phleum nodoſum LINN. & *Phleum pratenſe* LINN. an re vera differunt. Video enim plantas I. radice non bulboſa, caule erecto, foliis pedalibus, ſpica quinque vnciarum cylindrica, baſi ſteri-

ſterili. 2. culmo inferius bulboſo, adſcendente, foliis biuncialibus, ſpica cylindrica biunciali vndique fertili. 3. vti n. 1. ſed ſpica tantum ſesqui & biunciali, baſi ſterili. 4. vti n. 1. baſi fertili.

XIV.

Linagroſtis ſeu Eriophorum alpinum LINNAEI omnino diuerſum eſt a *vaginato.* Sed annon in *alpino* caulis aeque vaginatus eſt. Certe in ſpeciminibus meis *alpini* a Cel. SCOPOLI miſſis, de quibus monet, quod in paludibus depreſſis longe ab alpibus creſcant, caulis pars inferior vaginas habet manifeſtas, quales SCHEVCHZERVS in *prodr.* tab. VIII. pinxit, & in *Agroſt.* p. 305. deſcripſit. In *vaginato* dum adhuc floret, vaginae totum pene culmum occupant, quem elongatum non ſequuntur. Annon idem obtinet in *alpino?* Supereſt vt inquiratur an *vaginati* duae ſint ſpecies vel varietates caule foliisque teretibus & iisdem triquetris.

XV.

Iuncus ſpicis multifloris in ala ſeſſilibus, petiolis ſquamoſis HALL. *emendat.*

III. n. 167. *Iuncoides alpinum floſculis junci glomeratis atrofuſcis* SCH. *agr.* p. 323. l. 7. f. 9. Etſi quam optime hunc dudum deſcripſerit SCHEVCHZERVS & denuo a. 1762. HALLERVS, video tamen etiam nunc pro varietate *junci laeuis panicula ſparſa majoris* C. B. ſeu *junci effuſi* L. haberi, cum quo tamen ne comparari quidem poſſe Dn. de HALLER dicit. Si tamen lubet comparationem inſtituere, tunc videbis in *effuſo* pedunculos florales tenues numeroſos ramoſosque ex culmi latere ſubito egredi, ſed in atro-fuſco vnicus pedunculus craſſior, qui pro culmo continuato haberi poteſt, ſecedit, vncialis forte, in folio (niſi id potius pro culmo continuato habeas) diu latens. Cui reliquas notas diuerſitatis ex SCHEVCHZERO & HALLERO facile addes, forte etiam ex JACQVINO. Videtur enim Hujus *juncus folio ſubulato; capitulo ſubquadrifloro, terminali: fl. vindob.* p. 237. T. 4. f. 2. ab atrofuſco non differre.

XVI.

Iuncus foliis mollioribus carinatis, panicula multiplici & ramoſa HALL. *enumer.*

mer. helv. p. 254. n. 10. *Obſeruatt. meae* 1762. n. 27. Hunc Dn. de LINNE omnino dudum recenſuit in *fl. ſuec.* 1. n. 284. & in *Spec.* 1. & 2. *bulboſi* nomine. JACQVINVS cum nomine *compreſſi* egregie deſcripſit in *fl. vindob.* p. 235. & in *Obſerv.* I. p. 47. cum *bulboſo* coniunxit. Folium florale non eſt longitudine corymbi, ſed longius. Nullus adeſt corymbus communis, ſed ſemper duo adſunt corymbi, ita facti vti JACQVIN eos deſcribit. Cur vero Dn. de LINNE *Gramen. junceum foliis & ſpica junci* C. B. quod *junco ſquarroſo* addiderat; ad *bulboſum* repetit?

XVII.

Si quidem *Typham paluſtrem majorem* C. B. a. *Typha paluſtri claua gracili* Ejusd. ſeparare placet, & omnino recte ſeparari puto, tunc etiam tertia C. BAVHINI *typha*, nempe *paluſtris minor* ſpecie ſeparari debet. Sed in notas diſcriminis in omnibus vberius inquirendum. *Typhas paluſtres claua gracili* coram habeo, vbi ſpica maſcula & feminea aeque adproximatae ſunt ac in majore, etſi alias per ſesquiunciam ſint

remo-

remotae. *Minoris* ſpecimina mea, quae ex Heluetia habeo, partem marem a femina per duas ferę lineas remotam habent, & vniuerſa planta ſesquipedem forte altitudine adaequat, non vero ſemper claua ouata eſt, interdum cylindrica vncialis.

XVIII.

Commelina radice anacampſerotidis DILL. *elth.* p. 94. l. 79. f. 90. Pedunculus non eſt teres, ſed latus ejus caulem reſpiciens, planum, latus vero a caule auerſum, conuexum ęſt. Inuolucrum eſt cordatum, carinatum & conplicatum, in quo ſtriae longitudinales transverſalibus longe manifeſtiores ſunt.

XVIIII.

Commelina africana L. Non intra omnem vaginam exteriorem, alia eſt minima, ſed tantum intra eas, intra quas ramus oritur, tunc enim initium rami alia vagina circumdatur, quae in folium non producitur, ſed in vagina exteriore latet, iſta non multa breuior; Folia autem quae nullos ramos ſuſtinent, altera iſta vagina deſtituuntur.

Inuolucrum eſt cordatum, compreſſum, neruis longitudinalibus, nullis reticulatis, inſtructum.

XX.

Allium vmbellatum, foliis fiſtuloſis, compreſſis, radice obducta reticulo HALL. *comm. gott.* T. II. radicem ſeneſcentem lignoſam habet, recta in terram deſcendentem.

XXI.

Synonyma ni fallor & ideo a botanicis colliguntur, vt plantae inde certius cognoſcantur & lector certus ſit plantam quam coram habuit Autor, eſſe eamdem cum iſtius Autoris planta cuius ſynonymon citatum eſt. Ergo ſynonyma non obiter ſunt adſcribenda. Ergo *ſcorodopraſum latifolium ſpontaneum italicum floribus dilute purpureis odoratis* MICH. vel ab *Ampelopraſo* vel à *rotundo* ſeparandum erit. Ergo *Allium montanum capite rotundo* C. B. vel a *rotundo* vel a *ſphaerocephalo* remouendum. Ergo *Allium montanum bicorne latifolium flore purpuraſcente* C. B. vel ab *arenario* vel a *ſcorodopraſo* remouendum.

dum. Porro *Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſuauerubente ſphaerico, non bulbifero, radice laterali* HALL. *de All. edit.* I. p. 22. n. 8. eſt ipſiſſimum *Allium ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, ſpica ſphaerica non bulbifera ſuauerubente* HALL. *de All. edit.* 2. p. 353. n. 10. nec aliter vnquam docuit Dn. de HALLER; Dn. de LINNE tamen prius cum deſcendente iungit, poſterius vero cum *ſphaerocephalo.*

XXII.

Thalictrum foliis decompoſitis: pinnis ſeſſilibus linearibus ſulcatis rugoſis: marginibus reflexis SCOPOLI *fl. carniol.* p. 554. n. 4. Plantam ab ipſo Cl. SCOPOLI accepi, & cum *Thalictro foliis lanceolato-linearibus integerrimis* ZINN. *h. gott.* p. 118. contuli, & valde ſuſpicor, cum videam hortenſem cum germinibus ſeptem & octo habere caulem ſulcatum angulis rufeſcentem, foliaque rugoſa marginibus reuolutis, ſaepe valde anguſta & plerumque integerrima, LINNAEVM vtramque recte coniunxiſſe, & forte vtraque vna cum *lucido*, tandem in *flauum* degenerat, quod vlti-

mum foliis varia admodum latitudine ludens coram habeo.

XXIII.

Coryophyllata virginiana albo flore minore, radice inodora HERM. *Geum virginianum* LINN. *ſpec.* 2. p. 716. n. 1. Folia radicalia interdum vnicum par pinnarum habent, interdum duo paria, Folia caulina ternata, in origine auriculata, auriculis dentatis. Petala alba, calyci aequalia, aut parum maiora, nunquam in meis breuiora. Calyx bis 5fidus, ſegmentis nempe quinque maioribus & quinque valde exiguis. Pedunculi verſus florem parum incraſſati. Semina ſuperne manifeſte piloſa.

XXIV.

Malua peruuiana LINN. *ſpec.* 1. p. 688. n. 4. Pili in caule breues, rarius gemini, & plures ex eodem puncto. Folia quinquelobata, plicata, glaberrima, venoſa, inaequaliter dentata, marginibus ſubfuſcis. Stipulae baſi lata, fine lanceolato. Pedunculus axillaris nudus, longitudine folii. Spica ſecunda, interdum ramoſa. Corolla calyce mo-

modice maior, purpurea. Semina exaſperata. Calyces interdum ſeſſiles, interdum pedicellati, punctati ceterum & venoſi.

XXV.

Saxifragia foliorum margine ciliari, floribus luteis maculoſis HALL. *enumerat.* p. 399. n. 1. *emendat.* I. n. 97. & V. n. 31. *Saxifraga autumnalis* LINN. *ſpec.* I. p. 402. n. 16. Hanc plantam a *Saxifraga petalis latiſſimis luteis lineatis* HALL. *enum.* n. 2. *Saxifraga* hirculo L. *ſpec.* 1. n. 18. abunde diſtinctam eſſe, nunc nullum dubium eſt. Sed adhuc ſub iudice lis eſt, an planta HALLERI *enum.* n. 1. ſiue *autumnalis* LINNAEI & *aizoidès* EIVSD. n. 16. re vera differant. HALLERVS ſuſpicatur non differre, idem manifeſto facit JACQVINVS *fl. vindob.* p. 240. Dicit enim *ſedum minus VI. ſiue alpinum I.* CLVSII p. LX. eſſe *autumnalem* LINNAEI, idemque ſynonymon CLVSIANVM HALLERVS ad ſuam *primam* refert, & ſubiungit porro JACQVINVS coniecturam, *autumnalem* L. & *aizoidem* vnam eſſe eamdemque plantam. *Saxifragae*

autem 2dae HALLERI ſiue *Hirculi* L. nullam iniecit mentionem. Etſi vero Cl. SEGVIER ſubpl. p. 200. *Sedum alpinum flore pallido* C. B. ſynonymum nempe *aizoidis*, ab *autumnali* diuerſum in Baldo non repererit, forte tamen reperient ILL. CRANZIVS aut Dn. de SCOPOLI plantam in ſuis alpibus, plantam foliis ſedo minori luteo folio acuto C. B. ſiue Triquemadame, ſimiliorem, qualia CLVSIVS poſtulat. Etſi enim tunc *ſ. autumnalis* in MAGNI VIRI operibus deſideretur, tolerabile tamen id eſt, cum videamus plantas etiam vulgatiores interdum a diligentiſſimis viris & a CLVSIO praeteruiſas eſſe e. g. *Trifolium fragiferum friſicum*, vulgatiſſimam plantam, quam demum in Curis poſterioribus a DORTMANNO habet. Et praeterito anno poſt tot aliorum excurſiones *Ranunculum hederaceum* L. Gottingae demum reperit Cl. RÜLINGIVS.

XXVI.

Et omnino Cel. SCOPOLI *Saxifragae trichodis* nomine plantam miſit *autumnali* multum ſimilem, diuerſam tamen,

men, quantum in ſiccis exemplis video, foliorum initiis anguſtioribus & quaſi petiolatis, forte neruoſis, floribus paulo anguſtioribus, petalis, ni fallor, lineatis. Cum figura Sedi VI. CLVSII aliqua habet communia, alia tamen diuerſa. Inter Saxifragas, quas numeroſas a Dn. de HALLER accepi, non adeſt. Et in hac *trichode* & in *autumnali*, qualem a Dn. de HALLER accepi, folia inferiora vbique magis adgregata ſunt, quam ſuperiora, quae magis remota.

XXVII.

Linum perenne, foliis lanceolatis, argute mucronatis, calyce mutico HALL. *enum. helv.* p. 371. n. 2. folia villis glanduloſis pubeſcentia non habet. De alia ergo ſpecie loquitur ILL. SCOPOLI *fl. carniol.* p. 509. n. 3. & absque dubio. *Linum ſylueſtre I. latifolium* CLVSII *hiſt.* p. 317. ſiue *hirſutum* LINNAEI intelligit.

XXVIII.

Silene ſylueſtris ſexta CLVS. *hiſt.* p. 289. ſq. Hanc plantam ad Silenem co-

nicam pertinere ſuſpicatur Cel. JACQVINVS. Sed quaero annon icon CLVSII forte ad *luſitanicam ſtellato flore* DILL. *elth.* p. 420. ob habitum & petala ſerrata pertineat, deſcriptio autem, ob colorem floris, ad *Silenem 5 vulnera L.*

XXIX.

Si quidem *Lychnis coronaria Dioſcoridis ſatiua* C. B. & *Lychnis vmbellifera montana heluetica.* ZAN. re vera differunt, in alia nota, quam quidem in petalis emarginatis vel integris diſcrimen erit ponendum. Nam *ſatiua* C. B. ſiue *coronaria* LINN. vtique petala habet leuiter emarginata, qualia BARRELIER pingit in *icone* 1006 & Dn. de HALLER deſcribit in *enumerat.* p. 376. n. I. & huic calyces, antequam corollam excludunt, ſeſſiles ſunt, florentes vero pedunculum habent ſesquiuncialem, & talis eſt, ni fallor, quae nuperis temporibus in Heluetia lecta eſt, certe ego non aliam ex ea regione accepi. ZANONI autem plantam ſuam perfecte vmbelliferam pingit, floribus omnibus ſeſſilibus, petalis magis emarginatis;

ginatis; cum qua IVSSIAEVS coniungit Lychnidem coronatam vmbelliferam alpinam flore purpureo BARR. *ic.* 1005. quae in icone iterum perfecte vmbellifera eſt, ſed floribus longe pedunculatis, & plane non vel parum emarginatis.

XXX.

Viſcago foliis anguſtiſſimis recuruis HALL. *Emendat.* I. n. 85. *enum. helv.* p. 380. n. 5. Dn. de HALLER ſuae plantae ſubiungit ſynonymon *Lychnis alpina foliis anguſtis reflexis petalis quadripartitis* SEGV. *ſubpl.* p. 186. t. 5. f. 1. Et idem SEGVIERI nomen Dn. de SCOPOLI ſubiungit ſuae *Lychnidi floribus trigynis, petalis quadrilobis, foliis linearibus.* Fl. *carniol.* p. 504. n. 7. Sed dum plantam ab Vtroque VIRO miſſam confero, diuerſitas mihi videtur ſubeſſe. Planta enim HALLERI admodum tenera eſt, foliis ſemilineam latis, plerumque curuatis, vel certe ad angulos recto propiores a caule diſtantibus. SCOPOLIANA autem planta cum paruitate ſua robur tamen habet & in caule & in foliis, quae duplo latiora ſunt, an-

gulos acutos cum caule faciunt, ſummis exceptis, quae ad angulum recto viciniorem recedunt & curuantur. An HALLERI & SCOPOLIANA planta auriculas habent? Certe mentionem earum non injiciunt, nec in ſiccis ſpeciminibus eas detegere valeo. Planta SEGVIERII iis inſtructa eſt. Dn. de SCOPOLI plantae ſuae ad me miſſae adſcripſit nomen *Silenes quadrifidae* LINN. *ſyſt. nat.* X. p. 1032. qui habet in ſpec. 1. & 2. ſynonymon *Caryophylli minimi humilioris alterius exotici flore candido amoeno* LOB. *ic.* p. 445. quae icon apud CLVSIVM exſtat cum nomine *Lychnidis ſylueſtris III. pannon.* p. 333. ſiue *Lychnidis ſylueſtris X.* EIVSD. *hiſt.* p. 291. & hae icones auriculas habent & plantae SCOPOLIANAE ſimiliores ſunt, quam quidem HALLERIANAE.

XXXI.

Poſtquam Caryophyllum ſylueſtrem ſecundum CLVSII *hiſt.* p. 282. ex Auſtria obtinui, & cum *Tunica petalis ſerratis in fauce lanuginoſis* HALL. *enum.* p. 382. n. 6. *Excerpt. helv. & ital. litt.*

T. I.

T. I. p. 154. n. 89. contuli, facile vidi, nomen CLVSIANVM ab HALLERI planta ad *Dianthum alpinum* LINNAEI reuocandum eſſe.

XXXII.

Poſtquam obſeruationes DNI DE HALLER de *Alſine altiſſima nemorum & aquatica* in *Emendat.* I. n. 80-83. & IV. n. 31. legi, ipſiusque altiſſimae nemorum ſpecimina ab OPTIMO PRAECEPTORE accepi, facile ſeparo vtramque plantam. Confirmanda nunc ſupereſt *Stellaria dichotoma* LINNAEI, & a vicinis certius ſeparanda.

XXXIII.

Myoſotis apetala. Myoſotidis foliis ouatis acuminatis, flore calyci aequali varietas apetala in horto nata HALL. *h. gott.* 2. p. 157. Hanc & in meo hortulo ſpontaneam reperio. Caulis vel ſimplex, tuncque optime eam exprimit *Myoſotis aruenſis hirſuta minor.* VAILL. *bot.* t. 30. f. 2. vel ramoſus brachiatus. Folia pene ouata, viridia, hirſuta, non viſcida. Petala nulla. Stamina tantum quinque, antheris effoetis. Tubae

tres & quinque exiguae, vt tamen numerus poſterior naturalis eſſe videatur. Capſulae oblongae fine paulum incuruo decemfido. An ſit varietas, & cuiusnam ſpeciei, hactenus non dixerim.

XXXIV.

Myoſotis exigua pentaſteman HALL. *enum. helv.* p. 384. n. 5. *h. gott.* 2. p. 157. Caulis ex radice plerumque vnicus ſimplex, vncialis, & ſeſquiuncialis, raro plures, ſed ii quoque ſimplices. Ex ſummo vero caule plures egrediuntur pedunculi per aetatem ramoſi. Quando vnicus adeſt caulis tunc is ſemper erectus eſt, quando plures, tunc medii erecti ſunt, reliqui decumbunt. Stamina tantum quinque fertilia, nulla abortiua. Tubae certo quinque, exiguae, vt lentem adhibeas. Deſcriptio *Myoſotidis hirſutae minoris* TOVRN. *aut. de par.* p. 120. egregie noſtram plantam delineat, ſi numerum tubarum excipias, quem ternum facit TOVRNEFORTIVS. *Myoſotidem* autem *aruenſem hirſutam minorem* VAILL. *bot* t. 30. f. 2. noſtram eſſe plantam, dubito, cum VAILLANTII icon nimis magna ſit,

nec

nec is petala adpinxerit, quare eam pro *Myoſ. apetala* numero praecedente deſcriptam habeo. Neque ob numerum filamentorum poteſt eſſe *Ceraſtium ſemidecandrum* LINN. nec *pentandrum* EIVSD. ob petala in noſtro emarginata.

XXXV.

Paris RVPP. Etiam filamenta ſtaminum perſiſtunt & verſus pedunculum reflectuntur, eorumque initium latiuſculum tunc incraſſatum eſt & coloratum. Bacca, quam coram habeo, perfecte matura, globus eſt, ſuperne & inferne conpreſſus, non tetragonus, germinis ſulcis penitus obliteratis.

XXXVI.

Vaccinium vliginoſum L. Neque ego vlla in foliis aut petiolis cilia reperire potui, quae in *Arbuto alpina* L. manifeſta ſunt CLVSIO dicta.

XXXVII.

Ad *Pimpinellam ſaxifragam* LINNAEVS in *ſpec.* 2. p. 378. n. I. E. refert *Pimpinellam ſaxifragam tenuifoliam* C. B. ſed cum BAVHINVS ſuae plantae

pe-

peculiarem locum natalem adſignet, lacum nempe Geneuenſem, addatque ſe ſemen non vidiſſe, vix probabile eſt illum de vulgatiſſima planta loqui potuiſſe; & Ipſe LINNAEVS in eodem opere p. 374. n. 11. eamdem *Pimpinellam tenuifoliam* C. B. ad *Seſeli ſaxifragum* refert. HALLERVS in *Emendat.* I. n, 114. ſuſpicatur eſſe ſuum *Seſeli foliis linearibus triplicato-pinnatis*, *caule vaginoſo*, quod cum nomine *Seſeli annui* LINN. a JACQVINO miſſum eſt. Quando vero C. BAVHINVS ſuae plantae adſignat folia in tenues primum, dein pene capillares partes diuiſa, in HALLERIANA autem foliola omnia vbiuis aeque lata ſint, tunc etiam ab hac differre videtur.

XXXVIII.

Etſi vero Dn. de LINNE, ſynonymon TOVRNEFORTIANVM, quod Dn. de HALLER ad *Seſeli* priore numero ex *Emend.* I. n. 114. citatum refert, in *ſpec.* 2. p. 372. n. 3. cum alia planta coniungat, fide tamen ILL. JACQVINI Seſeli hoc HALLERI & *annuum*. L. coniunxi. An vero *Foenicu-*

lum

lum ſylueſtre annuum tragoſelini odore, vmbella alba VAILL. *bot.* t. 9. f. 4. huc referri debeat, parumper dubito, non quidem ideo, quod VAILLANTIVS vnum ramum pinxerit ramoſum, huiusmodi enim exemplar ex Heluetia coram habeo, cum tamen reliqua ramos habeant ſimplices; ſed dubium mouent foliola quae VAILLANTIVS nimis lata & breuia ſiſtit, vt & inuolucrorum partialium pictura, quae in noſtra planta flores ſi non ſuperant, tamen adtingunt cum in icone VAILLANTII pedunculis dimidio breuiores ſint.

XXXIX.

Inter plantas meas *Sium* eſt *Gryphiswaldiae* olim lectum, quod pro *Sio latifolio* habui, & etiam nunc habeo, etſi inter foliola Inuolucri vniuerſalis pauca adſint pinnatifida, ea nempe quae prae reliquis lata ſunt, & quamuis vmbellae axillares pedunculatae ſint. Nimius enim eſt conſenſus inter plantam Gryphiswaldenſem & Sium latifolium Gottingae lectam, quam vt ex iſta vnica nota, nempe inuolucro pinnatifido, ſe-

ſeparari poſſint. Dico ex vnica nota, nam etiam in Sio latifolio vmbellas axillares perpetuo pedunculatas reperio, & foliola aliquando ſuperiora angulis poſticis ſinu ita diuiſa, vt latus certe exterius magis promineat. Si ergo *anguſtifolium* LINN. *ſpec.* 2. p. 1672. ab EIVS *latifolio* diſtinctum, aliis cum notis id erit determinandum. *Sium* quoque *Siſarum* ex foliis floralibus ternatis tuto diſtingui non poteſt, nam & in *latifolio* haec frequenter ternata ſunt.

XXXX.

Perfoliatum anguſtifolium montanum COL. *ecphr.* I. p. 247. Radix annua. Folia ſeſſilia ſemiamplexicaulia, non petiolata, valde parum falcata. Rami interdum denuo ramoſi. Inuolucrum vniuerſale a tribus ad quinque foliola habet modice inaequalia, ſuſtinens pedunculos inaequales. Inuolucrum particulare longe plerumque pentaphyllum, pedunculis partialibus duplo longius. Vmbellulae particulares aliquando ſex adſunt, quarum quaelibet ſeptem ad decem continet flores ex pedunculis inaequalibus; Non ſolus enim

cen-

centralis ſuper reliquos inſigniter ſemper eminet, ſed ex reliquis etiam aliqui eamdem adtingunt altitudinem aut ſuper breuiſſimas eminent. Petala lutea, inflexa.

XXXXI.

Aſtrantiae albae nomine a Dn. de SCOPOLI miſſa, videtur eſſe *Aſtrantia floribus pedunculatis, ſeminum angulis alato plicatis fl. carniol.* p. 338. n. 4. An ab *Aſtrantia foliis quinquelobis, lobis tripartitis* HALL. *helv*. p. 439. n. 1. diuerſa? Nondum videtur; etſi enim in planta SCOPOLIANA cum eadem altitudine omnia ſint minora, & radii petala vix adtingant, & in ſemine etiam diuerſitas adeſſe dicatur, denuo tamen haec vtriusque plantae ſemina conferantur, in ſiccis enim nihil diſcriminis reperio. Etiam folia in *maiore* triloba dici poſſunt, lobis lateralibus denuo profundiſſime inciſis, eodem modo vt ſe res habet in *alba*, & prouti Dn. de SCOPOLI ea ex *alba* deſcribit. Ab *Aſtrantia foliis digitatis ſeptenis &c.* HALL. *enum.* n. 2. haec *alba* certo differt, & foliis & ſemine.

XXXXII.

Scandicis infeſtae nomine a Cl. MARTINI, miſſae plantae caulis eſt ſubſcaber & fere laeuis, humanae altitudinis, non cauus, lineis rufis inferius percurſus. Folia pinnata, pinnis denuo pinnatis vel inciſis, ſubtus glauca, ſuperne breuiſſimis pilis obſita, habitu tamen glabro, iuniora viridia, per aetatem ruffa vel nigreſcentia. Inuolucrum vniuerſale nullum, particulare ex ligulis anguſtis horizontalibus, longitudine pedunculorum partialium. Vmbellae particulares ſex ad nouem, denſae. Petala alba in floribus exterioribus inaequalia ſiue radiata inflexo-cordata, in interioribus aequalia, ſemina exteriora hirta, interiora glabra, omnia ouata. Tubae perſiſtentes, primum rectae, dein reflexae. Odor plantae nullus. Patria, ni fallor, Aegyptus eſt.

XXXXIII.

Myrrhis radice lignoſa perenni foliis hirſutis, ſeminibus flauis, obſcure ſtriatis HALL. *h. gott.* 2. p. 184. & *apud Rupp.* p. 282. t. V. quam *Chaerophylli aurei*

aurei nomine, ab *hirſuto* nunc ſeparat LINNAEVS, caulem habet non magis aequalem quam quidem *ſylueſtre* LINN. potius mihi videtur verſus cuiuslibet articuli finem ſuperiorem in *aureo* etiam magis intumeſcere quam in ſylueſtri.

XXXXIV.

Pimpinella agrimonoides odorata. BARR. *icon.* 632 caules habet manifeſte anguloſos. Planta ceterum hirſuta, graui odore, filamentis perbreuibus.

XXXXV.

Centaurio paluſtri luteo minimo RAII, a VAILLANTIO *bot.* p. 32. t. 6. f. 3. egregie picto video pro ſynonymo ſubiungi *Centaurium luteum puſillum* C. B. P. 278. An recte? BAVHINVS enim ſuae plantae iungit *Centaurium luteum nouum* COL. *ecphr.* 2. p. 78. t. 77. Ego plantam, VAILLANTII iconi perfecte reſpondentem duce HALLERO copioſiſſime legi in ducatu Cellenſi circa Engſen, corolla perpetuo quadrifida, laciniis magis obtuſis quam in COLVMNAE icone, calyce pro portione plantae multo latiore quam calyx in COLVMNAE figura,

gura, qui tamen ibi triplo longior pingitur, quam in noſtra planta eſt, deinde etiam COLVMNAE planta ideo non videtur eſſe poſſe VAILLANTIANA, quod in tanta ſua magnitudine nimis ſimplex ſit, pedunculosque habeat breues, cum noſtrae multo minora exempla perpetuo ramoſa ſint pedunculosque habent praelongos, folia vero longe anguſtiora & breuiora quam icon COLVMNAE. Veroſimilius ergo eſt plantam COLVMNAE, adeoque & C. BAVHINI eſſe varietatem Centaurii minoris vulgaris purpurei. Et ita RAIVS *hiſt.* p. 1092. ſe reperiſſe ſibi videtur.

XXXXVI.

Primula foliis petiolatis ouatis ſerratis hirſutis ſcapo paucifloro HALL. *enum*, n. 6. *emendat.* I. n. 147. *rarior.* n. 634. omnino differt a *Primula minima* IACQV. *fl. vindob.* p. 32., *obſ.* I. t. 14. vti ex plantis, ab vtroque VIRO miſſis, patuit. Icon vero CLVSII *hiſt.* p. 305. pertinet ad plantam IACQVINI, ab HALLERI planta multum recedens. Folia in HALLERI planta ſunt ex lanceolatis ouata, non reſecta, anterius ita ſerrata, vt etiam

iam laterum aliqua pars dentes habeat, petiolata, hirſuta. Scapus eſt absque eiusmodi longis ſtipulis quales CLVSII & IACQVINI planta habent. Calyx in Heluetica multo breuior. Haec ex ſiccis ſpeciminibus, quibus ex recentibus plures ſiue dubio addi poterunt notae.

XXXXVII.

Lyſimachia punctata LINN. ſtaminum filamenta baſibus in tubum connata habet.

XXXXVIII.

Alkekengi indicum glabrum chenopodii folio DILL. *h. elth.* p. 13. t. 12. f. 12. DN. DE LINNE' & cum *Phyſalide angulata*, & cum *pruinoſa* ſpec. 2. p. 262. & 263. n. 7. & 10. coniungit. Videtur tamen DILLENII planta a *pruinoſa* remouenda eſſe, ob folia quae habet glabra, antherasque coeruleas, & ramos anguloſos vbiuis nudos, ad *angulatam* vero relinquenda.

XXXXVIIII.

Verbaſcum caule ramoſo, ſpica laxa, foliis inferioribus petiolatis oblongo-acu-

tis denticulatis glabris, flore obſolete fuſco TREW *ehret.* p. 3. t. 16. f. I. Cum *Verbaſco nigro* TRAG. p. 217. adcurate contuli, nec vllam inueni diuerſitatem, praeter colorem & magnitudinem corollae, quae in fuſco duplo fere maior eſt, etſi plantae eiusdem ſint magnitudinis; folia contra in nigro fere maiora & conſtantius ad caulem petiolata ſunt. Ceterum ſtilus in *fuſco*, colore eſt fuſco, ſtigma autem viride.

L.

Viola HALLERI *Enum.* n. 8. & 9. in *Emendat* enim coniungit, vtique ab *alpina* IACQVINI differt, vtriusque enim ſpecimina, etſi ſicca, coram habeo, ex quibus adparet in HALLERIANA folia in vniuerſum duplo breuioribus petiolis inſtructa eſſe, & raro ac forte nunquam ad baſin rotundata, ſed plerumque ibi adtenuata. At in primis calcar in HALLERIANA longitudine petalis eſt aequale, cum in IACQVINI planta calycem non multum ſuperet & magis obtuſum ſit.

LI.

Veronicae alpinae bellidis folio hirſutae HALL. *enum helv.* p. 531. n. 9. t. 12. f. I.

f. I. *Ver. bellidioidis* LINN. *ſpec.* I. p. II. n. 10. ſpecimina heluetica mea, ad caulem paria foliorum habent duo & tria, & ita pingit Dn. de HALLER.

LII.

Lepidium caule repente, foliis ouatis amplexicaulibus HALL. *enum helv.* p. 546. n. 3. *emendat.* 2. n. 8. quod Cl. ALLIONI cum eodem nomine bene pinxit *pedem.* t. 4. f. I. Iconem BARREL. 848. *Thlaſpi* nempe *montanum ſerrato cepeae folio* huc pertinere, nullum eſt dubium, ſed de altera eius icone 1305. n. 2. *Thlaſpi ſubrotundo folio, vtriculo gruinali* diſputatur. HALLERVS & ALLIONI huc referunt, IVSSIEVVS autem & GOVAN. ad *Burſam paſtoris montanam folio globulariae* I. R. H. ſiue *Thlaſpi montanum* LINNAEI. Verum TOVRNEFORTII planta praeter alias diuerſitatis notas folia longe plura habet in caule, quam quidem BARRELIER pingit, ſiliculamque emarginatam. Sed an ideo certe eſt planta HALLERI & ALLIONI? Videtur mihi differre foliis ad caulem nimis paucis, habitu nimis ſimplici & erecto, petalis nimis exiguis, etſi ſiliqua conueniat. For-

te vera BARRELIERI planta nuperis latet. Ceterum HALLERVS plantae ſuae corollam adſignat aequalem, LINNAEVS vero in *ſyſt. nat.* X. p. 1129. ſubaequalem, qualem etiam BARRELIER. in icone 848. pingit. ALLIONI de aequalitate petalorum ſilet, videor tamen mihi in eius icone aliquam inaequalitatem reperire.

LIII.

Lithonthlaſpi quartum carnoſo rotundo folio COL. *ecphr.* p. 279. t. 277. fig. inferior, quae optima. Folia ſucculenta, glauca, conferta, lanceolato elliptica, ſuperiora anguſtiora. Calycis foliola anguſta, ſubaequalia. Petala vnguibus latis, fine pene anguſtiore, certe non latiore, parum reclinato, non emarginato, lineis roſeis latiuſculis picto. Filamenta duo breuiora incurua, duo recta firmiora in fine diuergentia vt antherae pedunculatae eſſe & lateraliter adſtare videantur. Quae ſtructura eodem iure nouo generi anſam dare poſſet, ac quidem iſta antherarum in Inulae LINN. genere. Germen ouatum absque ſtilo, ſtigmate globoſo craſſo. Pedunculus ſiliculae inferius rectus, ſupe-

ſuperius curuus, reflexus. Silicula obcordata reſupinata, ſurſum caua, deorſum conuexa, hilo exciſa, absque ſtilo, margine crenato. LINNAEVS & ZINNIVS cum nomine COLVMNAE ſupra poſito coniungunt *Lepidium foliis pulpoſis ſubrotundis, antheris lateralibus* HALL. *h. gott.* p. 245. Sed cum iſta petala habeat emarginata tubamque longam noſtra eſſe nequit. *Thlaſpi montanum pingui folio, carneo flore, plana & cordata ſiliqua* BARR. *ic.* 845. plantam noſtram bene exprimeret, niſi ſilicularum margo absque crenis pingeretur. In *Thlaſpi flore albo ſiliqua triangulari crenata* BARR. *ic.* 846. ex ipſo nomine flos albus eſt, & in icone, noſtram plantam quoad reliqua bene exprimente, hilus in ſilicula deficit.

LIV.

Vberius indagandum eſſe videtur an *Siſymbrium burſifolium* LINN. *ſpec.* 2. p. 918. n. 9. & *Hesperis dentata* EIVSD. p. 928. n. 6. re vera differant. LINNAEVS ad vtramque plantam citat *Heſperidem flore albo minimo, ſiliqua longa, folio profunde dentato*, pro priore quidem ex BOERHAAVIO, pro alte-

ra ex DILLENIO. Sed ipſe DILLENIVS ad ſuam plantam BOERHAAVIVM citauerat, vt dubium vix eſſe debeat BOERHAAVII & DILLENII plantas fuiſſe diuerſas. Dn. de HALLER in *Emendat.* 3. n. 231. dicit, *Siſymbrium foliis radicalibus ouatis dentatis caulinis pinnatis, pinnis linearibus, extrema maxima*, in loco citato vberius deſcriptum, SIBI cum planta DILLENII in horto Gottingenſi olim culta, omni dote eamdem videri. An forte *Heſperis dentata* eſt planta hortenſis, *Siſymbr. burſifolium* autem ſpontanea. Ex deſcriptione & nomine LINNAEI id certum eſſe videtur, *burſifolium* eſſe idem cum HALLERI Siſymbrio, ſi id excipias, quod pedicellorum ex *burſifolio* deſcriptio potius DILLENIANAE plantae, quam ex horto Gottingenſi olim accepi, magis cõnuenire videatur, quippe qui in meo exemplo vix lineae longitudinem habent, cum in HALLERIANA non maiori planta, certe duorum lineorum longitudine ſint.

LV.

Phaca cauleſcens erecta ſubhirſuta, leguminibus cordato-oblongis inflatis ſubpiloſis;

loſis, in *Obſerv.* a 1762. editis deſcripta, non eſt *Phaca frigida* LINNAEI. Mea potius planta videtur ab *Aſtragalo Onobrychide* L. non multum differre, & forte eadem eſt.

LVI.

Phaca frigida JACQV. *vindob.* p. 265. omnino eſt *Aſtragaloides caule erecto ramoſo, ſiliquis ſemiouatibus* HALL. *enum helv.* p. 569. *Phaca caulibus erectis ramoſis, foliis ouatis tredecim. Emendat.* 2. n. 27. Comparaui enim ſpecimina ab vtroque VIRO miſſa. Sed DN. DE LINNE' nunc *Phacam frigidam & alpinam* coniungit. Velit autem denuo conferre, videbit *alpinae* eſſe folia minora, numeroſiora, ad decem paria & vltra, ſtipulas florales diuerſas, calycem breuiorem, floris ſtructuram diuerſam, & quae praeterea DN. DE HALLER docuit in *Emendat.* 2. *n.* 27. & 3. *n.* 234.

LVII.

Aſtragalus auſtriacus JACQVINI cum *Aſtragalo ſulcato* LINNAEI magnam adfinitatem habere videtur, & forte idem eſt, etſi enim in altero caulis dicatur erectus eſſe, in altero procumbens; etſi etiam folia in *auſtriaco* dican-

dicantur emarginata, in *ſulcato* anguſto-lonceolata ſiue lineari-lonceolata, haec forte diſcrimina, cum reliqua conſentiant, non tanti momenti ſunt, & legumina in *Onobrychide ſecunda* CLVSII; quam iconem non malam eſſe JACQVINVS adſerit, partim erecta pinguntur, qualia re vera ex parte ſunt in vnico ſpecimine *auſtriaci* a CL. JACQVINO miſſo, dum reliqua leuiter propendent, neque figura leguminum differt. Cum *Aſtragalo alpino* LINNAEI, qui eſt *Aſtragalus* HALLERI *decimus* in *Enum. helv.* p. 568. *Emendat.* 2. n. 26. in tanta vtriusque diuerſitate vix conferri debet, quippe cui flores maiores in ſpicam pene capitatam collecti, ſiliquae intra calycem pedunculatae, ita propendentes vt pedunculo pene parallelae ſint.

LVIII.

Scrophularia peregrina Cam. *hort.* t. 43. Huius deſcriptionem, quod nullibi repererim, etſi planta dudum nota ſit, ex hortenſibus ſubiungo. Tota planta glaberrima eſt, & inſigniter foetet. Radix fibroſa absque nodulis. Caulis erectus, pedalis & ſesquicubitalis, quadrangulus, non alatus. Folia

cor-

cordata; petiolata, petiolis baſi decurrentibus, inferius obpoſita petiolis longioribus, ſuperius alterna petiolis breuioribus, omnia dentata, dentibus ſingulis interdum in duos dentes ſubdiuiſis. Pedunculi ex alis foliorum raro biflori, ſaepe tres, quinque & plures flores habent. Calyx pene ad baſin vsque diuiſus, ſegmentis anguſtis acutis. Corolla coloris ſanguinei. Tubus globoſus inflatus breuis. Laciniae duae ſuperiores ſemiincumbentes maiores erectae, duae laterales paulo minores ſimiliter rectae, quinta ima reflexa. Squamula exigua in fauce floris ſub laciniis ſuperioribus. Stamina quatuor ex baſi tubi floralis orta, quorum duo matura eaque pene recta, longitudine tubi floralis, duo ſeriora filamentis adhuc recuruis. Fructus pene globoſus, qui ob tubam perſiſtentem acuminatus dici poſſit. An *Scrophularia flore rubro Camerarii* I. B. 3. 422. huc pertineat dubitat ZINNIVS, ſed cum BAVHINVS icone CAMERARII vtatur, omniaque ſua de hac planta ex eodem CAMERARIO deſumſerit, etſi icon, ipſo fatente BAVHINO, a pictore omiſſis capſularum apicibus,

cibus, paulum deprauata ſit, tuto planta BAVHINI ad noſtram referri poteſt. Neque, a mea certe planta, differt *Scrophularia peregrina fruteſcens foliis teucrii craſſioribus* HALL. *h. gott.* 2. p. 310. Dubium tamen eſt, annon planta HERMANNI cum eodem nomine in *h. lugd.* p. 545. & 547. deſcripta & depicta, a noſtra differat. Habet enim HERMANNVS folia omnia ſeſſilia vnguem vix excedentia, quae in noſtris multo maiora, lacinias calycis rotundatas, ſtamina eminentia.

LVIIII.

Pedicularem caule ſimplici, ſpica folioſa; corollis galea obtuſſimis integris; calycibus quinquedentatis JACQV. *vindob.* p. 112. & p. 253. eamdem eſſe cum *Pediculari foliis alternis, pinnis pinnatis, floribus ex ſpica florigera longe eminentibus* HALL. *enum helv.* p. 623. II. 8. t. 17. f. 2. ex ſpeciminibus ab Vtroque VIRO miſſis didici. Videtur vero *Alectorolophus alpina prima* CLVS. *hiſt* CCX. a planta IACQVINI remouenda eſſe, & pictura & deſcriptione diuerſa. DN. de HALLER plantam CLVSII ad ſpeciem ſuam primam, quae eſt *tuberoſa*

LIN-

LINNAEI, veroſimilius retulerat, etiamſi neque iſtam ſatis referat. Ceterum dubium quod ILL. JACQVIN de LINNAEI *comoſa* mouerat nunc in *ſpecierum* edit. 2. ipſe ſoluit LINNAEVS, dum HALLERI nomen ſub *comoſa* deleuit.

LX.

Teucrium ſupinum LINN. a *montano* vtique differt odore aromatico, monente ita in litteris ILL. JACQVINO. Cum itaque DN. DE HALLER in *Enum. helv.* p. 632. n. 4. dicat Chamaedrin iſtam n. 4. huiusmodi odore praeditam eſſe, omnino & *ſupinum* Teucrium & *montanum* Heluetiae indigenum ſit, neceſſe eſt, etſi omnia ſpecimina a PRAECEPTORE variis annis miſſa, odore iſto deſtituantur, qui in ſicciſſima JACQVINI planta admodum grauis eſt. *Polium* ergo VIII. CLVS. *hiſt.* p. 363. quod inodorum ſit, non poteſt pertinere ad ſupinum.

LXI.

Nardo celticae ſimilem inodoram C. B. *pin.* p. 165. *prodr.* p. 88. LINNAEVS & ad *ſaxatilem* ſuam & ad *montanam* ſimul refert. Sed deſcriptio BAVHINI

ſatis

ſatis demonſtrat, nomen iſtud cum *ſaxatili* relinquendum eſſe, & a montana remouendum. Quod vero C. BAVHINVS *ſaxatilem* in eadem pagina bis poſuerit, nempe primum cum nomine *Valerianae alpinae nardo celticae ſimilis* & dein cum nomine ſupra poſito, ideo forte factum eſt, quod plantae eius, & quas partim a BVRSERO acceperat, folia habuerint CLVSIANA icone duplo latiora & integra, quale ſpecimen a DN. SCOPOLI miſſum, coram habeo.

LXII.

Scabioſa cretica, capitulo pappos mentiente I. R. H. *coroll.* p. 34. Eſt planta annua, pedalis & bipedalis, erecta, ramoſa ramis patentibus. Folia mollia, ſubalbentia, hirſutula, ſubcraſſula, ad terram petiolata, ouata, ſerrata, reliqua pinnatifida, pinnis paucis, longis, anguſtis. Flores in pedunculis praelongis axillaribus terminalibusque. Calyx ex vnica fere ſerie ſquamarum foliacearum, quarum aliquae corollas parum ſuperant, reliquae iis aequales, vel etiam minores ſunt. Corollulae in ambitu ex violaceo albent, easque potius quadrifidas dixerim, quam quinque-

queſidas, nam ſegmentum ſuperius, quod ſimul reliquis minus eſt, modice ſaepius inciſum eſt, interdum tamen paulo profundius, reliqua tria ſegmenta modice maiora ſunt, inque iis medium iterum paululum maius. Omnia vero haec ſegmenta erecta ſunt nec radiantia. Corollulae in diſco ſimiliter quadrifidae vel quinqueſidae dici poſſunt, nam vnum ſegmentorum ſimiliter ſemiinciſum eſt. In vniuerſum autem corollulae in diſco minores ſunt & albidiores. Germen cinctum inuolucro modice laxo in anulum ſubtumidum non membranaceum terminato. Ex ſeminis apice ſtilus breuiſſimus, cuius anulus duodecim forte cilia fert fuſca, mollia, plumoſa, corollulae pene aequalia. Nulla inter flores folia, nec pili.

LXIII.

Arctium alpinum JACQVIN *vindob.* p. 276. certo eſt *Carduus mollis lappae capitulis, foliis imis acanthi ſuperioribus integris* HALL. *enum. helv.* t. XIX. docente id planta quam in horto Gottingenſi cum hoc nomine olim oſtendit PRAECEPTOR & dein aliquoties ex Hel-

uetia miſit, collata cum ſpecimine a JACQVINO miſſo. Sed velim denuo peruideat ILL. VIR *Arctium* ſuum *Perſonatam*. Valde vereor ne ſit *Cardui criſpi* varietas, qualis Gottingae frequenter naſcitur, foliis nempe latioribus, inciſis, infra tomentoſis, & vbi planta alpina nunquam ſponte nata reperta fuit.

LXIV.

Cirſium aculeatum foliis tomentoſis ſpinoſis, capitulis cylindricis ſubhirſutis HALL. *h. gott.* 2. p. 359. Eſt *Carduus leucographus* LINN. ſpec. I. p. 820. n. 2. Vere ſatum, eodem anno floret. Radix fibroſa. Caulis erectus, ramoſus, foliis decurrentibus alatus. Folia ſemipinnata, pinnis inaequalibus dentatis, dentibus in ſpinulam terminatis, ſubtus tomentoſa, ſuperne hirſuta, venis albicantibus debiliter picta. Pedunculi non longi, tomento albo obducti frequenter duo & tria capitula ſeſſilia ſuſtinent. Calyx tomentoſus; ſquamis multorum ordinum anguſtis in ſpinulam terminatis, ſquarroſis. Corollae laciniae aequales, nec vnica profundius ſeparata. Pappus in ſemine forte ſim-

ſimplex. Placentae pappus & ſemina viſco conglutinata.

LXV.

Carduus eriſithales JACQV. *vindob.* p. 146. & 279. *obſeruat.* I. p. 28. t. 17. idem eſt cum *Cirſio foliis amplexicaulibus pinnatifidis* ſubſpinoſis, floribus cernuis calycibus inermibus SCOPOLI *fl. carniol.* p. 358. n. 6. Qui plantam inuenit, vel certe reſtituit. Neque videtur differre *Cirſium foliis pinnatis ſerratis, ſquamis calycis recuruis* HALL. *emendat.* 3. n. 244. Dn. de LINNE' ad Cnicos forte ob aliquam cum *Cnico oleraceo* in habitu ſimilitudinem retulit, etſi calyx bracteis non obuallatus ſit, nec ſquamas calycinas ramoſas habeat. *Eriſithalen* LVGD. p. 1094. ob picturam, deſcriptionem & colorem floris diuerſam aegre huc refero, adeoque nec *Carduum pratenſem, foliis tenuibus laciniatis* C. B. P. 376. *Cirſio foliis ciliatis, imis ouatis, ſuperioribus ſemipinnatis* ab HALLERO dudum deſcriptum & depictum in *Comm. gott.* 1751. p. 206. t. 8. proximum eſt, differt tamen floribus paucioribus, calyce, & colore floris, & ad HALLERI plantam potius pertinere vi-

dentur ſynonyma flore purpuraſcente a Dn. DE LINNE' *Eriſithali* ſubiecta.

LXVI.

Aſteris ſecundi ſupini CLVS. ſeu *Buphthalmi maritimi* LINN. ſtigma floſculorum hermaphraditicorum non eſt ſimplex ſiue indiuiſum, ſed manifeſto bifidum, ſimile ſtigmati femineorum.

LXVII.

Achillea inodora LINN. Plantae, cuius ſemen cum hoc nomine accepi, radix annua eſt, tenuis, paucas e lateribus fibras demittens. Folia pulpoſula glauca lineari cuneiformia dentata, dentibus longis paucis, laciniarum ſimilibus, fine foliorum plerumque latiore trifido, in ſuperioribus diuiſione ſimplici, in inferioribus denuo & inaequaliter diuiſa. Flores in corymbum arctiſſime congeſti, breuiſſime pedunculati. Calyx ouatus, inbricatus ſquamis cauulis obtuſis margine membranaceis, exterioribus minus, interioribus magis. Radius nullus. Floſculi lutei omnes androgyni, tubuloſi, quinquedentati, ſegmentis parum reflexis.

Squa-

Squamae inter floſculos latae membranaceae, pellucidae, dorſo eminente viridi, non emarginatae, exteriores anguſtiores, interiores longiores, omnes floſculis paulo breuiores. Semen coronatum corona exigua membranacea, non pappoſa. Valde vereor LINNAEVM hanc plantam bis poſuiſſe. Primum cum nomine *Athanaſiae annuae* Spec. 2. p. 1182. n. 9. & dein ſub titulo *Achilleae inodorae* p. 1265. n. 9. Synonymon enim Achilleae inodorae ex BOERHAAVIO citatum, ipſe BOERHAAVIVS cum Synonymia Athanaſiae annuae coniungit. Mea planta certo eſt *Sontolina quae Ageratum* laciniatis foliis inodorum africanum HALL. *h. gott.* 2. p. 375.

LXVIII.

Cel. JACQVINVS *Solidaginis alpinae tomentoſae* nomine omnino loquitur de *Senecione foliis lingulatis tomentoſis ſimpliciſſimis* HALL. *enum. helv.* n. 18. vti ex planta a Cel. JACQVINO miſſa adparet. Et certum eſt, etſi folia *tomentoſae* a foliis *alpinae nudae* & *alatae* egregie diuerſa eſſe videantur, ſuperiorem tamen harum plantarum partem ita ſi-

milem eſſe, vt vnam pro altera facile ſumas, vnde hactenus. Cel. JACQVINO fidem adhibeo, dicenti, ſpecimina intermedia docuiſſe, varietates eſſe. Id tamen mirum eſt Florarum germanicarum autores pleroſque RVPPIVM, VAN LINDERN, DE BERGEN, DILLENIVM, KRAMERVM, SCOPOLI, ſolam *tomentoſam* recenſere, vnus forte LEYSERVS cum BVXBAVMIO *nudam* ſimul habet. Sed praeter *tomentoſam* Dn. de LINNE´ nunc etiam *helenitin* coniungit, circa *Nordheim* abunde prouenientem, vbi tamen hactenus nec *tomentoſa* nec *nuda* reperta eſt. Videat vero Dn. de LINNE´ annon *helenitis* cum *paluſtri ſpec.* 2. p. 1243. n. 6. tutius coniungi poſſit. In planta certe, quam Berolini lectam olim donauit Cl. RAMSPECK, Celeberrimus Baſileenſium Profeſſor, non aliam ab *heleniti* diuerſitatem reperio, praeter caulem ſimpliciorem, foliaque anguſtiora minusque diſſecta; & omnino circa lacus noſtros mixtim naſcuntur plantae quae vtrique LOBELII *iconi* p. 347. reſpondent.

LXVIIII.

LXVIIII.

Hieracium foliis lanceolatis glaucis caule brachiato multifloro HALL. *emendat.* 2. n. 96. & *Hieracium porrifolium* JACQVINI easdem eſſe plantas, docuerunt ſpecimina ab Vtroque VIRO miſſa. Etſi enim plantae HALLERIANAE foliis plerumque ſint rariter dentatis, cauleque pene nudo, monuit tamen iamiam LINNAEVS de vtraque varietate, & olim IOH. BAVHINVS varie eam plantam pinxit. Plantam HALLERI alius quoque Clarus Vir miſit cum nomine *Hieracii blattarioidis* LINNAEI, abunde diuerſi. *Hieracium* autem *VI. montanum* CLVSII eſt *Hieracium incanum* LINN. *ſpec.* I. quod in edit. ſecunda cum *Hieracio hiſpido* coniungit, JACQVINVM in *fl. vindob.* p. 269. ſequutus.

MARS 1847

NOUVELLES PUBLICATIONS

QUI SE TROUVENT

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,

Rue de l'École-de-Médecine, 17, à Paris.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

DICTIONNAIRE DES TERMES DE MEDECINE, DE CHIRURGIE, DE PHARMACIE, des Sciences accessoires et de l'Art vétérinaire, de P.-H. Nysten; revu successivement et considérablement augmenté en 1824, 1833, 1839 et 1841, par MM. Bricheteau, O. Henry et J. Briand; *neuvième édition* revue de nouveau par le docteur A.-J.-L. Jourdan, membre de l'Académie de médecine, etc. Paris, 1845, in-8° de 860 pages à 2 colonnes, avec 107 figures intercalées dans le texte. 11 fr.

Les progrès incessants de la science rendaient nécessaires, pour cette *neuvième édition*, de nombreuses additions, une révision générale de l'ouvrage, et plus d'unité dans l'ensemble des mots consacrés aux théories nouvelles et aux faits nouveaux que les progrès de l'anatomie, de la physiologie, etc., ont créés. C'est M. le docteur Jourdan, connu par sa vaste érudition et par son savoir étendu dans la littérature médicale, nationale et étrangère, qui s'est chargé de cette tâche importante.

BIBLIOTHEQUE DU MÉDECIN-PRATICIEN, ou Résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques, anciens et modernes, publiés en France et à l'étranger, par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre, chevalier de la Légion-d'Honneur, auteur du Dictionnaire des Dictionnaires de Médecine, rédacteur en chef de la *Gazette des Hôpitaux*. — Ouvrage adopté par l'Université, pour les Facultés de Médecine et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du royaume; et par le ministère de la guerre, sur la proposition du conseil de santé des armées, pour les hôpitaux d'instruction. Paris, 1843-1847.

Cet ouvrage, accueilli dès le principe avec faveur par les sociétés savantes, par la presse médicale, par les médecins et les élèves, vient d'être adopté par l'Université sur un rapport sérieux, longuement motivé et très-favorable de l'un des membres du conseil supérieur pour l'examen des livres, et sur l'approbation la plus large accordée par le Conseil royal de l'instruction publique.

New York Botanical Garden Library
QK314 .W4 gen
Weigel, Christian E/Flora Pomerano-Rugic
3 5185 00122 3740